

15. **S. Carceli*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 21, pl. 5, f. 29 (1839) (Grèce).
16. *S. sculpticollis*, Heyden, Deutsch. Ent. Zeit. p. 278 (1886) (Amasie).
* *sculpticollis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 53 (1887).
17. **S. Sieversi*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 95 (1886) (Tiflis).
18. *S. ambigua*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 28, pl. 3, f. 2 (1829) (Syrie, Araxès).
19. **S. unidentata*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 137 (1890) (Asie mineure).
20. **S. curta*, Jakowleff, idem, Vol. 19, p. 130 (1885) (Turcomanie).
21. **S. micans*, Jakowleff, ibidem, Vol. 20, p. 93 (1886) (Perse).
22. **S. Eugenii*, Jakowleff, ibidem, Vol. 30, p. 254 (1896) (Tiflis).
23. *S. parvula*, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 137 (1798) (Sicile).
* *parvula*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 381 (1865).
24. **S. chinensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 120 (1898) (Chine).
25. *S. substriata*, Krynicki, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 7, p. 116 (1834) (Crimée).
* *substriata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 380 (1865).
26. *S. basalis*, Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 1, p. 168 (1861) (Astrakan).
* *basalis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 980 (1865).
27. *S. lucidicollis*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 316 (1882) (Margellan).
28. *S. Pharao*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pl. 2, f. 8 (Egypte).
29. *S. inaequalis*, Steven, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 1, p. 287 (1829) (Algérie, Crimée).
algirica, Abeille.
30. *S. fossulata*, Gebler, Humm. Ess. Vol. 4, p. 45 (1825) (Kirghisie, Mongolie).
sulcata, || Fischer, Hor. Soc. Nat. Ent. Ross. Vol. 2, p. 197, pl. 21, f. 5 (1824).
* *fossulata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 351 (1865).
31. *S. margelanica*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 112 (1882) (Turcomanie).
* *piana*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 113 (1887).
32. **S. salebrosa*, Jakowleff, idem, p. 113 (Turkestan).
33. **S. montana*, Jakowleff, ibidem, p. 113 (Turkestan).
34. **S. elvina*, Jakowleff, ibidem (Aulie).
35. *S. exarata*, Fischer, Ent. Vol. 2, p. 4, pl. 21, f. 2 (1824) (Sibérie).
dianthi, Steven, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 1, p. 286 (1829).
* *dianthi*, Mannerheim, idem, Vol. 9, p. 95 (1837).
36. *S. canaliculata*, Pallas, Icon. Ins. p. 65, pl. D, f. 4 (1785) (Caucase, Sibérie).
Pallasia, Schönherr, Syn. Ins. App. p. 264 (1817).
* *Pallasia*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 359 (1865).
daurica, Marseul, idem, p. 361.
37. *S. lapidaria*, Brullé, Expéd. Morée, p. 134, pl. 35, f. 1 (1832) (Espagne, Sicile, Grèce, Asie mineure).
* *lapidaria*, Marseul, L'Abeille, t. 2, p. 363 (1865).
38. *S. dilaticollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 12, pl. 3, f. 15 (1839) (Portugal, Algérie).
dilaticollis, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 358 (1865).
39. **S. sulcata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 367 (1865) (Egypte).
40. **S. inermis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 119 (1898) (Chine).
Pallasi, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 134 (1899).
41. *S. lincola*, Herbst, Col. Vol. 9, p. 284 (1801) (Portugal, Espagne, Turquie, Asie mineure).
lineata, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 211 (1801).
striola, Illiger, Mag. Ins. Vol. 4, p. 94 (1803).
geminata, Illiger, idem, p. 244.
smyrneensis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 305, pl. 51, f. 299 (1841).
* *geminata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 369 (1865).
* *smyrneensis*, Marseul, idem, p. 370.
42. **S. variolosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 299 (1898) (Afrique orientale allemande).
43. *S. ardua*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 17, pl. 4, f. 22 (1839) (Région méditerranéenne).
* *ardua*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 345 (1865).
44. *S. antiqua*, Illiger, Mag. Insekt. Vol. 2, p. 247 (1803) (Sicile, Grèce).
litigiosa, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 95 (1837).
iridicetrus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pl. 2, f. 7 (1839).
* *antiqua*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 205 (1865).
45. *S. rauca*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 177 (1787) (Région méditerranéenne).
* *latcollis*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 69, pl. 7, f. 66 (1790).

- gemmata*, Olivier, idem, p. 90, pl. 12, f. 129.
metallica, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 210 (1794).
Bassii, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 13, pl. 3, f. 16 (1839).
similis, Castelnau & Gory, idem, p. 14, pl. 3, f. 18.
Bravaisi, Castelnau & Gory, ibidem, p. 30, pl. 8, f. 45.
zelebrica, Gory, Rev. Zool, p. 226 (1839).
cordatum, Chevrolat, Rev. Zool. p. 14 (1840).
niticollis, Lucas, Rev. Zool. p. 50 (1844).
niticollis, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 362 (1865).
nitida, Marseul, idem, p. 366 (1865).
46. *S. gemellata*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 96 (1837) (Région méditerranéenne).
conica, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 16, pl. 4, f. 21 (1839).
cupricentris, Castelnau & Gory, idem, p. 18, pl. 4 f. 24.
gemellata, Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. 357 (1865).

SECTION III.

Cette section comprend les *Sphenoptera* ayant les élytres tridentés au sommet et la strie marginale du prosternum entière, c'est-à-dire longeant les côtés et contournant le sommet. Elle comprend par conséquent les *Chilostetha*, les *Chrysoblemma* et les *Raphidochila* de M. Jakowleff. Une partie des *Sillonnés* et des *Rutilans* de Marseul viennent s'y ranger.

47. *S. ignita*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 33 (1895) (Caucase).
48. *S. Anthoniae*, Reitter, idem, Vol. 10, p. 142 (1891) (Caucase).
49. *S. transcaspica*, Jakowleff (Turcomanie).
50. *S. Scovitzii*, Faldermann, Faun. Transc. Vol. 1, p. 155, pl. 5, f. 6 (Perse).
Scovitzii, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 398 (1865).
51. *S. Beckeri*, Dohrn, Stett. Ent. Zeit. p. 249 (1866) (Caucase, Perse).
Beckeri, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 102 (1865).
52. *S. cylindricollis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 401 (1865) (Algérie).
Hennoni, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 26 (1886).
53. *S. sancta*, Reitter, Ent. Nachtr. p. 280 (1890) (Caucase).
54. *S. tamaricis*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 30, pl. 3, f. 4 (1829) (Algérie, Caucase).
tamaricis, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 399 (1865).
55. *S. viridiazurea*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 328 (1882) (Turkestan).
56. *S. Arthemisiae*, Reitter, idem, p. 282 (1889) (Caucase).
molitor, Reitter, idem, p. 170 (1890).
57. *S. orichalcea*, Pallas, Icon. Ins. p. 75, pl. D, f. 17 (Perse).
cupraria, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 96 (1837).
orichalcea, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 396 (1865).
58. *S. Zoubkoffi*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 312, pl. 52, f. 307 (1841) (Turkestan).
Zoubkoffi, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 394 (1865).
59. *S. Karelini*, Faldermann, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 5, p. 46, pl. 2, f. 4 (1833) (Asie-min. Turkestan).
fossulata || Zoubkoffi, idem, Vol. 1, p. 154, pl. 4, f. 3 (1829).
Karelini, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 394 (1865).
60. *S. Solskyi*, Becker, idem, Vol. 40, p. 108 (1867) (Caucase, Perse).
61. *S. Laportei*, Saunders, Cat. Bupr. p. 88, n° 60 (1871) (Hongrie, Caucase).
metallica || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 5, f. 26 (1839).
62. *S. Popovi*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 280 (1852) (Mongolie).
Popovi, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 374 (1865).
63. *S. pharia*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 77 (1839) (Sénégal).
64. *S. aureola*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 316 et 354 (1901) (Cap de Bonne-Espérance).
65. *S. splendens*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pl. 7, f. 43 (1839) (Sénégal).
splendens, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 314 (1895).
66. *S. congolana*, nov. sp. (1) (Katanga).

1) Long. 13, 5; larg. 4, 5 mm. — Ovale oblong, peu convexe, la région antérieure des élytres subgibbeuse, bronzé obscur légèrement violacé et brillant en dessus, dessous noir; tête étroite, pointillée et sillonnée avec deux tubercules frontaux gémés et lisses; pronotum peu convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, la marge antérieure subsinuée, les côtés obliques en avant et droits ensuite à partir du milieu, la carène marginale presque entière; écusson très élargi et acuminé au sommet; élytres à stries fines et régulières, les interstries plans sauf au sommet où la suture et deux d'entre eux sont relevés en côtes; le sommet tridenté; dessous à ponctuation assez fine mais très dense; strie marginale du prosternum entière; hanches postérieures subparallèles, sauf au côté interne; tibias antérieurs à peine arqués. — Congo: Katanga.

67. **S. deducta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 192 (1892) (Bengale).
68. *S. indica*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 37, pl. 10, f. 37 (1839) (Bengale).
* *indica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 193 (1892).
69. *S. sulcifrons*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 311, pl. 52, f. 306 (1841) (Sénégal, Abyssinie).
* *sulfifrons*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 294 (1901).
70. *S. capensis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 31, pl. 7, f. 47 (1839) (Cap de Bonne-Espérance).
intermedia, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 310, pl. 52, f. 305 (1841).
* *capensis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 315 (1901).
71. **S. subnitida*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 291 (1898) (Sénégal).
72. **S. cupreotoma*, Thomson, Typ. Bupr. p. 69 (1878) (Iles Andaman).
73. **S. humilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 289 (1898) (Sénégal).
74. **S. nigerrima*, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 332 (1893) (Bengale).
75. **S. Fairmairei*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 528 (1865) (Asie mineure).
76. *S. gentilis*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 336 (1851) (Sénégal, Korfodan).
* *gentilis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 315 (1901).
77. *S. mesopotamica*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 389 (1865) (Caucase).
78. *S. nigrescens*, Thomson, Typ. Bupr. p. 64 (1878) (Almorah).
* *nigrescens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 181 (1892).
79. **S. piscis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 289 (1898) (Guinée, Zanguebar).
80. **S. molirensis*, Kerremans, idem, p. 292 (Tanganyka).
81. **S. impressa*, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 182 (1892) (Bengale, Sikkim).
82. *S. sinuosa*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 2 (1839) (Cap de Bonne-Espérance).
* *sinuosa*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 297 (1901).
83. *S. atomaria*, Thunberg, Nov. Spec. Ins. Vol. 5, p. 97 (1789) (Cap de Bonne-Espérance).
pulverulenta, Herbst, Col. Vol. 9, p. 310 (1801).
* *atomaria*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 294 (1901).
84. *S. capicola*, Thomson, Typ. Bupr. p. 68 (1878) (Cap de Bonne-Espérance).
* *capicola*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 297 (1901).
85. **S. cupriventris*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 203 (1890) (Bengale).
86. ***S. curtula***, Kerremans (Bengale).
* *curta* || Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 180 (1892).
87. **S. Tappesi*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 387 (1865) (Turquie).
88. **S. hispidula*, Reitter, Ent. Nachtr. p. 281 (1890) (Caucase).
89. **S. fulgidiceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 190 (1892) (Bengale).
90. **S. clara*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 293 (1898) (Delagoa Bay).
91. **S. nigripennis*, Kerremans, ibidem, p. 297 (Mozambique).
92. **S. insipida*, Kerremans, ibidem, p. 296 (Sénégal, Abyssinie).
93. *S. Peroteti*, Guérin, Rev. Zool. p. 328 (1840) (Bengale).
angustata, Thomson, Typ. Bupr. p. 72 (1878).
* *Peroteti*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 194 (1892).
94. **S. coeca*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 293 (1898) (Delagoa Bay).
95. **S. Tschoffeni*, Kerremans, ibidem, p. 297 (Congo).
96. *S. Gossypii*, Cotes, Indian Mus. Notes, Vol. 2, p. 33 (1891) (Bengale).
* *Gossypii*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 195 (1892).
97. **S. comes*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 284 (1898) (Zanzibar).
98. *S. angolensis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 303, pl. 51, f. 297 (1841) (Egypte).
aegyptiaca, Gory, idem, p. 306, pl. 51, f. 300.
* *angolensis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 315 (1901).
99. **S. rectipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 295 (1898) (Sénégal).
100. **S. Andrewesi*, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 332 (1893) (Bengale).
101. **S. cyaniceps*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 203 (1890) (Bengale).
102. **S. auricollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 191 (1892) (Bengale).
103. **S. crebripunctata*, Kerremans, idem, p. 189 (Bengale).
104. **S. konbirensis*, Kerremans, ibidem, p. 188 (Bengale).
105. **S. lucidula*, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 264 (1899) (Natal).
106. *S. Delegorguei*, Thomson, Typ. Bupr. p. 68 (1878) (Natal).
* *Delegorguei*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 317 (1901).

107. *S. natalensis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 65 (1878) (Natal).

* *natalensis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 317 (1901).

SECTION IV

Une partie des *Sillonnés* de Marseul et des *Hoplistura* de M. Jakowleff, n'ayant pas de strie marginale au prosternum, mais ayant ce dernier sillonné, entrent dans cette quatrième section. Presque toujours le sillon du prosternum est prolongé en arrière sur le métasternum; dans certains cas il est large, profond et bien marqué, dans d'autres, au contraire, il est à peine accusé et visible seulement sous un certain angle.

108. **S. cylindrica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 287 (1892) (Zanzibar).

109. **S. cincticollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 330 (1893) (Bengale).

110. **S. mediocris*, Kerremans, idem (Bengale).

111. *S. neglecta*, Klug, Erm. Atl. p. 30 (1835) (Sénégal).

* *neglecta*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 307 (1901).

112. **S. dissimilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 293 (1898) (Sénégal, Guinée).

113. ***S. subparallela**, nov. sp. (1) (Sierra-Leone).

114. **S. congener*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 295 (1898) (Gabon).

115. *S. senegalensis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 36, pl. 9, f. 56 (1839) (Sénégal, Mozambique).

* *senegalensis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 308 (1901).

116. *S. splendidula*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. p. 37, pl. 10, f. 58 (Sénégal).

* *splendidula*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 301 (1901).

117. *S. aurulenta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. p. 30, pl. 10, f. 61 (Sénégal).

* *aurulenta*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 309 (1901).

118. **S. punctata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 283 (1898) (Quango).

119. **S. valida*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 310 et 344 (1901) (Cameroon).

120. **S. dispar*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 262 (1899) (Niam-Niam).

121. **S. oculifrons*, Kerremans, idem, p. 265 (Transvaal).

122. *S. parallela*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 21, pl. 5, f. 28 (1839) (Sénégal).

* *parallela*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 301 (1901).

123. ***S. Colmanti**, nov. sp. (2) (Bahr-El-Ghazal).

124. ***S. Seeldrayersi**, nov. sp. (3) (Congo : Kassai).

125. ***S. gibbosa**, nov. sp. (4) (Congo : Haut-Kassai).

126. **S. annexa*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, pp. 300 et 322 (1901) (Sénégal).

127. ***S. kassaiensis**, nov. sp. (5) (Congo : Kassai).

(1) Long. 10,5; larg. 2,5 mm. — Oblong allongé, peu atténué en avant et en arrière, bronzé brillant en dessus, les élytres plus obscurs que la tête et le pronotum; dessous pourpré sombre avec des taches bleu d'acier foncé sur les côtés des segments abdominaux; antennes et tarses noirs. — Plus parallèle et moins robuste que les deux précédents, le pronotum plus allongé et les élytres plus courts; tête large, inégale et ponctuée en avant, la dépression surmontée de deux reliefs obliques, le vertex sillonné; pronotum plus long que large, les côtés non obliques et faiblement arqués, la carène marginale cintrée vers le dessous et atteignant presque le sommet, le sillon médian à peine sensible; écusson subcordiforme, élargi, tronqué à la base; élytres subparallèles, sérialelement ponctués, les interstries finement pointillés, le calus huméral petit mais saillant, le sommet tridenté, la dent médiane formée par un prolongement coudé d'une courte carène. Dessous finement ponctué; prosternum sillonné; ♀ tibias antérieurs et médians droits. — Sierra Leone : Rhobomp.

(2) Long. 15; larg. 3,5 mm. — Allongé, subcylindrique, les côtés parallèles; tête et pronotum bronzés, élytres noirs; dessous bronzé pourpré clair et brillant. — Tête large, creusée le long de l'épistome, sillonnée au milieu, en avant, entre deux reliefs; pronotum plus long que large, subcylindrique, sillonné au milieu, la marge latérale carénée et arquée. Elytres parallèles avec la suture saillante vers le sommet et une côte bifurquée et sinueuse formant le prolongement de la dent médiane du sommet. Prosternum sillonné; côtés des segments abdominaux avec une plaque lisse et irrégulière. ♂ Front vert en avant; tibias antérieurs arqués, les postérieurs droits; extrémité du dernier segment abdominal étroitement échancrée au milieu. — Bahr-El-Ghazal (Lieut. Colmant).

(3) Long. 15; larg. 4,3 mm. — Oblong ovale, assez convexe, bronzé obscur et brillant en dessus; dessous bronzé pourpré très brillant et clair. — Tête assez large, sillonnée au milieu, faiblement bituberculée en avant. Pronotum plus large que haut, assez convexe, les côtés obliques et faiblement arqués, le disque sillonné. Elytres à stries régulières, les points fins et assez régulièrement espacés, les interstries plans et unis, sauf au sommet où le troisième est légèrement relevé en côte. Prosternum sillonné. ♂ Front verdâtre en avant; tibias antérieurs arqués, les autres droits; extrémité du dernier segment abdominal étroitement échancrée au milieu. — Congo : Kassai.

(4) Long. 12,5; larg. 4,2 mm. — Large, écourté, subovoïde, bronzé cutreux sombre en dessus; dessous bronzé pourpré obscur, reliefs de l'abdomen vermiculés et bleu d'acier; tarses noirs. — Tête inégalement et grossièrement ponctuée avec deux reliefs obliques au milieu du front; vertex déprimé; pronotum plus large que haut à ponctuation épaisse et dense dont les intervalles forment des reliefs irréguliers et vermiculés, le milieu sillonné, la carène marginale entière mais ne touchant pas le sommet; écusson large, subcordiforme, tronqué à la base; élytres sérialelement ponctués, les points arrondis, les interstries ridés transversalement, la dent terminale du milieu courte et obtuse. Dessous ponctué entre des reliefs vermiculés; prosternum sillonné, tibias antérieurs ♀ arqués. — Congo : Haut-Kassai.

(5) Long. 9; larg. 2,6 mm. — Oblong ovale, peu convexe, bronzé clair et brillant en dessus et en dessous; antennes et tarses obscurs. — Tête large, faiblement bossuée en avant et sillonnée au milieu en arrière; yeux légèrement saillants en dehors; pronotum large, convexe, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, les côtés faiblement arqués avec la carène marginale n'atteignant pas le sommet. Elytres à stries fines avec les interstries plans et assez larges. Prosternum sillonné. ♂ Front verdâtre en avant; tibias antérieurs et médians arqués; les postérieurs droits; extrémité du dernier segment abdominal à peine échancrée au milieu. — Congo : Kassai.

128. **S. aemula*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, pp. 300 et 321 (1901) (Sénégal).
 129. *S. dubia*, Saunders, Cat. Bupr. p. 90 (1871) (Zanguebar).
 exarata || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 22, pl. 6, f. 31 (1839).
 * *dubia*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 298 (1901).
 130. *S. disjuncta*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 334 (1851) (Sierra-Leone).
 * *disjuncta*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35 p. 308 (1901).
 131. *S. Maillei*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pl. 6, f. 35 (1839) (Sénégal).
 * *Maillei*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 298 (1901).
 132. *S. aenea*, Fabricius, Spec. Ins. Vol. 2, p. 275 (1781) (Bengale).
 aerosa, Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, p. 1928 (1788).
 tricuspidata, Olivier, Entom. Vol. 2, Gen. 32, p. 29, pl. 8, f. 57 (1790).
 * *falsa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 185 (1892).
 133. * *S. Latona*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 299 et 339 (1901) (Congo).
 134. *S. trinileata*, Palisot, Ins. d'Afr. p. 44, pl. 11, f. 2 (1803) (Guinée).
 * *trilineata*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 307 (1901).
 135. **S. convexa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 234 (1898) (Delagoa-Bay).
 136. *S. cuneiformis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 314, pl. 53, f. 310 (1841) (Sénégal, Sierra-Leone).
 * *cuneiformis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 307 (1901).
 137. **S. ocularis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 283 (1898) (Sierra-Leone).
 138. *S. longiuscula*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pl. 1, f. 38 (1839) (Guinée).
 * *longiuscula*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 309 (1901).
 139. ****S. camerunica***, nov. sp. (1) (Cameroon).
 140. *S. diffinis*, Klug, Erm. Atl. p. 30 (1835) (Sénégal).
 metallescens, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 23, pl. 6, f. 32 (1839).
 obtusa, Castelnau & Gory, idem, p. 25, pl. 6, f. 36.
 proxima, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 306, pl. 51, f. 301 (1841).
 141. **S. tropica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 287 (1898) (Zanguebar).
 cylindrica ♀ Kerremans, *teste*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 312 (1901).
 142. **S. Duvivieri*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 288 (1898) (Lac Moëro).
 143. **S. sublevis*, Kerremans, idem, p. 286 (Guinée).

SECTION V.

Cette section comprend tous les *Sphenoptera* ayant le sommet des élytres tridenté et le prosternum uni, sans stries marginales ni sillon médian, c'est-à-dire quelques *Sillonés*, de Marseul, et une partie des *Hoplistura*, de M. Jakowleff, ainsi que le sous-genre *Tropeopeltis* de cet auteur. Les espèces qui le composent pourraient venir se ranger parallèlement à la série de celles du groupe précédent, tant les formes qui constituent ces deux groupes sont voisines les unes des autres.

144. *S. Raffrayi*, Thomson, Typ. Bupr. p. 70 (1878) (Abyssinie).
 145. **S. remota*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 304 et 336 (1901) (Sierra-Leone).
 146. **S. fidelis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 263 (1899) (Togos).
 147. ****S. Clavareaui***, nov. sp. (2) (Congo).
 148. *S. hova*, Nonfried, Ent. Nachtr. Vol. 18, p. 138 (1892) (Madagascar).
 * *insularis*, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 82 (1898).
 * *Perrieri*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 228 (1898).
 madagascariensis, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 437 (1900).

(1) Long. 15; larg. 4 mm. — Oblong ovale, allongé, côtés sut. parallèles, atténué en avant et en arrière, bronzé obscur en dessus, les élytres plus obscurs que la tête et le pronotum; dessous bronzé pourpré. — Tête rugueuse et ponctuée, sillonnée au milieu et en arrière avec deux reliefs obliques au milieu du front; pronotum plus long que large et plus étroit en avant qu'en arrière, ses côtés arqués avec une carène marginale entière; le disque avec un sillon médian linéaire et peu accusé; écusson large, déprimé, arrondi sur les côtés et acuminé au milieu; élytres sérialelement ponctués, l'armature terminale assez forte, tridentée, la dent médiane surmontée d'une carène arquée se prolongeant un peu vers l'avant, la dent externe surmontée d'une carène droite qui se bifurque en lançant une ligne élevée le long du bord et une autre, à peine sensible et parallèle à la carène de la dent médiane. Dessous ponctué avec des vagues plaques lisses et irrégulières sur les côtés des segments abdominaux; prosternum sillonné sur la moitié postérieure; bords des hanches postérieures parallèles avec un lobe sur le côté inférieur interne; premier segment abdominal finement sillonné au milieu de la base; ♀ tibias antérieurs à peine arqués, les médians subsinueux. — Cameroon.

(2) Long. 15; larg. 4,6 mm. — Oblong ovale, subgibbeux, légèrement déclive en avant et en arrière, noir en dessus; dessous bronzé brillant; tarses et antennes noirs. — Tête large, front légèrement creusé le long de l'épistome, celui-ci un peu relevé en gouttière. Pronotum plus large que haut, la marge antérieure très sinueuse avec un large lobe médian avancé et arqué; les côtés obliques en avant, arqués avant le milieu et sinueux ensuite avec les angles postérieurs légèrement saillants en dehors; une fossette de chaque côté, centre la marge latérale et un peu plus près du bord antérieur que de la base. Elytres sérialelement ponctués, les points linéaires. Prosternum large et plan, sans strie marginale ni sillon médian; premier segment sillonné au milieu; abdomen régulièrement ponctué, sans plaques lisses. ♂ tibias antérieurs et médians arqués, les postérieurs droits; extrémité du dernier segment abdominal arrondie. — Congo.

149. **S. divergens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 298 (1892) (Sierra-Leone, Bénéué).
 150. **S. atra*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 265 (1899) (Cameroon).
 151. *S. impressifrons*, Fairmaire, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 7, p. 511 (1875) (Tunisie).
 152. *S. submutica*, Thomson, Typ. Bupr. p. 71 (1878) (Sénégal).
 * *submutica*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 301 (1901).
 153. *S. diversa*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 304 note (1841) (Sénégal).
 dongolensis || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 38, pl. 10, f. 60 (1839).
 * *diversa*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 391 (1865).
 154. **S. crassa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 285 (1898) (Sierra-Leone).
 155. *S. furticapennis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 27, pl. 7, f. 39 (1839) (Sierra-Leoné).
 * *furticapennis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 302 (1901).
 156. **S. humeralis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 290 (1898) (Sierra-Leone).
 157. *S. cyanipes*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 5 (1886) (Gabon).
 * *cyanipes*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 314 (1901).
 158. *S. trispinosa*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, pl. 3, f. 3 (1829) (Sénégal; Egypte; Kibanga).
 owariensis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 28, pl. 7, f. 41 (1839).
 * *trispinosa*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 390 (1865).
 159. **S. Kerremansi*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 178 (1900) (Bengale).
 160. *S. Dumolini*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 308, pl. 52, f. 303 (1841) (Sénégal).
 * *Dumolini*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 315 (1901).
 161. **S. plicata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 284 (1898) (Angola, Transvaal).
 162. **S. subobesa*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 363 (1899) (Cameroon).
 163. **S. nitens*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 118 (1898) (Aden).
 164. **S. nyassica*, Kerremans, ibidem, p. 291 (Lac Nyassa).
 165. **S. perstriata*, Kerremans, ibidem, Vol. 48, p. 364 (1899) (Angola).
 166. **S. rugosicollis*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 286 (1898) (Delagoa Bay; Cap de Bonne-Espérance)..
-
167. *S. abbreviata*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 104 (1899) (Arménie).
 168. *S. abyssinica*, Thomson, Typ. Bupr. p. 70 (1878) (Abyssinie).
 169. *S. aciculata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 395 (1865) (Turcomanie).
 170. *S. acuminata*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 331 (1898) (Astrabad).
 171. *S. addenda*, Jakowleff (*Deudora*), idem, Vol. 36, p. 413 (1900) (Amasie).
 172. *S. adelphina*, Thomson, Typ. Bupr. p. 68 (1878) (Natal).
 173. *S. adumbrata*, Jakowleff (*Hoplandrocneme*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 346 (1901) (Transvaal)..
 174. *S. adusta*, Jakowleff, Rev. Ent. Vol. 6, p. 111 (1887) (Turkestan).
 175. *S. aeneiventris*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 91 (1886) (Malatie).
 176. *S. aeneomicans*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 317 (1882) (Samarkande).
 177. *S. aerata*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 62 (1887) (Perse).
 178. *S. aeruginea*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 300, pl. 50, f. 295 (1841) (Sénégal).
 179. *S. aethiops*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 129 (1890) (Amasie).
 180. *S. afflicta*, Jakowleff (*Deudora*), idem, Vol. 36, p. 406 (1900) (Turkestan).
 181. *S. Ahngeri*, Jakowleff (*Chrysoblemma*), ibidem, p. 441 (Transcaspienne).
 182. *S. Alfredi*, Reitter (*Hoplístura*), Deutsch. Ent. Zeit. p. 85 (1900) (Tunisie).
 183. *S. alajensis*, Jakowleff, (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 27, p. 132 (1893) (Turkestan).
 184. *S. alcides*, Reitter (*Hoplístura*), Deutsch. Ent. Zeit. p. 84 (1900) (Tunisie).
 185. *S. allecta*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 410 (1900) (Transcaucasie)..
 186. *S. amoena*, Jakowleff (*Chrysoblemma*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 183 (1900) (Perse).
 187. *S. ampliocollis*, Jakowleff, Ann. Mus. Petrop. p. 292 (1899) (Transcaspienne).
 188. *S. andamanensis*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 6 (1877) (Iles Andaman).
 189. *S. anthaxoides*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 42 (1895) (Araxès).
 190. *S. anthracina*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 78 (1887) (Perse).
 191. *S. anxia*, Jakowleff (*Deudora*), idem, Vol. 36, p. 420 (1900) (Syrie).
 192. *S. arabica*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 307, pl. 52, f. 302 (1841) (Arabie).
 193. *S. araxidis*, Reitter, Ent. Nachtr. p. 281 (1890) (Ordubad).

194. *S. ardens*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 32, pl. 3, f. 6 (1829) (Arabie).
ardea, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pl. 7, f. 42 (1839).
195. *S. arguta*, Jakowleff (*Hoplandrocneme*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 420 (1900) (Syrie).
196. *S. armena*, Steven, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 167 (1830) (Perse).
197. *S. Artamonovi*, Jakowleff (*Hoplistura*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 96 (1899) (Abyssinie).
198. *S. asiatica*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 36, pl. 2, f. 55 (1839) (Turkestan).
Walteri, Reitter, Ent. Nachtr. p. 279 (1890).
199. *S. astrachanica*, Reitter, idem, p. 282 (Astrakan).
200. *S. astuta*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 549 (1898) (Amasie).
201. *S. attenuata*, Jakowleff (*Hoplistura*), idem, Vol. 35, p. 323 (1901) (Sénégal).
202. *S. auriceps*, Jakowleff, ibidem, Vol. 20, p. 90 (1886) (Smyrne).
203. *S. aurora*, Semenow, idem, Vol. 30, p. 249 (1896) (Transcaspienne).
204. *S. australis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 34, pl. 9, f. 52 (1839) (Australie?).
205. *S. Babel*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 340 (1865) (Syrie).
206. *S. Balassogloi*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 19, p. 131 (1885) (Tchinas).
207. *S. barbara*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 113 (1887) (Ala-Taou).
208. *S. barbarica*, Gmelin, Syst. Nat. p. 1936 (1788) (Algérie).
bicolor, Fabricius, Mant. Ins. p. 183 (1787).
barbara, Olivier, Enc. Méth. Vol. 2, p. 237 (1790).
209. *S. bechuana*, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 164 (1879) (Bechuana).
210. *S. Bertheloti*, Paiva, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 20 (1862) (Angola).
211. *S. bicarinata*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 77 (1887) (Perse).
212. *S. bifoveolata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 382 (1865) (Algérie).
213. *S. bifulgida*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 12 (1898) (Bukhara).
214. *S. blanda*, Jakowleff (*Hoplistura*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 325 (1901) (Cap de Bonne-Espér.).
215. *S. Bohemani*, Thomson, Typ. Bupr. p. 72 (1878) (Natal).
216. *S. bucharica*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 422 (1900) (Bukhara).
217. *S. campicola*, Boheman, Oefv. Vet. Akad. Förh. p. 21 (1861) (Ngami).
trilineata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 24, pl. 6, f. 34 (1839).
218. *S. canescens*, Motschulsky, Bull. Acad. Petrop. p. 517 (1860) (Oural).
219. *S. caucasica*, Jakowleff (*Chrysoblemma*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 138 (1890) (Caucase).
220. *S. chaldeolata*, Thomson, Typ. Bupr. p. 71 (1878) (Sénégal).
221. *S. chalybea*, Menetries, Mem. Acad. Petrop. Vol. 6, p. 46, pl. 2, f. 5 (1849) (Turcomanie).
222. *S. cheloukensis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 66 (1878) (Nil Blanc).
223. *S. Chobauti*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 28 (1897) (Algérie).
224. *S. chrysis*, Jakowleff, Ann. Mus. Petrop. p. 293 (1899) (Mongolie).
225. *S. Christofi*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 73 (1887) (Perse).
226. *S. chrysostoma*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 35, pl. 9, f. 54 (1839) (Morée).
227. *S. clauda*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 341 (1865) (Caucase).
228. *S. coerulea*, Jakowleff (*Chilostetha*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 559 (1898) (Perse).
229. *S. collaris*, Harold, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 218 (1878) (Zanzibar).
230. *S. confinis*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 27, p. 131 (1893) (Syrie).
231. *S. congrua*, Jakowleff (*Deudora*), idem, Vol. 36, p. 419 (1900) (Transcaucasie).
232. *S. conjuncta*, Jakowleff (*Deudora*), ibidem, p. 416 (Turkestan).
233. *S. convicta*, Jakowleff (*Hoplistura*), ibidem, p. 435 (Asie-Mineure).
234. *S. Cornui*, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 157 (1895) (Tuggurt).
235. *S. corrugata*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 27, pl. 3, f. 1 (1829) (Syrie).
236. *S. crassiceps*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 2, p. 75 (1887) (Asie-Mineure).
237. *S. cribrata*, Falderman, Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. Vol. 4, p. 152, pl. 5, f. 4 (1835) (Caucase).
238. *S. cunea*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 346 (1865) (Perse).
239. *S. cupraria*, Motschulsky, Bull. Acad. Petrop. p. 516 (1860) (Kirghisie).
cuprina, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 204 (1899).
240. *S. cupreosplendens*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Evagora*, p. 4, pl. 1, f. 4 (1839) (Cap de B.-Esp.).
241. *S. cuprifrons*, Falderman, Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. Vol. 4, p. 153, pl. 5, f. 5 (1835) (Perse).
242. *S. cyanea*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 558 (1898) (Askhabad).

243. *S. cylindracea*, Reitter, Deutsch. Ent. Zeit. p. 21 (1897) (Afghanistan).
244. *S. cyphogastra*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 426 (1900) (Turkestan).
245. *S. curvipes*, Thomson, Typ. Bupr. p. 67 (1878) (Sénégal).
246. *S. demissa*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 365 (1865) (Caucase).
247. *S. depressa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 188 (1892) (Bengale).
248. *S. denticauda*, Jakowleff (*Hoplandrocneme*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 347 (1901) (Congo).
249. *S. derugata*, Redtenbacher, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Vol. 1, p. 47 (1850) (Perse).
250. *S. Deyrollei*, Thomson, Typ. Bupr. p. 67 (1878) (Sénégal).
251. *S. dichroa*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 112 (1887) (Asie-Mineure).
252. *S. dilatipes*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 131 (1890) (Caucase).
253. *S. diluta*, Jakowleff, idem, Vol. 34, p. 202 (1899) (Arménie).
254. *S. dione*, Jakowleff (*Hoplistura*), ibidem, p. 176 (Algérie).
255. *S. dolens*, Jakowleff (*Deudora*), ibidem, Vol. 27, p. 133 (1893) (Caucase).
256. *S. dongolensis*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 32, pl. 3, f. 5 (1829) (Nubie).
257. *S. Edmundi*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 425 (1900) (Akbès).
258. *S. egena*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 284 (1852) (Mongolie).
259. *S. egregia*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 170 (1900) (Transcaspienne).
260. *S. elamita*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 338 (1865) (Perse).
261. *S. elegans*, Jakowleff (*Chilostetha*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 443 (1900) (Transcaucasie).
262. *S. eos*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 30, p. 254 (1896) (Transcaspienne).
263. *S. exasciata*, Jakowleff, idem, Vol. 20, p. 83 (1886) (Shiraz).
264. *S. excavata*, Falderman, Faun. Transc. Vol. 1, p. 154, pl. 5, f. 7 (1835) (Caucase).
265. *S. excisa*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 68 (1887) (Sardaigne).
266. *S. eximia*, Jakowleff, idem, Vol. 20, p. 100, (1886) (Astrabad).
267. *S. extensocarinata*, Jakowleff, ibidem, Vol. 23, p. 84 (1889) (Shan-Si).
268. *S. fallax*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 335 (1851) (Natal).
269. *S. fellah*, Thomson, Typ. Bupr. p. 68 (1878) (Soudan).
270. *S. filiformis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 39, pl. 10, f. 62 (1839) (Orient).
271. *S. fissifrons*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 350 (1865) (Turcomanie).
272. *S. flagrans*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 348 (1895) (Turkestan).
273. *S. formosa*, Jakowleff, (*Hoplistura*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 327 (1901) (Sierra Leone).
274. *S. fossicollis*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 8 (1886) (Angola).
275. *S. foveipennis*, Quedenfeldt, idem, Vol. 32, p. 180 (1888) (Afrique centrale).
276. *S. fraterna*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 408 (1900) (Akbès).
277. *S. frontalis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 71 (1878) (Sénégal).
278. *S. Ganglbaueri*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 86 (1886) (Perse).
279. *S. Gebleri*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 12, pl. 3, f. 14 (1839) (Sarepta).
280. *S. gracilis*, Jakowleff, (*Chrysoblemma*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 343 (1901) (Mer Caspienne).
281. *S. gravida*, Jakowleff, (*Hoplistura*), idem, Vol. 35, p. 329 (1900) (Cameroon).
282. *S. hamata*, Jakowleff, (*Deudora*), ibidem, Vol. 34, p. 101 (1899) (Turkestan).
283. *S. Hauzerei*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 34 (1895) (Hérat).
284. *S. Heydeni*, Gradler, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 510 (1877) (Khartoum).
285. *S. hypocrita*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 92 (1837) (Caucase).
286. *S. igniceps*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 89 (1886) (Malatie).
287. *S. illucens*, Jakowleff, (*Hoplistura*), idem, Vol. 35, p. 330 (1901) (Sénégal).
288. *S. incerta*, Jakowleff, ibidem, Vol. 21, p. 57 (1887) (Caucase).
289. *S. inconspicua*, Jakowleff, (*Deudora*), ibidem, Vol. 27, p. 134 (1893) (Syrie).
290. *S. infantula*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 37 (1895) (Araxès).
291. *S. innocua*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 187 (1892) (Bengale).
292. *S. insidiosa*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 282 (1852) (Mongolie).
293. *S. integra*, Jakowleff, (*Hoplistura*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 332 (1901) (Cameroon).
294. *S. intermixta*, Quedenfeldt, (*Hoplandrocneme*, teste Jakowleff), Berl. Ent. Zeit. p. 6 (1886) (Afriq.-occid.).
294. *S. irregularis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 99 (1886) (Kirghisie).

296. *S. Isis*, Jakowleff, (*Hoplistura*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 179 (1900) (Egypte).
 297. *S. Jakowlewii*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 39 (1895) (Araxès).
 298. *S. jejuna*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 417 (1900) (Transcaucasie).
 299. *S. jubana*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 25, p. 348 (1895) (Bardera).
 300. *S. jugulata*, Fairmaire, Miss. Revoil, Col. p. 54 (1882) (Somalis).
 301. *S. Kaznakovi*, Jakowleff, Ann. Mus. Petrop. p. 295 (1899) (Buchara).
 302. *S. Koenigi*, Jakowleff, (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 133 (1890) (Turcomanie).
 303. *S. Komarovi*, Jakowleff, idem, Vol. 20, p. 86 (1886) (Zulfguara).
 304. *S. Korshinskii*, Jakowleff, ibidem, Vol. 36, p. 423 (1900) (Bucharie).
 305. *S. Kozlowi*, Jakowleff, ibidem, Vol. 34, p. 102 (1899) (Chine occidentale).
 306. *S. Kraatzi*, Jakowleff, ibidem, Vol. 21, p. 56 (1887) (Turkestan).
 dubia || Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 317 (1882).
 307. *S. Kruperi*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 80 (1887) (Parnasse).
 308. *S. laesiventris*, Fairmaire, Miss. Revoil, Col. p. 55 (1882) (Somalis).
 309. *S. La Fertei*, Thomson, Typ. Bupr. p. 65 (1878) (Bengale).
 310. *S. latesulcata*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 89 (1886) (Eriwan).
 311. *S. laticeps*, Jakowleff, idem, p. 94 (Turkestan).
 312. *S. Lederi*, Jakowleff, ibidem, Vol. 25, p. 134 (1890) (Syrie).
 313. *S. leonensis*, Nonfried, Ent. Nachr. Vol. 18, p. 138 (1892) (Sierra-Leone).
 314. *S. Leontiewi*, Jakowleff, (*Chrysoblemma*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 507 (1900) (Buchara).
 315. *S. lia*, Jakowleff, idem, p. 168.
 316. *S. libanica*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 87 (1881) (Liban).
 317. *S. lineifrons*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 190 (1892) (Cachemyre).
 sulcifrons || Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 126 (1891).
 318. *S. luctuosa*, Thomson, Typ. Bupr. p. 63 (1878) (Cap de Bonne-Espérance).
 319. *S. lunigera*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 8 (1886) (Angola).
 320. *S. Manderstjernae*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 94 (1886) (Syr Daja).
 321. *S. manifesta*, Jakowleff, idem, Vol. 36, p. 428 (1900) (Transcaucasie).
 322. *S. Mannerheimi*, Thomson, Typ. Bupr. p. 63 (1878) (Caucase).
 323. *S. marginicollis*, Hope, Gray Zool. Misc. Vol. 1, p. 25 (1831) (Nepal).
 324. *S. Marseuli*, Saunders, Cat. Bupr. p. 87, n° 40 (1871) (Europe méridionale).
 Pallasia || Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 359 (1865).
 325. *S. macera*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 317 (1901) (Algérie).
 326. *S. mendax*, Marseul, Col. Heft. Vol. 5 (1869) (Russie méridionale).
 impressicollis || Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 355 (1865).
 327. *S. Meyeri*, Gebler, Ledeb. Reise, Vol. 3, p. 76 (1830) (Sibérie).
 328. *S. misella*, Jakowleff, (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 415 (1900) (Transcaucasie).
 329. *S. mixta*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 111 (1887) (Akhul Tekka).
 330. *S. minutissima*, Desbrochers, Berl. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 119 (1870) (Espagne).
 331. *S. modesta*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 76 (1887) (Syrie).
 332. *S. moesta*, Jakowleff, idem, p. 64 (Perse).
 333. *S. mongolica*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 115 (1887) (Chine septentrionale).
 334. *S. Morawitzi*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 30, p. 248 (1896) (Transcaspienne).
 335. *S. morio*, Jakowleff, idem, Vol. 20, p. 84 (1886) (Shiraz).
 336. *S. mucronata*, Boheman, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 332 (1851) (Limpopo).
 337. *S. nervosa*, Nonfried, Ent. Nachtr. Vol. 18, p. 139 (1892) (Afrique centrale).
 338. *S. nilotica*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 31, pl. 8, f. 46 (1839) (Nubie).
 brevis, Castelnau & Gory, idem, p. 32, pl. 8, f. 48.
 339. *S. notata*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 556 (1898) (Alaï).
 340. *S. nox*, Jakowleff (*Rhaphidochila*), idem, Vol. 36, p. 445 (1900) (Perse).
 341. *S. obesa*, Thomson, Typ. Bupr. p. 67 (1878) (Sénégal).
 342. *S. obscura*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 130 (1890) (Turcomanie).
 343. *S. obscuriventris*, Motschulsky, Bull. Acad. Petrop. p. 517 (1860) (Kirghisie).
 344. *S. obsoleta*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 136 (1890) (Tiflis).
 345. *S. Oertzeni*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 115 (1887) (Egine).

346. *S. olivacea*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 317 (1882) (Samarkande).
347. *S. opaca*, Dejean, Cat. (éd. 3) p. 91 (1838) (Cap de Bonne-Espérance).
contempta, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 3, *Evagora*, p. 3, pl. 1, f. 3 (1839).
348. *S. Orion*, Jakowleff (*Hoplistura*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 334 (1901) (Dar Es Salaam).
349. *S. ornatifrons*, Jakowleff (*Hoplistura*), idem, p. 335 (Delagoa-Bay).
350. *S. parnassica*, Jakowleff, ibidem, Vol. 21, p. 74 (1887) (Parnasse).
351. *S. parumpunctata*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 33, pl. 3, f. 7 (1829) (Arabie).
352. *S. Pelleti*, Mulsant & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, Vol. 13, p. 87 (1866) (France méridionale).
353. *S. pilosula*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 26, p. 69 (1887) (Cartagène).
354. *S. pisciformis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 64 (1878) (Bengale).
355. *S. polita*, Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol. 9, p. 44 (1827) (Cap de Bonne-Espérance).
maculata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Evagora*, p. 5, pl. 2, f. 7 (1839).
Thunbergi, Saunders, Cat. Bupr. p. 91, n° 131 (1871).
356. *S. Potamini*, Jakowleff (*Chrysoblemma*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 23, p. 86 (1889) (Mongolie).
procera, Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 136 (1892).
357. *S. prolongata*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 70 (1887) (Asie-mineure).
358. *S. propinqua*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 315 (1882) (Samarkande).
359. *S. prosternalis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 19, p. 130 (1835) (Tchinas).
360. *S. protracta*, Jakowleff, idem, p. 133 (Tachkent).
361. *S. pruinosa*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 10 (1891) (Russie méridionale).
362. *S. puberula*, Jakowleff, idem, Vol. 6, p. 116 (1887) (Askhabad).
363. *S. pubescens*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Soc. Ross. Vol. 20, p. 100 (1886) (Turkestan).
364. *S. punctatissima*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 41 (1895) (Hérat).
365. *S. purpurascens*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 28, pl. 2, f. 14 (1882) (Honduras).
366. *S. purpureiventris*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 314 (1882) (Samarkande).
367. *S. purpurifera*, Walker, Col. Coll. by Lord. p. 13, (1871) (Egypte).
368. *S. puta*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 388 (1865) (Algérie).
369. *S. pyrogastrica*, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 164 (1879) (Zambèze).
370. *S. quadraticollis*, Gerstaecker, Arch. Naturg. Vol. 37, p. 53 (1871) (Mombas).
371. *S. quadrifoveolata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 356 (1865) (Amasie).
372. *S. quinquepunctata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pl. 7, f. 37 (1839) (Sénégal).
373. *S. recticollis*, Harold, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 217 (1878) (Zanzibar).
374. *S. rhododactyla*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 30, p. 251 (1896) (Transcaspienne).
375. *S. Roborowskyi*, Jakowleff, idem, Vol. 34, p. 171 (1900) (Tibet oriental).
376. *S. rotundicollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 38, pl. 8, f. 44 (1839) (Algérie, Sénégal).
scabra, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 304, pl. 51, f. 298 (1841).
fulgens, Gory, idem, p. 309, pl. 52, f. 304.
377. *S. rugulosa*, Faldermann, Faun. Transcauc. Vol. 1, p. 151, pl. 5, f. 3 (1835) (Caucase).
378. *S. sagitta*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 651 (1898) (Transcaspienne).
379. *S. satelletes*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 33 (1898) (Araxès).
380. *S. scaura*, Jakowleff (*Hoplistura*), idem, Vol. 35, p. 338 (1901) (Benué).
381. *S. Schneideri*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 11 (1898) (Bucharra).
382. *S. serena*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 407 (1900) (Smyrne).
383. *S. serripes*, Jakowleff, idem, p. 431 (Transcaspienne).
384. *S. sicala*, Jakowleff, ibidem, Vol. 20, p. 95 (1886) (Kirghisie).
385. *S. signata*, Jakowleff, ibidem, Vol. 21, p. 65 (1887) (Russie méridionale).
386. *S. signaticollis*, Jakowleff, ibidem, Vol. 21, p. 85 (1887) (Mésopotamie).
387. *S. signifera*, Jakowleff, ibidem, Vol. 32, p. 551 (1898) (Ferghana).
388. *S. simulatrix*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 42 (1895) (Amasie).
389. *S. smaragdina*, Jakowleff (*Chrysoblemma*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 352 (1901) (Sierra-Leone).
390. *S. sobrina*, Jakowleff (*Deudora*), idem, Vol. 20, p. 97 (1886) (Amasie).
391. *S. Sokolowi*, Jakowleff (*Chilostheta*), ibidem, Vol. 36, p. 434 (1901) (Turkestan).
392. *S. solida*, Jakowleff (*Hoplistura*), ibidem, Vol. 35, p. 340 (1900) (Afrique méridionale).
393. *S. somechita*, Kolenati, Melet. Ent. Vol. 5, p. 34 (1846) (Caucase).
394. *S. sordida*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 84 (1886) (Caucase).

395. *S. speciosa*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 110 (1887) (Caucase).
 396. *S. spectabilis*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 345 (1883) (Och).
 397. *S. sphaerocephala*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21 p. 54 (1887) (Syrie).
 398. *S. spicula*, Jakowleff (*Hoplistura*), idem, Vol. 35, p. 296 et 342 (1901) (Sénégal).
 399. *S. spreita*, Jakowleff, ibidem, Vol. 34, p. 203 (1899) (Turkestan).
 400. *S. Ssemenovi*, Jakowleff (*Oplisura*), ibidem, Vol. 23, p. 85 (1889) (Mongolie).
 401. *S. stenophthalma*, Jakowleff, ibidem, Vol. 34, p. 105 (1899) (Semiretschire).
 402. *S. striata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 32, pl. 8, f. 49 (1839) (Cap de Bonne-Espérance).
 403. *S. striatipennis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 19, p. 152 (1885) (Obichpa).
 404. *S. strigosa*, Jakowleff, idem, Vol. 21, p. 71 (1887) (Turkestan).
 405. *S. striolata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 22, pl. 5, f. 30 (1839) (Sénégal).
 406. *S. subcostata*, Mulsant, Mém. Acad. Sc. Lyon, Vol. 1, p. 187 (1852) (Turquie).
 407. *S. subcylindrica*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 378 (1865) (Sibérie orientale).
 408. *S. subtilis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 552 (1894) (Astrabad).
 409. *S. subtricotata*, Kraatz (*Deudora*, teste Jakowleff), Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 318 (1882) (Samark.).
 410. *S. subviolacea*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Evagora*, p. 4, pl. 1, f. 5 (1839) (Cap de B.-Esp.).
 411. *S. sulcicollis*, Castelnau & Gory, idem, *Evagora*, p. 6, pl. 2, f. 9 (1839) (Cap de Bonne-Espérance).
 412. ***S. sulcifera***, Kerremans (Turkestan).
 latesulcata || Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 153 (1892).
 413. *S. sulciventris*, Jakowleff (*Deudora*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 98 (1886) (Turkestan).
 414. *S. tantilla*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 338 (1851) (Gariép).
 415. *S. Theryi*, Pic, L'Echange, Vol. 11, p. 78 (1895) (Egypte).
 416. *S. thoracica*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 80 (1887) (Caucase).
 417. *S. tibialis*, Jakowleff (*Deudora*), idem, Vol. 20, p. 88 (1886) (Alaï).
 418. *S. tomentosa*, Jakowleff, ibidem, p. 101 (Samguara).
 419. *S. torrida*, Jakowleff, ibidem, Vol. 32, p. 553 (1898) (Tokat).
 420. *S. tragacathae*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, pl. 2, f. 12 (1829) (Syrie).
 421. *S. tristicula*, Reitter, Wien, Ent. Zeit. p. 38 (1895) (Araxès).
 422. *S. tristis*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 87 (1886) (Ferghana).
 423. *S. Tschitscherini*, Jakowleff (*Chrysoblemma*), idem, Vol. 34, p. 98 (1899) (Transcaspienne).
 424. *S. trisulcata*, Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 413 (1856) (Palestine).
 425. *S. tumida*, Jakowleff (*Hoplistura*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 343 (1901) (Sierra-Leone).
 426. *S. turkestanica*, Jakowleff, idem, Vol. 19, p. 133 (1885) (Tchinas).
 427. *S. validiapex*, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 165 (1879) (Bechuana).
 428. *S. varia*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 83 (1887) (Turkestan).
 429. *S. vestita*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6 p. 117 (1887) (Caucase).
 430. *S. vetusta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Evagora*, p. 6, pl. 2, f. 8 (1839) (Cap de B.-Espér.).
 431. *S. vidua*, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 429 (1900) (Shanghai).
 432. *S. violacea*, Jakowleff, idem, Vol. 32, p. 557 (1898) (Askhabad).
 433. *S. viridiceps*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 257 (1891) (Syrie).
 434. *S. viridicoerulea*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 318 (1882) (Samarkande).
 435. *S. viridiflua*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 397 (1865) (Asie-Mineure).
 436. *S. Wilkini*, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 117 (1887) (Turkestan).
 437. *S. zanzibarica*, Harold, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 218 (1878) (Zanzibar).
 438. *S. Zarudnyi*, Jakowleff (*Chrysoblemma*), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 99 (1899) (Perse).

4. GENUS RETHIA, THÉRY

Rethia. Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. n° 2, p. 107 (1901).

Caractères. — « Tête saillante, front presque vertical, cavités antennaires superficielles, grandes, » non-délimitées latéralement, antennes très allongées et grêles, ressemblant à celles d'un Elatéride, » atteignant lorsqu'elles sont repliées en-dessous, les cavités cotyloïdes antérieures, les jambes très

« longues, dépassant les bords du corps et visibles en-dessous lorsqu'elles sont normalement repliées, « marge antérieure des hanches postérieure sinueuse ».

Je ne connais ce genre que par la trop courte description qu'en donne M. Théry et j'ai quelques doutes au sujet de sa validité. D'après la description de l'unique espèce sur laquelle il est fondé, j'y vois un *Sphenoptera* ayant les antennes et les pattes plus développées que celles des autres espèces. Ces caractères me paraissent insuffisants, car ils pourraient aussi bien être le fait du dimorphisme sexuel. En général, beaucoup de *Sphenoptera* ♂ ont les antennes et même parfois les pattes plus allongées que celles des ♀.

Je maintiens provisoirement le genre avec la description qu'en donne son créateur, ne pouvant me prononcer nettement.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre habite le Congo français.

1. *R. elateroides*, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. n° 2, p. 107 (1901) (Benito).

TRIBU VIII. BUPRESTINI, LACORDAIRE

Buprestides vrais. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 33 (1857).

Anthaxides. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 134 (1865).

Buprestini. Le Conte & Horn (pars), Smiths. Instit. (1883); Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 107 (1893).

Anthaxini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 109 (1893).

Caractères. — Cavité sternale formée dans son fond par le métasternum et latéralement par le mésosternum; cavités antennaires variables, toujours distantes; pores antennaires concentrés dans une fossette sur chaque acticle, cette fossette inférieure ou terminale(1); écusson variable; hanches postérieures distinctement dilatées au côté interne.

A. *Épimères du métasternum entièrement découvertes;*

a. *Yeux obliques et sensiblement rapprochés en dessus; fossettes porifères des antennes inférieures.* 1. DICERCITES.

b. *Yeux parallèles et à peine rapprochés en dessus; fossettes porifères des antennes inférieures ou terminales.* 2. BUPRESTITES.

B. *Épimères du métasternum en partie recouvertes par le prolongement latéral de l'abdomen;*

fossettes porifères des antennes terminales 3. ANTHAXITES.

GROUPE I. DICERCITES, KERREMANS

Buprestes. Le Conte & Horn (pars), Smiths. Instit. (1883).

Dicercites. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 107 (1893).

Caractères. — Fossettes porifères des antennes inférieures; yeux obliques et sensiblement rapprochés en arrière sur le vertex; épimères du métasternum découvertes; premier article des tarses postérieurs souvent de la longueur du suivant.

(1) Sauf le genre *Pseudhypercampa*, Saunders, qui m'est inconnu et qui aurait, suivant son fondateur, les pores antennaires diffus sur les deux faces des articles.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Ecusson grand, cordiforme ou allongé, acuminé en arrière. | 2. |
| — médiocre ou petit, jamais acuminé en arrière | 4. |
| 2. Ecusson cordiforme. | 3. |
| — triangulaire et très allongé | 1. PSEUDHYPERANTHA. |
| 3. Marge antérieure du prosternum saillante en avant et bilobée avec une profonde échancrure médiane. | 2. CARDIASPIS. |
| Marge antérieure du prosternum non saillante et à peine sinuée | 3. HAPLOTRINCHUS, nov. gen. |
| 4. Elytres acuminés au sommet; l'apex échancré et bidenté de part et d'autre | 5. |
| — arrondis et inermes au sommet, parfois dentelés le long du bord postérieur | 11. |
| 5. Fémurs normaux | 6. |
| — sillonnés le long du bord interne (1) | 4. DICERCOMORPHA. |
| 6. Pronotum caréné ou sillonné au milieu | 7. |
| — largement impressionné sur tout le disque | 5. ECTINOGONIA. |
| 7. Ecusson visible | 8. |
| — invisible | 6. TRACHYKELE. |
| 8. Premier article des tarses postérieurs plus long que le deuxième | 9. |
| — — — — semblable au suivant. | 7. DICERCA. |
| 9. Pronotum uni, parfois impressionné sur les bords latéraux. | 10. |
| — trisillonné longitudinalement | 12. CINYRA. |
| 10. Métasternum et premier segment abdominal sillonnés | 8. POECILONOTA. |
| Non | 9. LAMPRA. |
| 11. Elytres dentelés le long du bord postérieur; extrémité du dernier segment abdominal ♂ échancrée, ♀ arrondie | 10. CHACOPOECILA. |
| Elytres non dentelés le long du bord postérieur; extrémité du dernier segment abdominal prolongée en pointe tronquée à son sommet. | 11. NEOBUPRESTIS, nov. gen. |

I. GENUS PSEUDHYPERANTHA, SAUNDERS

Pseudhyperantha. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5 (1869).

Caractères. — « Caput antennarum cavitatibus rotundis prope oculos positis; antennis a tertio articulo serratis. Thorax postice latior. Scutellum triangulare, elongatum. Elytra elongata, apicibus truncatis et bidentatis. Prosternum gibbosum, tarsi dilatati.

» Tête convexe sur le front; cavités antennaires arrondies, situées près des yeux, juste au-dessus de l'épistome; premier article des antennes allongé, subpyriforme, plus long que le deuxième et le troisième réunis, le deuxième court, le troisième sensiblement plus long et pyriforme, les suivants dentés avec quelques poils allongés. Pronotum court, plus large à la base. Ecusson en triangle allongé et aigu, semblable à celui des *Belionota*. Elytres ayant leur plus grande largeur à l'épaule, tronqués et bidentés de part et d'autre au sommet. Prosternum très convexe; dernier segment abdominal très allongé et bidenté. Fémurs et tibias peu robustes; articles des tarses d'égale longueur et dilatés.

» La difficulté n'a pas été pour moi de distinguer ce genre de ses congénères, mais bien de déterminer la place à lui assigner. Autant que j'en puis juger, il pourrait être rangé entre *Capnodis* et *Cardiaspis*. Il ressemble pour le faciès, au genre *Hyperantha* de l'Amérique du Sud, mais il a les pores antennaires diffus sur les deux faces des articles, comme dans la division des « Chalcophorides » de

(1) A l'exception du *D. Alluandi*, Kerremans, des îles Séchelles.

» Lacordaire. Sa forme se rapproche de celle des *Capnodis*, placés à la fin de cette division et des *Cardiapis*, » qui, dans mon groupement, commence les « Buprestides vrais » de cet auteur et avec lesquels il a » beaucoup d'affinités; je pense donc qu'on peut le placer entre ces deux genres. »

Ne connaissant pas ce genre, je le laisse, comme l'a fait Saunders, en tête des *Buprestini*.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre provient du Pénang.
1. *P. jucunda*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 6, pl. 1, f. 9 (1869) (Pénang).

2. GENUS CARDIASPIS, SAUNDERS

Cardiaspis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 306 (1866).

Caractères. — Tête étroite; épistome légèrement émarginé et relevé, formé en avant par le bord des cavités antennaires; front creusé entre deux bourrelets sinueux longeant les yeux en arrière et limitant en avant les cavités antennaires; vertex sillonné; cavités antennaires assez grandes, triangulaires. — Antennes courtes et grêles, dentées à partir du sixième article. le premier épais, pyriforme, le deuxième court, obconique; le troisième un peu plus allongé; les deux suivants subégaux, triangulaires, un peu plus longs que le troisième; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux grands, elliptiques, convexes et très rapprochés sur le vertex. — Pronotum en trapèze, beaucoup plus large que haut, de la largeur de la tête en avant avec la marge antérieure à peine bisinuée; les côtés très obliques, faiblement arqués et bordés d'une carène lisse; le disque plan, les côtés légèrement déclives; la base faiblement bisinuée avec un large lobe médian un peu arqué. — Ecusson grand, cordiforme et aplani, presque aussi large que long, acuminé au sommet. — Elytres médiocrement convexes, faiblement lobés à la base, arrondis et saillants à l'épaule, sinueux sous le calus huméral, légèrement élargis ensuite et atténués du tiers postérieur au sommet; celui-ci tridenté avec la dent externe divergente; ils présentent des stries nettes, profondes et régulières entre des interstries élevés et lisses. — Prosternum large, plan, saillant entre les hanches, sa marche antérieure bilobée entre une échancrure médiane; épisternum prosternal creusé le long de la carène marginale du pronotum. — Mésosternum divisé, ses branches latérales saillantes et obliques; la suture métasternale oblique. — Métasternum avancé, sillonné dans toute sa longueur et formant un angle très obtus avec le prosternum. — Hanches postérieurs contiguës, dilatées au côté interne, leur marge antérieure subsinueuse, la postérieure très oblique, lobée au côté interne, ce lobe échancré. — Fémurs antérieurs et médians fusiformes, les postérieurs subcylindriques, aplanis sur leurs deux faces; tibias antérieurs et médians arqués, les postérieurs droits; tarsi dilatés et peu allongés, leurs articles subégaux entre eux. — Corps élargi, subheptagonal, peu convexe, atténué en avant et acuminé en arrière.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce actuellement décrite de ce genre provient de Sikkim et du Laos. Je crois en avoir remarqué autrefois une seconde, non décrite, dans la collection de M. Meyer-Darcis, de Wohlen (Suisse).

1. *Mouhoti*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 307, pl. 21, f. 9 (1866) (Laos).

3. GENUS HAPLOTRINCHUS, NOV. GEN.

Tête plane, à peine déprimée sur le front et grossièrement ponctuée entre d'épais reliefs lisses entourant une cavité médiane qui surmonte l'épistome; celui-ci court, étroitement échancré au milieu et limitant, sur les côtés, les cavités antennaires; celles-ci assez grandes, triangulaires, terminales et situées contre le bord interne des yeux. — Antennes courtes et grêles, à article 1 épais, pyriforme; 2 court, obconique; 3 et 4 allongés, égaux entre eux, cylindriques; 5 triangulaire, aplani; les suivants dentés au

côté interne, assez larges, subégaux entre eux, spongieux au côté interne et sur leur face inférieure, munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux assez grands, elliptiques, saillants, rapprochés sur le vertex. — Pronotum en trapèze, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière; sa marge antérieure plus ou moins sinueuse; les côtés obliques, droits, sinueux ou arqués; la base faiblement bisinuée; le disque sillonné ou uni; les côtés impressionnés ou fovéolés. — Écusson variable, toujours plus large que long. — Élytres striés, lobés à la base, arrondis à l'épaule, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet, celui-ci acuminé et tridenté avec la dent externe légèrement divergente. — Prosternum large, plan, rebordé sur les côtés et au sommet, le rebord limité intérieurement par une strie nette et profonde; le sommet anguleux et aigu; la marge antérieure variable. — Mésosternum divisé; ses branches latérales assez allongées; la suture métasternale droite. — Métasternum sillonné. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure à peine sinueuse et oblique. — Pattes peu robustes, de longueur variable; fémurs fusiformes, renflés au milieu; tibias grêles et cylindriques, les antérieurs et les médians plus ou moins arqués; tarses variables. — Extrémité du dernier segment abdominal étroitement échancrée entre deux dents aiguës. — Corps peu robuste, naviculaire ou subpisciforme, atténué en avant et acuminé en arrière avec l'apex légèrement divergent.

Je crois pouvoir fonder ce genre pour une série d'espèces à faciès particulier, que je retranche des *Dicercomorpha* qui suivent et avec lesquels ils ont très peu d'affinités. Sans être aussi robustes que les *Cardiaspis*, elles ont avec ceux-ci beaucoup de points communs.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre ne comprend qu'un petit nombre d'espèces disséminées dans la région Indo-malaise, en Mélanésie et en Australie.

1. *H. cupreomacutatus*, Saunders (*Dicercomorpha*), Trans. Ent. Soc. Lond. p. 306, pl. 21, f. 7 (1867) (Philipp.).
2. *H. inæqualis*, H. Deyrolle (*Dicercomorpha*), Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 56 (1864) (Sumatra).
3. **H. aurocuprea*, Kerremans (*Dicercomorpha*), Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 65 (1900) (Ile Rossell).
4. **H. pyrochlora*, Fairmaire (*Dicercomorpha*), Pet. Nouv. Ent. Vol. 2, p. 166 (1877) (Iles Fidji).
5. *H. marginefossa*, Thomson (*Dicercomorpha*), Typ. Bupr. p. 38 (1878) (Aneiteum).
6. **H. coeruleipennis*, Fairmaire (*Dicercomorpha*), Pet. Nouv. Ent. Vol. 2 p. 153 (1877) (Iles Fidji).
7. **H. australicus*, nov. sp. (1) (Australie).

8. *H. scaspinosa*, Thomson (*Chalcophora*), Arch. Ent. Vol. 1, p. 110 (1857) (Bornéo).
9. *H. viridis*, H. Deyrolle (*Dicercomorpha*), Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 57 (1864) (Sumatra).
10. *H. viridula*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 27, pl. 10, f. 112 (1790) (Philippines).
11. *H. Wallisi*, Montrouzier, Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 11 (1855) (Nouvelle-Calédonie).

GENUS DICERCOMORPHA, H. DEYROLLE

Dicercomorpha. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 52, pl. 4, f. 11 (1864).

Caractères. — Tête large; front parsemé de carènes formant un large réseau de mailles irrégulières; épistome échancré, médiocrement allongé; cavités antennaires grandes, triangulaires,

(1) Long. 14; larg. 4.5 mm. — Allongé, atténué avant et acuminé en arrière, gris de plomb verdâtre et brillant, les élytres bleus, les quatre derniers segments abdominaux et les côtés des hanches postérieures bleu d'acier. — Tête déprimée au-dessus de l'épistôme; vertex sillonné. Pronotum sillonné au milieu, le sillon net et linéaire, déprimé de chaque côté à la base et à une certaine distance du bord, les côtés obliques en avant et onduleux en arrière; élytres à stries fines et régulières, les interstries à peine ponctués, les côtés postérieurs dentelés, le sommet tridenté. Dessous à ponctuation fine et très espacée; marge antérieure du prosternum largement échancrée en arc entre deux lobes obtus; strie marginale du prosternum large et peu profonde; une moucheture silleuse et pulvérulente de blanc sur le côté des hanches postérieures et sur celui de chacun des segments abdominaux; extrémité du dernier segment ♀ trifide. — Très voisin du *Cocruleipennis* Fairm., mais les côtés du pronotum plus sinueux et plus obliques, le milieu sillonné, les interstries élytraux plus larges et plus lisses, l'armature terminale des élytres plus accusée, la strie marginale moins creusée, les élytres plus bleus, sans reflets pourprés. — Australie.

limitées en avant par le bord de l'épistome, au côté externe par le bord interne des yeux et au côté interne par une carène qui se prolonge sinueusement sur le front, le long des yeux. — Antennes courtes, dentées à partir du cinquième article, le premier court, épais, obconique; le deuxième plus petit, globulaire; le troisième allongé, subcylindrique, un peu plus court que le quatrième; celui-ci triangulaire; les suivants dentés au côté interne, écourtés, triangulaires, ponctués en dessus, spongieux en dessous et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux gros, saillants, elliptiques, un peu obliques et légèrement rapprochés sur le vertex. — Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian plus ou moins arrondi; les côtés abaissés et déclives en avant. — Ecusson variable, arrondi, carré ou en trapèze, toujours petit. — Elytres médiocrement allongés, assez convexes, subparallèles en avant et brusquement rétrécis en arrière, leur sommet tronqué, subsinueux ou échancré de part et d'autre entre deux dents plus ou moins fortes, l'externe le plus souvent plus accentuée que l'interne. — Prosternum large, plan, grossièrement et inégalement ponctué; sa marge antérieure largement échancrée en arc entre deux lobes latéraux plus ou moins saillants, son sommet largement lobé. — Mésosternum divisé, ses branches latérales étroites; la suture métasternale oblique. — Métasternum échancré en avant et étroitement sillonné au milieu. — Hanches postérieures largement et peu profondément échancrées au côté interne du bord inférieur; la marge antérieure sinueuse, la postérieure obliquement sinueuse et dilatée au côté interne. — Fémurs assez épais, subfusiformes, creusés le long du bord interne pour l'insertion de la partie antérieure du tibia (1); tibias antérieurs légèrement aplanis et spatulés au côté externe de leur extrémité; tarses aplatis, s'élargissant graduellement du 2^e au 4^e article, le premier des postérieurs à peine plus long que le suivant. — Milieu du premier segment abdominal sillonné, largement creusé ou aplani, mais alors toujours un peu concave. — Corps robuste, assez épais, oblong ovale, écourté, atténué en arrière; différences sexuelles extérieures nulles.

Distribution géographique des espèces. — On connaît actuellement neuf espèces de ce genre, disséminées dans les îles de la Malaisie; une d'entre elles se trouve aux îles Andaman et une deuxième aux îles Séchelles. Il n'est donc pas improbable de trouver un jour des représentants du genre à Madagascar et peut-être dans l'Afrique orientale. Cette aire géographique rattache indiscutablement Madagascar à la faune des grandes îles du sud de l'Asie. On n'en connaît aucune espèce sur le continent asiatique, ni en Australie et les limites extrêmes de son habitat, de l'ouest à l'est, sont les îles Séchelles et les Philippines.

1. **D. Allnandi*, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 103 (1893) (Iles Séchelles).
2. *D. farinosa*, Thomson, idem, p. 63 (1879) (Iles Andaman).
3. *D. javanica*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 40, pl. 10, f. 48 (1837) (Java).
4. *D. albosparsa*, Castelnau & Gory, idem, p. 39, pl. 10, f. 47 (Java, Sumatra, Moluques, etc.).
5. *D. multiguttata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 56 (1864) (Dorey : Nouvelle-Guinée).
6. *D. grosseguttata*, Thomson, Typ. Bupr. p. 37 (1878) (2) (Nouvelle Guinée).
7. *D. mutabilis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 314 (1874) (Philippines).
argenteoguttata, Thomson, Typ. Bupr. app. 1a, p. 13 (1879).
viridicollis, Thomson, idem, p. 14.
8. *D. interrupta*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 55, pl. 2, f. 4 (1864) (Céram, Amboine).
9. *D. subcincta*, H. Deyrolle, idem, p. 54 (Ile Bourou).

5. GENUS ECTINOSONIA, SPINOLA

Ectinsonia, Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 6, p. 112 (1837).

Caractères. — Tête plane, très rugueuse; épistome court, étroitement échancré en arc; cavités

(1) A l'exception du *D. Allnandi*, Kerremans, des Iles Séchelles.

(2) Je ne verrais aucun inconvénient à réunir sous le nom de *D. albosparsa*, Castelnau & Gory, cette espèce aux *D. multiguttata*, H. Deyrolle et *D. grosseguttata*, Thomson. Ces trois espèces ne me paraissent différer l'une de l'autre que par les dimensions des fossettes élytrales.

antennaires grandes, trigones, terminales, surmontées d'une forte carène oblique. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; 1 court, épais, obconique; 2 et 3 plus courts, subglobulaires, 2 plus court que 3; les suivants triangulaires et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux médiocres, elliptiques, peu saillants, subparallèles et à peine rapprochés en dessus. — Pronotum large, bisinué et de la largeur de la tête en avant avec un lobe médian arrondi; les côtés arqués en avant et droits en arrière; la base faiblement bisinuée, le disque largement et profondément déprimé. — Ecusson très petit, à peine plus large que long. — Elytres allongés, de la largeur du pronotum à la base, droits sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, brusquement atténués ensuite et acumïnés au sommet; celui-ci bidenté de part et d'autre. — Prosternum large, subconvexe; sa marge antérieure droite ou largement échancrée en arc entre deux lobes avancés et obtus; le sommet lobé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes et un peu obliques, leur suture métasternale horizontale. — Métasternum sillonné au milieu. — Hanches postérieures très obliques, sinueuses et échancrées au côté interne du bord inférieur. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs subfusiformes, les suivants subcylindriques et légèrement aplanis; tibias grêles, subcylindriques, légèrement élargis à leur sommet, les médians et les postérieurs un peu cintrés en dehors; tarsi triangulaires, s'élargissant graduellement du premier au quatrième article, le premier des postérieurs à peine plus long, que le suivant. — Premier segment abdominal sillonné au milieu; extrémité du dernier segment ♂ tronquée, ♀ arrondie ou subacuminée. — Corps assez robuste, arrondi en avant, droit sur le milieu des côtés, acumïné au sommet; faciès de certains *Dicerca*, mais moins élancé.

Lacordaire ne voit dans ce genre qu'une série de *Psiloptera* dont le faciès se rapproche de celui des *Dicerca*. Je pense que Spinola a valablement établi cette coupe générique. Si ses caractères se rapprochent beaucoup de ceux des *Psiloptera*, par contre la présence de fossettes porifères et la position de celles-ci, le faciès et plusieurs caractères secondaires permettent de placer ce genre parmi les *Dicercites*.

Distribution géographique des espèces. — Les *Ectinogonia* sont répandus sur le versant occidental de la Cordillère des Andes, dans l'Amérique du Sud, depuis le Pérou jusqu'au Chili.

1. **E. bilineata*, Latreille, Voy. Humb. Ins. Vol. 2, p. p. 60, pl. 34, f. 2 (1833) (Pérou).
bistrigosa, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 88, pl. 15, f. 84 (1840).
2. **E. angulicollis*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 710 (1858) (Chili).
3. *E. Buqueti*, Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 112 (1837) (Chili).
Dufouri, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 107, pl. 27, f. 147 (1837).
4. **E. intermedia*, nov. sp. (1) (Chili).
5. *E. Descaini*, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 500, pl. 4, f. 9 (1851) (Chili).
6. **E. fastidiosa*, Fairmaire, Rev. et Mag. Zool. p. 259 (1864) (Chili).
7. **E. verrucifera*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 713 (1858) (Chili).
8. **E. costata*, Fairmaire, idem, p. 622 (1867) (Chili).
9. **E. speciosa*, Germain, An. Univ. Chile, p. 392 (1855) (Chili).
* *metallica*, Fairmaire, Rev. Mag. Zool. p. 485 (1856) (2).
10. *E. circumsulcata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 107, pl. 27, f. 146 (1837) (Pérou).
nivalis, Sturm, Denks. Akad. Wiss. Wien, p. 52 (1853).
11. *E. americana*, Herbst, Col. Vol. 9, p. 107, pl. 148, f. 3 (1801) (Chili).
* *Germaini*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 266 (1864).
12. **E. denticollis*, Fairmaire, idem, p. 267 (Chili).
13. *E. cariosa*, Nonfried, Ent. Nachtr. p. 18 (1894) (3) (Brésil intérieur).

(1) Long. 36; larg. 10 mm. — Ovalaire, arrondi en avant, les côtés parallèles, brusquement atténué au tiers postérieur et acumïné au sommet bronzé terne et mat en dessus, bronzé cuivré très brillant en dessous. — Très voisin du *Buqueti*, Spinola, intermédiaire entre celui-ci et le *Descaini*, Solier, différent du premier par la coloration plus terne et plus mate du dessus, par les impressions du pronotum plus nettes et plus profondes, limitées par un large calus arqué et lisse, par les élytres crénelés seulement le long des épipleures et lisses ensuite le long des bords où l'on remarque seulement les amas pointillés qui se voient sur les côtés, les points des stries plus ronds et plus réguliers, celles-ci sérialement disposées avec les interstries pairs moins saillants et non boursoufflés par endroits, les impairs pointillés, les côtés du pronotum plus dilatés en avant, le faciès plus élancé. Très différent du second par la structure élytrale. — Valparaiso.

(2) Les *E. verrucifera*, Fairmaire & Germain, *costata*, Fairmaire et *speciosa*, Germain, ne diffèrent à proprement parler que par la coloration. Ils pourront probablement être réunis sous le dernier nom.

(3) L'habitat de cette espèce, qui m'est inconnue, me laisse des doutes quant à la validité du maintien dans le genre.

6. GENUS TRACHYKELE, MARSEUL

Trachykele. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 149 (1865).

Caractères. — « Ovale allongé, peu convexe, d'un bronzé assez brillant, raboteux. Tête large, » enfoncée jusqu'aux yeux, fortement inclinée, à peine convexe sur le front; épistome court, échancré » avec les angles arrondis; yeux ovales, assez petits, peu convexes, distants. Labre transverse, échancré » muni d'une pièce auxiliaire. Mandibules fortes, rugueuses à la base, subitement arquées en pointe et » lisses. Menton large, trapézoïde, corné. Palpes grêles; maxillaires à articles allongés, 1-3 obconiques, » 4^e subfiliforme, tronqué au bout; dernier article des labiaux court, élargi, tronqué au bout.

» Antennes grêles, longues, dentées en dedans, insérées dans une cavité en fente peu profonde, » mal limitée, du milieu de laquelle s'élève un tubercule frontal portant l'antenne, placé à peu près à » égale distance des yeux et de l'angle de l'épistome, 1^{er} article assez long, gros, renflé au bout, 2^e obco- » nique, un peu plus petit, 3^e subcylindrique de moitié plus long, les suivants en triangle allongé, » diminuant peu de longueur, creusés au bout d'une fossette porifère bien marquée.

» Pronotum plus large que long, tronqué droit en devant, bisinué à la base, rétréci aux deux bouts, » étroitement rebordé sur les côtés et dilaté, convexe, relevé dans son pourtour et fovéolé. Ecusson nul.

» Elytres plus larges et près de 4 fois plus longues que le pronotum, subparallèles et atténuées au » bout en pointe obtuse; variolées et rugueuses, un peu rebordées, subdenticulées par derrière; calus » huméral très saillant.

» Bord pectoral coupé droit en devant, renflé au milieu. Prosternum large, un peu creusé dans » sa longueur, terminé en triangle très aigu. Mésosternum bien séparé du métasternum, formant les » côtés de la coulisse; épipleures parallèles, libres; hanches postérieures dilatées en dedans, sinuées à » l'articulation et dentées en dehors.

» Pattes insérées à égale distance l'une de l'autre, sur deux lignes parallèles peu éloignées; peu » robustes, allongées; cuisses antérieures un peu renflées. Tarses allongés, grêles; 1-4 articles garnis de » pelottes en dessous; 1^{er} des postérieurs de moitié plus long que le 2^e, 3-4 bilobés et un peu plus larges, » 5^e assez long, étroit, garni de 2 crochets simples. Abdomen à segments coupés droit par derrière, » parallèles transversalement; 1-2 soudés ensemble, mais soudure bien marquée; dernier segment » sinueusement allongé en pointe obtuse.

» Ce genre a un faciès qui lui est propre et tellement tranché, qu'on ne peut le rapprocher d'aucun » autre. Le seul avec lequel il ait des rapports de forme très éloignés, c'est le *Dicerca Dumolini*. Il est » établi sur une seule espèce, trouvée à Paris, à l'entrepôt des douanes, sortant d'un cèdre du Liban, par » M. Blondel, et son nom rappelle ses élytres raboteuses, variées d'enfoncements et d'élévations plus ou » moins renflées.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre, qui m'est inconnue et dans laquelle de Marseul n'aurait pu reconnaître le *Buprestis Le Contei*, Gory, tant la description est insuffisante et la figure peu reconnaissable, ne provient pas du Liban, mais du Mexique. La figure d'après Gory, ne correspond aucunement à celle que donne M. Waterhouse (Biol. Centr.-Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 7, pl. 1, f. 8, 1882).

1. *T. Le Contei*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 107, pl. 18, f. 104 (1840) (Mexique).

Blondeli, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 150 (1865).

7. GENUS DICERCA, ESCHSCHOLTZ

Dicerca. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 9 (1829); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 93, pl. 24 (1837); Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 6, p. 101 (1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 35 (1857); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 32 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 137 (1865).

Argante. Gistl, Ins. Doubl. (1834) (1).

Stenuris. Kirby, Faun. Bor. Amer. p. 154 (1837).

Caractères. — Tête plane et rugueuse; épistome échancré en demi cercle; cavités antennaires assez grandes, triangulaires, peu profondes, munies de tubercules. — Antennes courtes et grêles, dentées au côté interne et munies d'une fossette porifère inférieure à partir du 5^e article; 1 épais et court; 2 et 3 plus courts, obconiques, subégaux entre eux; 4 plus allongé, obconique; les suivants dentés en scie aiguë. — Pronotum plus large que long, le plus souvent rétréci en arrière avec les angles postérieurs aigus; la base bisinuée. — Ecusson très petit, arrondi et subquadrangulaire. — Elytres allongés, sinués à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur et très acuminés ensuite jusqu'au sommet où ils forment souvent un prolongement caudal très accentué; l'apex inerme, sinueux ou bidenté. — Prosternum plan, concave ou sillonné; sa marge antérieure renflée, sinueuse ou bilobée; son sommet anguleusement arrondi ou acuminé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales assez allongées; la suture métasternale oblique. — Métasternum lobé en avant et sillonné au milieu; ses épipleures rectangulaires. — Hanches postérieures très dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la postérieure échancrée en dedans et terminée en pointe obtuse. — Pattes assez fortes; fémurs subcylindriques et renflés au milieu; tibias cylindriques, les antérieurs spatulés au sommet; tarses assez larges, le premier article des postérieurs à peine plus long que le suivant. — Milieu du premier segment abdominal aplani, creusé ou sillonné; extrémité du dernier segment variable suivant l'espèce et le sexe. — Corps allongé, ovalaire; assez convexe, toujours acuminé ou bifurqué au sommet.

Distribution géographique des espèces. — On connaît 33 espèces de ce genre, qui est confiné dans la grande zone paléarctique comprenant l'Amérique du Nord, l'Europe, le Nord de l'Afrique, l'Asie Septentrionale et le Nord du Japon; quatre des espèces Américaines s'étendent jusqu'au Mexique.

1. *D. divaricata*, Say, Jour. Acad. Philad. Vol. 3, p. 13 (1823) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).
tenebrica, Kirby, Fauna Bor. Amer. p. 155 (1837).
dubia, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 142 (1846).
aurichalcea, Melsheimer, idem, p. 142.
parumpunctata, Melsheimer, ibidem, p. 243.
candata, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 194 (1859).
prolongata, Le Conte, idem, Vol. 12, p. 194 (1860).
2. *D. sexualis*, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 87 (1873) (Orégon).
3. *D. acuminata*, Pallas, Icon. Ins. p. 69 (1782) (Crimée, Sibérie).
furcata, Thunberg, Mus. Act. Upsal. Vol. 4, p. 52 (1787).
calcarata, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 188 (1801).
* *acuminata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 141 (1865).
4. *D. punctulata*, Schoenherr, Syn. Ins. Vol. 3, p. 123 (1817) (Etats Unis d'Amérique).
transversa, Say, Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York, Vol. 1, p. 219 (1825).
5. *D. Horni*, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 86 (1873) (Californie).
6. *D. pugniosa*, Germar, Ins. Spec. Nov. p. 37 (1824) (Etats-Unis d'Amérique).
7. *D. obscura*, Fabricius, Spec. Ins. Vol. 1, p. 274 (1781) (Etats-Unis, Floride).
lurida, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 190 (1801).
baltimorensis, Herbst, Col. Vol. 9, p. 99, pl. 148, f. 7 (1801).
consimilis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 104, pl. 27, f. 142 (1839).
pruinosa, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 109, pl. 19, f. 106 (1840).
indistincta, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 143 (1846).
soror, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 197 (1860).
8. *D. fritillum*, Menetries, Cat. Rais. p. 149 (1832) (Arménie).
9. *D. chlorostigma*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 55 (1837) (Caucase).

(1) Il semble avoir été tacitement convenu de ne pas tenir compte des travaux fantaisistes de Gistl; je pense toutefois qu'il y a lieu de le citer lorsqu'un auteur sérieux en fait mention. Marseul signale les *Argante* et en fait une division du genre *Dicerca*; c'est l'unique raison pour laquelle je cite le nom d'*Argante*, bien que j'estime qu'il n'y a pas lieu de maintenir la division.

10. *D. alni*, Fischer, Ent. Vol. 2, p. 191, pl. 21, f. 6 (1823) (Europe centrale et méridionale).
mariana, † De Geer, Mém. Ins. Vol. 4, p. 128 (1774).
fagi, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 103, pl. 26, f. 140 (1837).
calcarata, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 55 (1837).
* *alni*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 142 (1865).
 11. *D. berolinensis*, Herbst, Besch. Berl. Nat. Vol. 4, p. 311 (1779) (Europe centrale, Algérie, Sibérie).
gigantea †, Scopoli, Ent. Carn. p. 60 (1763).
calcarata, Schall, Abd. Hall. Nat. Vol. 1, p. 310 (1783).
* *berolinensis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 138 (1865).
 12. *D. aenea*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 2, p. 662 (1758) (Europe centrale et méridionale).
cuprea, Scopoli, Ent. Carn. p. 62 (1763).
subrugosa, Paykhuil, Faun. Succ. Vol. 2, p. 218 (1778).
oxyptera, Pallas, Icon. Ins. p. 70, pl. D. f. 11 (1781).
austriaca, Schrank, Enum. Ins. p. 195 (1781).
reticulata, Fabricius, Syst. Ent. Vol. 4, p. 451 (1794).
carniolica, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 189 (1801).
scabrosa, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 54 (1837).
* *aenea*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 139 (1865).
bella, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 259 (1891).
 13. *D. spreta*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 108, pl. 19, f. 105 (1840) (Etats-Unis d'Amérique).
impressifrons, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 144 (1846).
 14. *D. tenebrosa*, Kirby, Fauna Bor. Amer. Vol. 4, p. 155, (1837) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).
distinguenda, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 100, pl. 26, f. 127 (1837).
chrysea, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 143 (1846).
crassicollis, Le Conte, Ent. Rep. p. 45 (1857).
lugubris, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 200 (1860).
bifoveata, Le Conte, idem, p. 202.
lacustris, Le Conte, ibidem, p. 202.
 15. **D. Dumolini*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis* p. 98, pl. 25, f. 133 (1837) (E.-U., Sén. (1)
tuberculata, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 65 (1838).
consobrina, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 145 (1846).
 16. *D. tuberculata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 99, pl. 25, f. 55 (1837) (E.-U., Mex.).
asperata, Castelnau & Gory, idem, p. 105, pl. 27, f. 143.
* *scobina*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 66 (1838).
molitor, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 144 (1846).
hilaris, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 200 (1860).
manca, Le Conte, idem, p. 201.
 17. *D. moesta*, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 206 (1794) (Autriche, Hongrie).
quadrilincata, Herbst, Col. Vol. 9, p. 104, pl. 143, f. 8 (1801).
* *moesta*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 146 (1865).
-
18. *D. aeneovaria*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 12, pl. 1, f. 14 (1882) (Mexique).
 19. *D. aino*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 328 (1892) (Japon).
 20. *D. amphibia*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 145 (1865) (Sibérie).
 21. *D. californica*, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., p. 87 (1873) (Californie).
 22. *D. Herbsti*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 40 (1857) (Allemagne méridionale).
quadrilineata || Charpentier, Hor. Soc. Ent. Ross. p. 187.
 23. *D. inconspicua*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 12 (1882) (Mexique).
 24. *D. Latouchei*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. 622 (1899) (Amoy).
 25. *D. lepida*, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 7 (1857) (Amérique septentrionale).
fugionota † Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 99, pl. 26, f. 136 (1839).
 26. *D. mutica*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 196 (1860) (Etats-Unis d'Amérique).
 27. *D. oblusa*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 314 (1882) (Samarkande).
 28. *D. pectorosa*, Le Conte, Rep. Surv. p. 145 (1857) (Orégon).

(1) L'unique exemplaire ♂ que je possède de cette espèce est un type de Gory étiqueté comme provenant des Etats-Unis, bien que la description de cet auteur donne pour patrie, au *Dumolini*, le Sénégal. Marseul signale également cette espèce comme provenant du Sénégal et Chevrolat en décrivant la *tuberculata*, qui passe en synonymie, lui donne aussi l'Afrique occidentale pour patrie. Par contre, Melsheimer décrit un *consobrina* comme provenant des Etats-Unis. Il n'est pas impossible que cette espèce habite deux régions bien distinctes, mais le cas est assez rare pour qu'il soit élucidé. Je pense qu'il ne se produit, dans la famille des *Buprestides*, que chez deux ou trois espèces d'*Anthaxia*, communes à l'Europe et à l'Amérique du Nord.

29. *D. Plasoni*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. 7, p. 70 (1888) (Arménie).
30. *D. propinqua*, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 12, pl. 1, f. 12 (1882) (Mexique).
31. *D. scabida*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 140 (1865) (Perse).
32. *D. tibialis*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 328 (1892) (Japon).
33. *D. validiuscula*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 319 (1895) (Transcaucasie).

8. GENUS POECILONOTA, ESCHSCHOLTZ

Poecilonota. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 9 (1829); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 298, pl. 12, f. 23 (1833); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 36 (1857); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 42 (1857); Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. 151 (1865).

Caractères. — Tête subplane, légèrement creusée en avant au-dessus de l'épistome; celui-ci étroitement échancré entre deux lobes obtus; cavités antennaires assez grandes et triangulaires. — Antennes courtes, dentées au côté interne et munies d'une fossette porifère inférieure à partir du 4^e article; 1 épais, obconique et faiblement arqué; 2 plus court, obconique; 3 trois fois aussi long que 2, subtriangulaire; 4 presque aussi long, plus triangulaire; les suivants subégaux entre eux et diminuant graduellement en longueur. — Yeux médiocres, elliptiques, un peu obliques et légèrement rapprochés en-dessus. — Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, bisinué au sommet et à la base; les côtés obliques et plus au moins arqués, le milieu du disque caréné longitudinalement. — Ecusson deux fois aussi large que haut, souvent rétréci en avant. — Elytres ponctués et striés, variolés de reliefs irréguliers; élargis au tiers postérieur, appendiculés ou bidentés au sommet. — Prosternum large en avant, acuminé en arrière, bordé d'une carène limitée intérieurement par une strie bien marquée; sa marge antérieure tronquée ou faiblement bisinuée. — Mésosternum divisé, ses branches latérales courtes et un peu obliques; la suture métasternale un peu oblique. — Hanches postérieures très sinueuses en avant et très obliques en arrière, échancrées et bidentées au côté interne. — Pattes peu robustes, semblables dans les deux sexes; fémurs antérieurs et médians fusiformes, les postérieurs subcylindriques, aplanis sur leurs deux faces; tibias grêles, subcylindriques, les postérieurs légèrement cintrés en dehors; articles des tarses croissant en largeur et diminuant en longueur, le premier des postérieurs plus long que le suivant. — Milieu du premier segment abdominal sillonné; extrémité du dernier segment échancré étroitement ♀ ou largement ♂. — Corps ovalaire, peu convexe, avec ou sans appendice caudal, bronzé cuivreux ou verdâtre.

Distribution géographique des espèces. — Je ne connais que trois espèces pouvant rester dans ce genre, dont je retranche tous les *Poecilonota* décrits comme tels, différents par le faciès et par l'absence d'un sillon sur le premier segment abdominal; ceux-ci constituent le genre *Lampra* qui suit. Des trois *Poecilonota* connus, deux habitent l'Amérique du Nord et le troisième la région paléarctique.

1. *P. cyanipes*, Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 1645 (1823) (Etats-Unis d'Amérique).
erecta, Gory, Mon. Bupr. Vol. 4, p. 110, pl. 19, f. 108 (1840).
ferrea, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 144 (1846).
debilis, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 204 (1860).
2. *P. thureura*, Say, Ins. Louisiana, p. 3 (1832) (Etats-Unis d'Amérique).
costicollis, Gory, Mon. Bupr. Vol. 4, p. 109, pl. 19, f. 107 (1840).
3. *P. variolosa*, Paykhull, Fauna Suec. Vol. 5, p. 219 (1799) (Région méditerr., Kirghisie, Sibérie).
rustica †, Herbst, Arch. p. 174 (1787).
tenebrionis, Panzer, Enum. Syst. p. 2 (1799).
conspersa, Gyllenhal, Ins. Suec. Vol. 1, p. 441 (1801).
plebeja, Herbst, Col. Vol. 9, p. 158, pl. 146, f. 9 (1801).
* *conspersa*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 155 (1865).
* *diceroides*, Reitter, Deut. Ent. Zeit. Vol. 32, p. 426 (1888).
alba, Richard,
setulosa, Fleichner,
tremulac, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 275 (1896).

9. GENUS LAMPRA, LACORDAIRE

Lampra. Lacordaire, Faune Ent. Paris, Vol. 1, p. 595 (1832); Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 108 (1832); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 153 (1865); Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 25, p. 145 (1881).

Ovalisia. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 68 (1900).

Poecilnота. Auct. pars.

Caractères. — Tête subplane, légèrement creusée au-dessus de l'épistome; vertex avec un fin sillon linéaire; épistome à peine échancré entre deux petits lobes aigus; cavités antennaires grandes, triangulaires peu profondes, situés contre le bord interne des yeux à une certaine distance du prolongement latéral du bord de l'épistome. — Antennes courtes, dentées au côté interne et munies d'une fossette porifère inférieure à partir du 4^e article; 1 épais, obconique; 2 plus court, subglobulaire; 3 allongé, triangulaire; les suivants en triangle élargi. — Yeux assez grands, elliptiques, un peu obliques et légèrement rapprochés en dessus. — Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, faiblement bisinué au sommet avec l'angle antérieur obtus, les côtés plus ou moins obliques et plus ou moins arqués avec une carène marginale rugueuse formant la limite de l'angle postérieur, mais n'atteignant pas le milieu des côtés; la base bisinuée. — Ecusson variable, toujours petit et souvent plus large que long. — Elytres allongés, rebordés à l'épipleure, légèrement sinueux à hauteur des hanches postérieures, la marge latérale très légèrement relevée en gouttière, rugueuse ou dentelée au tiers postérieur, le sommet variable. — Prosternum large et plan; sa marge antérieure droite, les côtés striés en arrière, la strie limitant un bourrelet marginal; le sommet obliquement cintré sur les côtés et lobé au milieu. — Mésosternum divisé; ses branches latérales un peu obliques et arquées; la suture métasternale horizontale. — Métasternum sillonné au milieu, légèrement échancré en avant. — Hanches postérieures sinueuses en avant et obliques en arrière, dilatées au côté interne avec une petite échancrure limitant le lobe interne. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes et renflés, les postérieurs subcylindriques, un peu aplanis sur leurs deux faces et légèrement renflés au milieu; tibias médiocres, subcylindriques, légèrement élargis au sommet; tarses assez robustes, les articles 1 à 4 croissant en largeur et diminuant en longueur, lamellés, 3-4 cordiformes, la 1^{re} des postérieurs un peu plus long que le suivant. — Premier segment abdominal non sillonné au milieu; extrémité du dernier segment ♂ échancrée, ♀ tronquée. — Faciès peu robuste; corps ovalaire; peu convexe; coloration très brillante, verte ou cuivreuse variée de bleu plus ou moins foncé.

J'estime qu'en raison du faciès, il y a lieu de séparer les *Lampra* des *Poecilnота*; les premiers sont plus étroits et plus parallèles que les seconds, ils ont le bord des élytres denticulé ou rugueux et ne présentent pas de sillon prosternal et abdominal. La différence de la coloration est constante. Quant au genre *Ovalisa* que j'avais cru pouvoir créer pour une espèce océanienne décrite autrefois par H. Deyrolle, il ne présente pas de caractères suffisants pour le séparer des *Lampra*.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend une quarantaine d'espèces répandues dans la région méditerranéenne et s'étendant jusque dans l'Inde, dans les îles de la Malaisie, au Japon et jusqu'en Micronésie. On n'en connaît aucune espèce de l'Amérique et de l'Australie et le genre ne paraît pas être représenté dans l'Afrique trans-saharienne ni à Madagascar.

Le nombre des espèces paraît avoir été exagéré et je ne doute pas que nombre d'entre elles passeront, par la suite, en synonymie.

1. *L. limbata*, Gebler, Mém. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 41 (1832) (Crimée, Mongolie).

* *limbata*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 4, p. 22 (1852).

2. *L. nobilissima*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 4, p. 278 (1852) (Tyrol).

3. *L. dives*, Guillebeau, Rev. Ent. Caen, p. 7 (1889) (France).

decipiens † Redtenbacher.

4. *L. gloriosa*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 160 (1865) (Syrie).
 5. *L. Solieri*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 116, pl. 29, f. 159 (1837) (Région méditerr.)
hieroglyphica, Mulsant & Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 5 (1854).
Guiraoi, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 315 (1855).
* *Solieri*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 162 (1865).
 6. *L. rutilans*, Fabricius, Gen. Ins. p. 235 (1777) (Europe centrale et méridionale).
acruuginosa, Herbst, Schr. Berl. Nat. p. 91 (1780).
rustica, Schrank, Enum. Ins. Austr. p. 194 (1781).
fastuosa, Jacq. Duval, Misc. Ent. Vol. 2, p. 385 (1832).
* *rutilans*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 159 (1865).
inornata, Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 66, p. 367 (1897).
 7. *L. decipiens*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 4, p. 280 (1852) (Europe centrale et méridion.).
limbata || Mannerheim, idem, Vol. 8, p. 59 (1837).
mirifica, Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 1416 (1855).
* *decipiens*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 161 (1865).
 8. *L. bella*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 116, pl. 20, f. 144 (1840) (Asie mineure).
balcania, Kirschberg, Ent. Monatsb., Berl. Vol. 1, p. 59 (1876).
 9. **L. subangulosa*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 32 (1889) (Chine).
 10. **L. Beauchenei*, Fairmaire, idem, p. 346 (1888) (Tonkin).
 11. **L. magnifica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 171 (1892) (Bengale).
 12. **L. tonkinea*, Kerremans, idem, Vol. 39, p. 210 (1895) (Tonkin).
 13. *L. festiva*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 2, p. 663 (1758) (France, Algérie, etc.).
decemmaculata, Rossi, Mant. Ins. Vol. 2, p. 101, pl. 3. f. e (1794).
decempunctata, Fabricius, Ent. Syst. p. 136 (1794).
* *festiva*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 163 (1865).
 14. **L. cupreosplendens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 210 (1895) (Chine).
 15. *L. auricollis*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 63 (1864) (Iles Salomon).
* *insularis*, Kerremans (*Ovalisia*), Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 68 (1900).
-
16. *L. aenea*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 59 (1864) (Sumatra).
 17. *L. apicalis*, H. Deyrolle, idem, p. 61 (Malacca).
 18. *L. bellula*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 329 (1892) (Japon).
 19. *L. Bonnairei*, Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 64 (1884) (Batna).
 20. *L. elongata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 209 (1895) (Chine).
 21. *L. fastidiosa*, Rossi, Faun. Etrus. p. 186 (1790) (Italie septentrionale).
 22. *L. gentilis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 116, pl. 30, f. 160 (1837) (Bengale).
 23. *L. leoparda*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 62 (1864) (Bornéo).
leopardina, Thomson, Typ. Bupr. p. 40 (1878).
 24. *L. modesta*, Guillebeau, Rev. Ent. Caen, Vol. 8, p. 5 (1889) (Europe).
 25. *L. nigrofasciata*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 511 (1867) (Penang).
 26. *L. nigroguttata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 62 (1864) (Bornéo).
 27. *L. pantherina*, H. Deyrolle, idem, p. 60 (Bornéo).
 28. *L. pretiosa*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 4, p. 276 (1832) (Mongolie).
 29. *L. Provosti*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 321 (1887) (Chine).
 30. *L. psilopteroides*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 59 (1864) (Bornéo).
 31. *L. Rodeti*, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. Vol. 40, p. 298 (1895) (Chine).
 32. *L. Semperi*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 315 (1874) (Luçon).
 33. *L. setulosa*, Fleischer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 15 (1896) (Taygetos).
 34. *L. subcoerulea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 210 (1895) (Pedong).
 35. *L. suturalis*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 64 (1864) (Gilolo).
 36. *L. Tschitscherini*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 180 (1895) (Sibérie).
 37. *L. Tuerki*, Ganglbauer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 1, p. 135 (1882) (Astrabad).
 38. *L. vicina*, Guillebeau, Rev. Ent. Caen, Vol. 8, p. 3 (1889) (Asie mineure).
 39. *L. virgata*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 253 (1859) (Chine septentrionale).
 40. *L. vivata*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 329 (1892) (Japon).

10. GENUS *CHALCOPOECILA*, THOMSON

Chalcoipoecila. (H. Deyrolle mss.), Saunders, Cat. Bupr. p. 31 (1871), non décrit; Thomson, Typ. Bupr. p. 37 (1878).

Caractères. — Tête déprimée longitudinalement, la dépression plus profonde en avant qu'en arrière; épistome anguleusement échancré entre deux lobes arrondis et légèrement relevés en gouttière; vertex avec un fin sillon linéaire prolongé en avant jusqu'au milieu du front; cavités antennaires petites, arrondies, limitées par le bord interne des yeux et le lobe épistomal, surmontées d'une carène courte, épaisse et triangulaire. — Antennes courtes, à article 1 épais, obconique et légèrement courbe; 2 et 3 courts, obconiques et subégaux entre eux; les suivants dentés au côté interne, épais, triangulaires, subégaux entre eux et munis de deux fossettes porifères, l'une inférieure et l'autre située sur la tranche interne. — Yeux assez grands, saillants, elliptiques, obliques et légèrement rapprochés en dessus. — Pronotum grand, large, convexe sur le disque, aplani et déprimé sur les côtés, de la largeur de la tête et bisinué en avant, largement arqué sur les côtés et sinueux ensuite avec l'angle postérieur légèrement saillant en dehors, un peu abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian anguleux. — Ecusson très petit, carré. — Elytres larges, arrondis à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches postérieures, conjointement arrondis au sommet, dentelés sur les bords à partir du repli épipleural jusqu'à l'extrémité. — Prosternum large, subconvexe; sa marge antérieure faiblement arquée, son sommet largement trifide, l'extrémité obtusément arrondie. — Mésosternum divisé; ses branches latérales obliques; la suture métasternale horizontale. — Métasternum silloné au milieu et étroitement échancré en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne, leurs marges sinueuses et subparallèles le long du côté externe. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians subfusiformes, les postérieurs cylindriques; tibias subcylindriques, légèrement élargis au sommet, simples et semblables dans les deux sexes; tarses assez robustes, larges, les articles 1 à 4 fortement bilobés et légèrement comprimés, le dernier des postérieurs semblable aux suivants. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ largement et peu profondément échancré entre deux dents obtuses, ♀ subtronquée, à peine échancrée. — Corps large, robuste, elliptique et arrondi au sommet; villosité du dessous très accentuée ♂, plus courte et moins dense ♀.

Distribution géographique des espèces. — Les deux espèces admises dans ce genre, et dont une seule m'est connue en nature, proviennent la première du Chili et la seconde de la province de Mendoza en République Argentine.

1. *C. ornata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 93, pl. 16, f. 90 (1840 (Chili)).

elegans, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 145 (1860).

impressa, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (1864)

2. *C. Leyboldi*, Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. Vol. 15, p. 563 (1872) (Mendoza).

11. GENUS *NEOBUPRESTIS*, NOV. GEN.

Caractères. — Tête plane; épistome faiblement échancré; cavités antennaires assez grandes, subarrondies et terminales. — Antennes presque aussi longues que la tête et le pronotum réunis, à article 1 conique, allongé, renflé au bout; 2 très court, obconique; 3 triangulaire; les suivants triangulaires, plus longs que larges, dentés au côté interne, spongieux et munis d'une fossette porifère inférieure; le dernier petit, obconique. — Yeux médiocres, elliptiques, insérés à une certaine distance de la marge antérieure du pronotum, un peu obliques et légèrement rapprochés en dessus. — Pronotum large, plan sur le disque, déclive sur les côtés; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian subanguleux; les côtés obliquement et régulièrement arqués avec l'angle antérieur abaissé et aigu et le postérieur obtus; la base subsinueuse, presque tronquée. — Ecusson petit, transversal. — Elytres

oblongs, tronqués à la base, peu sinueux sur les côtés, arrondis et inermes au sommet avec quatre fines côtes longitudinales, les espaces intercostaux chagrinés et ponctués. — Prosternum large, plan ou subconvexe, à strie marginale entière; sa marge antérieure droite et bombée, déclive vers la tête; son sommet anguleux et acuminé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes, étroites et perpendiculaires; la suture métasternale horizontale. — Métasternum étroitement échancré en avant et à peine sillonné au milieu. — Hanches postérieures très obliques et distinctement dilatées au côté interne; leur marge antérieure subsinueuse, la postérieure oblique et cintrée en dedans. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians un peu plus renflés et plus fusiformes que les postérieurs; tibias subcylindriques, élargis au bout et semblables dans les deux sexes; tarses s'élargissant graduellement du 1^{er} au 4^e article, subcomprimés, 2 à 4 bilolés, le premier article des postérieurs un peu plus long que le suivant. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ largement échancrée en arc entre deux dents aiguës, ♀ prolongée suivant un lobe avancé, subtriangulaire, tronqué ou subarrondi à son sommet. — Corps allongé, oblong, peu convexe; faciès rappelant celui des *Castalia*, mais entièrement différent de ceux-ci par toute une série de caractères qui le rangent incontestablement parmi les *Buprestini*.

M. Blackburn, en décrivant l'espèce qui constitue le type de ce genre, en fait un *Strigoptera*, nom donné par Dejean aux espèces admises dans le genre *Castalia* de Castelnau & Gory. Le premier nom était un nom de catalogue; c'est donc le second qui a prévalu et je ne pense pas que l'on puisse reprendre le nom de *Strigoptera* pour le donner à un genre nouveau.

En même temps que son *Strigoptera australis*, M. Blackburn a décrit deux autres espèces dont je ne connais que la description; celle-ci n'insiste pas suffisamment sur certains caractères essentiels: sternum, fossettes porifères, etc., mais l'auteur les rapproche de l'*australis* en les décrivant sous le nom générique de *Strigoptera*. Je les maintiens donc provisoirement parmi les *Neobuprestis*.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement australien.

1. **N. australis*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 6; p. 501 (1891) (Australie).

2. *N. Frenchi*, Blackburn, idem, p. 500 (Victoria).

3. *N. marmorata*, Blackburn, ibidem, p. 501 (Australie méridionale).

12. GENUS CINYRA, CASTELNAU & GORY

Cinyra. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 157, pl. 39 (1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 45 (1857).

Cynira. Saunders, Cat. Bupr. p. 47 (1871).

Caractères. — Tête rugueuse, plane, déprimée en avant; épistome court, échancré entre deux lobes anguleux et obtus; cavités antennaires trigones, recouvertes par un rebord frontal et terminales. — Antennes assez longues et grêles, à article 1 épais, renflé au bout; 2 très court, globulaire; 3 et 4 allongés, triangulaires, subégaux et chacun aussi long que le premier; les suivants triangulaires, dentés au côté interne, décroissant peu à peu et munis d'une fossette porifère subterminale, située au sommet de la face inférieure (1). — Yeux assez gros, saillants, elliptiques, un peu obliques et rapprochés sur le vertex. — Pronotum plus large que haut, en trapèze; la marge antérieure bisinuée; les côtés subsinueux et obliquement atténués en avant; la base bisinuée. — Ecusson variable, médiocre ou petit, souvent plus large que haut. — Elytres allongés, subtronqués à la base, rétrécis subacuminés en arrière, obliquement tronqués, échancrés et bidentés au sommet. — Prosternum large, plan; sa marge antérieure droite, le sommet acuminé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales allongées et un peu obliques; la suture

(1) Lacordaire dit « fossettes porifères terminales ». Je crois que dans le cas présent, elles sont plutôt inférieures puisqu'elles se trouvent au sommet de la face inférieure et non sur la troncature terminale.

métasternale oblique. — Métasternum sillonné au milieu et lobé en avant. — Hanches postérieures très obliques et dilatées au côté interne en arrière; leur marge antérieure droite; la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes; tibias antérieurs ♂ un peu plus arqués que ♂; les postérieurs et les médians subcylindriques; tarses assez allongés, les postérieurs à article 1 subcylindrique, plus long que 2, celui-ci plus court, mais semblable à 1, 3 trigone, 4 court, bilobé, 5 grêle. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ étroitement et profondément échancrée; ♀ largement et faiblement échancrée entre deux courtes dents aiguës. — Corps allongé, étroit, atténué en arrière, vert ou bronzé brillant, souvent avec des fossettes claires.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, qui ne comprend qu'un petit nombre d'espèces, paraît exclusivement confiné dans la région intertropicale de l'Amérique, depuis le Mexique jusqu'au Brésil, en y comprenant les Antilles. M. Ed. Saunders, dans son *Catalogue* de 1871, fait entrer dans ce genre le *Cisseis spilota*, Hope, de l'Australie. Ne connaissant pas cette espèce, je fais comme lui, mais avec doute.

1. *C. viridipunctata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 24, (1879) (Colombie, Guyanes, Brésil).

2. *C. arcuata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 159, pl. 39, f. 219 (1837) (Brésil).

3. *C. sulcifera*, Castelnau & Gory, idem, p. 158, pl. 39, f. 217 (Guyanes).

4. *C. costulata*, Castelnau & Gory, ibidem, p. 159, pl. 39, f. 220 (Mexique).

* *polystigma*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 78 (1838).

5. *C. albonotata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 149, pl. 36, f. 205 (1837) (Haïti).

6. *C. multipunctata*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 87, pl. 12, f. 137 (1790) (Cuba).

7. *C. aequalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 174 (1889) (Mexique).

8. *C. carinata*, Silbermann, Rev. d'Ent. Vol. 5, p. 107 (1838) (Brésil).

9. *C. costulifera*, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 579 (1867) (Cuba).

10. *C. elongata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 157, pl. 39, f. 216 (1837) (Brésil).

11. *C. frontalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 15, pl. 1, f. 19 (1882) (Mexique).

12. *C. maculatissima*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 23 (1879) (Cayenne).

13. *C. sexspinosa*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 175 (1889) (Mexique).

14. *C. spilota*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 219 (1845) (Australie).

15. *C. sulcicollis*, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 580 (1867) (Cuba).

16. *C. uniformis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 174 (1889) (Mexique).

GROUPE 2. BUPRESTITES, LE CONTE & HORN

Buprestes. Le Conte & Horn (pars), Smiths. Instit. (1883).

Buprestites. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 107 (1893).

Caractères. — Fossettes porifères des antennes inférieures ou terminales; yeux parallèles ou à peine rapprochés en dessus; épimères du métasternum découvertes; premier article des tarses postérieurs sensiblement plus long que le suivant.

- | | |
|--|----------------|
| 1. — Fossettes porifères inférieures | 2. |
| — — terminales | 13. |
| 2. — Lobe épipleural des élytres normal | 3. |
| — — avancé et couvrant, en tout ou en partie, les épipleures | |
| métasternales | 8. |
| 3. — Ecusson médiocre. | 4. |
| — très large, elliptique | 1. EURYTHYREA. |
| 4. — Bords postérieurs des élytres non dentelés | 5. |
| — — — dentelés | 4. MELOBASINA. |

5. — *Antennes insérées à une certaine distance des yeux.* 6.
 — — *contre les yeux et la base de ceux-ci* 7.
6. — *Le premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que les deux suivants réunis.* 2. BUPRESTIS.
Le premier article des tarses postérieurs un peu plus long que le suivant 3. YAMINA, nov. gen.
7. — *Extrémité du dernier segment abdominal échancrée entre deux dents aiguës.* 5. PYGICERA, nov. gen.
Non 6. PERONAEMIS.
8. — *Pronotum tronqué ou à peine sinueux à la base* 9.
 — *fortement bisinué avec un lobe médian avancé et anguleux* 11.
9. — *Extrémité des élytres échancrée et bidentée* 10.
 — — *inermes* 8. NASCIO.
10. — *Côtés du pronotum dilatés* 7. PTEROBOTHRIS.
 — — *droits* 9. NASCIOIDES, nov. gen.
11. — *Épipleurcs métasternales entièrement recouvertes par le lobe élytral* 12.
Non 10. ASTRAEUS.
12. — *Apex élytral tronqué et tridenté de part et d'autre.* 11. TYLAUCHENIA.
 — — *arrondi, subacuminé et inermes* 12. BULIS.
13. — *Pronotum allongé et convexe* 14.
 — *transversal, carré ou trapézoïdal* 16.
14. — *Base du pronotum sinueuse* 15.
 — — *tronquée* 17. PARASTASSA.
15. — *Épipleurcs métasternales larges, leurs côtés parallèles.* 13. BUBASTES.
 — — *étroites, atténuées en avant* 14. EURYSPIUS.
16. — *Pronotum trapézoïdal* 17.
 — *quadrangulaire* 15. ISOPHAENUS.
17. — *Ecusson étroit, triangulaire.* 16. ARISTOSOMA.
 — *plus large, subcordiforme.* 18. PHILANTHAXIA.

I. GENUS EURYTHYREA, LACORDAIRE

Eurythyrea. Lacordaire, Faune Env. Paris, Vol. 1, p. 593 (1892); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 264 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 149, pl. 37 (1837); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 57 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 187 (1864).

Caractères. — Tête médiocrement convexe; épistome court, sinueux; vertex finement sillonné; cavités antennaires petites, arrondies et subterminales. — Antennes médiocres, plus courtes que la tête et le pronotum réunis, grêles, à article 1 obconique et aussi long que 2 et 3 réunis; ceux-ci subégaux entre eux, 2 un peu plus court, obconique, 3 triangulaire; les suivants triangulaires, plus longs que 3, diminuant graduellement en longueur, dentés au côté interne et munis d'une large fossette inférieure. — Yeux variables suivant le sexe, ceux du ♂ plus saillants, plus globulaires et plus rapprochés en dessus que ceux de la ♀. — Pronotum plus large que long, subconvexe, déclive et rebordé sur les côtés; les angles antérieurs abaissés; bisinué en avant et en arrière avec l'angle postérieur droit; une fovéole antéscutellaire. — Ecusson variable, grand, toujours plus large que long. — Elytres allongés, rebordés, non denticulés, subsinués à hauteur des hanches postérieures, tronqués et plus ou moins bidentés au sommet; stries nettes et finement ponctuées; interstries pointillés, plus ou moins convexes. — Marge antérieure du prosternum tronquée et étroitement rebordée; prosternum large et plan en avant, atténué en pointe arrondie en arrière. — Métasternum divisé; ses branches latérales étroites, courtes et subparallèles. —

Métasternum profondément échancré pour l'insertion du sommet du prosternum. — Episternum métasternal parallèle, coupé obliquement en arrière par les épipleures. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure très sinueuse, la postérieure oblique et droite, échancrée en dedans. — Fémurs antérieurs fusiformes, un peu plus renflés chez le ♂ que chez la ♀; tibias antérieurs plus ou moins arqués et dilatés à leur sommet, les postérieurs et les médians plus allongés et grêles; tarses s'élargissant graduellement du premier au quatrième article, le premier un peu plus long que le suivant, 2, 3 et 4 bilobés. — Abdomen ponctué; segments 1 et 2 soudés; extrémité du dernier segment ♂ tronquée entre deux courtes dents, ♀ allongée et subsinueuse entre deux dents. — Corps ovalaire, peu convexe, allongé, acuminé en arrière; coloration très brillante, verte ou bleue à reflets cuivreux.

Distribution géographique des espèces. — Six espèces sont admises dans ce genre; trois habitent l'Europe tempérée et méridionale, une le Turkestan occidental, une autre la Sibérie et le sixième le Japon.

1. *E. austriaca*, Linné, Syst. Nat. (ed. 18), Vol. 1, p. 661 (1767) (Bohême, Autriche, Caucase, Kirghisie).
aurata, Pallas, Iter. Vol. 2, p. 719 (1776).
inaurata, Gmelin, Syst. Nat. p. 1939 (1788).
aurulenta, Rossi, Faun. Etrus. Vol. 1, p. 186 (1790).
quercus, Herbst, Col. Vol. 9, p. 120, pl. 141, f. 8 (1801).
marginata, Herbst, idem, p. 130, pl. 144, f. 5.
* *austriaca*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 189 (1865).
* *aurata*, Marseul, idem, p. 190.
2. *E. marginata*, Olivier, Entom. Vol. 2, Gen. 32, p. 67, pl. 5, f. 51 (1790) (Pyrénées, Apulie, Algérie).
micans, Fabricius, Syst. Ent. Vol. 2, p. 189 (1794).
* *micans*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 191 (1865).
3. *E. scutellaris*, Olivier, Entom. Vol. 2, Gen. 32, p. 86 (1790) (France, Russie méridionale).
carniolica, Herbst, Col. Vol. 9, p. 122, pl. 144, f. 4 (1801).
similis, Schoenherr, Syn. Ins. Vol. 3, p. 221 (1817).
* *oblita*, Faldermann, Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. Vol. 4, p. 145, pl. 5, f. 1.
* *carniolica*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 192 (1865).

4. *E. Eva*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 256 (1895) (Sibérie).
5. *E. oxiana*, Semenow, idem, p. 254 (Turkestan occidental).
6. *E. tenuistriata*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 330 (1892) (Japon).

2. GENUS BUPRESTIS, LINNÉ

Buprestis. Linné, Syst. Nat. (ed. 10), p. 408 (1760); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 279, pl. 10, f. 10 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 1, pl. 1 (1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 40 (1857).

Ancylocheira. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 9 (1829); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 48 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 165 (1865).

Anoplis. Kirby, Fauna Bor. Amer. p. 151 (1837).

Caractères. — Tête rugueuse, peu convexe; front à peine sillonné; épistome court, sinué ou droit; cavités antennaires petites, bien limitées et situées contre le bord interne des yeux. — Antennes grêles, à peine de la longueur de la tête et du pronotum réunis, le 1^{er} article allongé, obconique; 3 deux fois plus long que 2, les suivants allongés, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux assez grands, elliptiques, un peu obliques et faiblement rapprochés en dessus. — Pronotum en trapèze plus large que long, rétréci en avant avec la marge antérieure bisinuée, lobée au milieu; les côtés obliques et plus ou moins arqués avec la marge latérale faiblement et étroitement rebordée, au moins en arrière; la base bisinuée. — Ecusson petit, arrondi. — Elytres plus larges que le pronotum, dilatés sous l'épaule, sinués à hauteur des hanches postérieures, atténués en arrière, tron-

qués ou arrondis au sommet; celui-ci plus ou moins bidenté; stries ponctuées et distinctes; interstries plans ou élevés, parfois alternativement relevés en côtes. — Prosternum étroit, plan ou déprimé, sa marge antérieure tronquée, son sommet terminé en pointe obtuse. — Mésosternum divisé, ses branches latérales assez longues et un peu obliques; la suture métasternale un peu oblique. — Métasternum profondément échancré en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures distinctement dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse; la postérieure oblique et à peine arquée. — Pattes insérées sur deux lignes parallèles; fémurs antérieurs fusiformes et renflés au milieu, les médians à peine renflés et les postérieurs aplanis et subcylindriques; tibias cylindriques, les antérieurs ♂ munis d'un crochet recourbé en forme d'hameçon et situé à leur sommet; tarses assez robustes, diminuant graduellement en longueur et augmentant en largeur du 1^{er} au 4^e article, le premier des postérieurs très allongé. — Abdomen à premier segment non soudé avec le suivant et plus ou moins sillonné au milieu; le dernier segment largement arrondi ♀, tronqué ou faiblement échancré avec deux dents plus ou moins aiguës ♂. — Corps ovalaire, allongé, peu convexe, élargi à la base des élytres, atténué en avant et en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend une cinquantaine d'espèces disséminées sur tout l'hémisphère septentrional. Deux espèces s'étendent jusqu'au sud de l'Equateur et l'Europe tempérée, la Sibérie et les Etats-Unis en fournissent le plus grand nombre.

1. *B. aurulenta*, Linné, Syst. Nat. (ed. 12), p. 661 (1767) (Etats-Unis d'Amérique).
 * *aurulenta*, Olivier, Ent. Vol. 2, Gen. 32, p. 18, pl. 9, f. 98 (1790).
lauta, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 17 (1854).
radians, Le Conte, idem, p. 17.
adjecta, Le Conte, ibidem, p. 17.
2. *B. biplagiata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 14 (1882) (Mexique).
3. *B. decora*, Fabricius, Syst. Ent. p. 217 (1774) (Etats-Unis d'Amérique, Guatémala).
4. *B. salisburyensis*, Herbst, Col. Vol. 9, p. 174, pl. 148, f. 8 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).
ultramarina, Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. 160 (1836).
5. *B. striata*, Fabricius, Syst. Ent. p. 267 (1774) (Etats-Unis d'Amérique).
impedita, Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. 160 (1836).
6. *B. cupressi*, Germar, Faun. Heft. 17, p. 2 (1834) (Dalmatie, Serbie, Crimée).
mutabilis, Costa, Att. Soc. Napoli, Vol. 4, p. 9, pl. 1, f. 2 (1839).
 * *cupressi*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 169 (1865).
7. *B. africans*, Herbst, Col. Vol. 9, p. 125, pl. 145, f. 9 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).
migricornis, Sturm, Cat. p. 105 (1826).
Bosci, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 146, pl. 36, f. 201 (1837).
8. *B. japonensis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 511 (1873) (Japon).
9. **B. araratica*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 174 (1865) (Mont Ararat).
10. *B. haemorrhoidalis*, Herbst, Schr. Berl. Naturf. p. 97 (1779) (Suisse, Corse, Crimée).
punctata, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 176 (1787).
barbarica, Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, p. 1936 (1788).
barbara, Olivier, Encycl. Meth. Vol. 5, p. 237 (1790).
bicolor, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 209 (1801).
quadristigma, Herbst, Col. Vol. 9, p. 177, pl. 148, f. 9 (1801).
 * *punctata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 172 (1865).
inframaculata, Fleischer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 6, p. 235 (1887).
sibirica, Fleischer, idem, p. 236.
11. *B. tarsensis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 178 (1865) (Syrie, Egypte).
Ledereri, Marseul, idem, p. 179.
12. *B. lineata*, Fabricius, Syst. Ent. p. 217 (1774) (Etats-Unis d'Amérique).
maculipennis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 119, pl. 21, f. 117 (1840).
inconstans, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 146 (1846).
13. *B. dalmatina*, Mannerheim, Enum. Bupr. p. 62 (1837) (Illyrie, Egypte).
14. *B. novemmaculata*, Linné, Syst. Nat. (ed. 12), Vol. 1, p. 662 (1767) (Europe centrale, Algérie, Sibérie).
tetrastichon, Linné, idem, p. 656.
flavopunctata, De Geer, Mém. Ins. Vol. 4, p. 129 (1774).
maculata, Fabricius, Spec. Ins. Vol. 1, p. 275 (1781).
octomaculata, Pallas, Icon. Ins. p. 72, pl. D. f. a. b. (1782).

- flavomaculata*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 177 (1787).
maculosa, Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, p. 1929 (1788).
octoguttata, var. Olivier, Ent. Vol. 2, Gen. 32, p. 30, pl. 4, f. 36 (1790).
 * *flavomaculata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 177 (1865).
 * *obscura*, Théry.
 * *transcaucasica*, Théry.
15. *B. geometrica*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 141, pl. 35, f. 194 (1837) (Bengale).
decemnotata, Castelnau & Gory, idem, p. 133, pl. 33, f. 184.
aurantiopicta, Castelnau & Gory, ibidem, f. 183 (nec text.).
 16. *B. subornata*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 208 (1860) (Californie).
 17. *B. rustica*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 1, p. 409 (1758) (Europe, Sibérie, etc.).
violacea, De Geer, Mém. Ins. Vol. 4, p. 130, pl. 4, f. 10-17 (1774).
lata, Sulzer, Gesch. Ins. p. 53, pl. 6, f. 8 (1776).
 * *rustica*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 171 (1865).
bisornata, Fleischer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 6, p. 234 (1887).
signaticeps, Fleischer, idem, p. 233.
 18. *B. maculiventris*, Say, Long Exped. Vol. 2, p. 272 (1824) (Etats-Unis d'Amérique, Canada).
rusticorum, Kirby, Fauna Bor. Amer. Vol. 4, p. 151 (1837).
paganorum, Kirby, idem, p. 152.
sexnotata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 129, pl. 32, f. 178 (1837).
Le Contei, Saunders, Cat. Bupr. p. 40, n° 17 (1871).
 19. *B. Nutalli*, Kirby, Fauna Bor. Amer. p. 152 (1837) (Canada).
alternans, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 207 (1859).
 20. *B. strigosa*, Gebler, Ledeb. Reise. p. 78 (1830) (Sibérie, Mongolie).
flavomaculata, || Fischer, Ent. Ross. Vol. 2, p. 198, pl. 121, f. 9 (1824).
maculata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 135, pl. 34, f. 186 (1837).
 21. *B. consularis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 120, pl. 21, f. 118 (1840) (Etats-Unis d'Amérique).
 22. *B. laeviventris*, Le Conte, Report Explor. p. 43 (1857) (Californie).
 23. **B. transversepicta*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 12 (1897) (Amazonie).
 24. *B. Bertheloti*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 142, pl. 135, f. 195 (Madère).
 25. *B. Salomoni*, Thomson, Typ. Bupr. p. 40 (1878) (Perse).
Davidis, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 168 (1884).
Nikolskyi, Semenow, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 682 (1889).
 26. **B. Douei*, Lucas, Expl. Ent. Alg. p. 150, pl. 15, f. 7 (1846) (Algérie).
Bellemarei, Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. p. 68 (1853).
amori, Graëlls, Mém. Map. Zool. p. 43 (1858).
 27. *B. octoguttata*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), p. 408 (1758) (Europe, Algérie).
albopunctata, De Geer, Mém. Ins. Vol. 4, p. 132, pl. 4, f. 20 (1774).
magica, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 138, pl. 34, f. 189 (1837).
mauritanica, Lucas, Rev. Zool. p. 50 (1844).
 * *octoguttata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 181 (1865).
 28. *B. catoxantha*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 118, pl. 20, f. 116 (1840) (Mexique).
variegata, || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 140, pl. 34, f. 192 (1837).
 29. **B. rufipes*, Olivier, Ent. Vol. 2, Gen. 32, p. 16, pl. 78, f. 7, a-b (Louisiane).
 30. *B. confluentis*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 206 (1860) (Etats-Unis d'Amérique).
confluenta, † Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 159 (1823).
 31. *B. fasciata*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 177 (1787) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).
sexmaculata, Herbst, Col. Vol. 9, p. 163, pl. 148, f. 5 (1801).
Lherminieri, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 68 (1838).
Langi, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 237 (1843).
Gibbsi, Le Conte, Report Expl. p. 42, pl. 1, f. 17 (1857).
sexplagiata, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 205 (1860).
ornata, Walker, Nat. Van Couv. Vol. 2, p. 324 (1866).
32. *B. aurantiacoadpersa*, Blanchard, Voy. Pôle Sud, Vol. 4, p. 95, pl. 16, f. 16 (1854) (Bornéo).
 33. *B. connexa*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 148 (1875) (Orégon).
 34. *B. corpulenta*, Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 118 (1884) (Maroc).
 35. *B. costipennis*, Fairmaire, idem, Vol. 35, p. 128 (1891) (Cachemire).
 36. *B. decemspilota*, Hope, Gray, Zool. Misc. p. 25 (1831) (Népal).

37. *B. discoidea*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 130, pl. 33, f. 180 (1837) (Australie).
38. *B. flavoangula*, Fairmaire, Rev. Mag. Zool. p. 530 (1856) (Europe méridionale).
punctata || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 128, pl. 32, f. 177 (1837).
39. *B. hilaris*, Klug, Symb. Phys. n° 22, pl. 2, f. 9 (1829) (Egypte).
variegata, Klug, idem, n° 21, pl. 2, f. 8.
40. *B. humeralis*, Klug, ibidem, n° 25, pl. 2, f. 11 (Egypte).
41. *B. impressicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 172 (1892) (Bengale).
42. *B. fimenezi*, Dugès, La Natureza, p. 7, pl. 1, f. 10a (1891) (Mexique).
43. *B. marginicollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 130, pl. 32, f. 179 (1837) (Sénégal).
44. *B. maura*, Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32, p. 19, pl. 5, f. 47 (1890) (Saint-Domingue).
45. *B. picta*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 15 (1882) (Mexique).
46. *B. piliventris*, Waterhouse, idem, p. 13, pl. 1, f. 17 (Mexique).
47. *B. splendens*, Fabricius, Syst. Ent. p. 221 (1774) (Europe septentrionale).
splendida, Paykhull, Fauna Suec. Vol. 2, p. 229 (1799).
pretiosa, Herbst, Col. Vol. 9, p. 127, pl. 144, f. 6 (1801).
48. *B. sulcicollis*, Le Conte, Trans. Amer. Phil. Soc. Vol. 11, p. 208 (1860) (Nouveau-Mexique).
49. *B. ventralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 14 (1882) (Mexique).
50. *B. villosa*, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 331 (1873) (Californie).
51. *B. Wavrai*, Nonfried, Ent. Nachtr. p. 5 (1889) (Erivan).

3. GENUS YAMINA, NOV. GEN.

Caractères. — Tête peu convexe; front légèrement aplani; épistome étroit, allongé et tronqué en avant; cavités antennaires petites, arrondies, insérées près du bord interne et à la partie inférieure de l'œil. — Antennes courtes; article 1 très épais, pyriforme; 2 court, obconique; 3 plus long et plus grêle, obconique; 4 triangulaire, aussi long que 3; les suivants écourtés, triangulaires, arrondis au côté interne et munis, ainsi que 4, d'une large fossette porifère interne. — Yeux ♂ épais et saillants, parallèles; ♀ plus petits et moins saillants. — Pronotum convexe, un peu plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé; les côtés arqués; la base bisinuée avec le lobe médian anguleux. — Ecusson très petit, subtriangulaire et enfoncé. — Elytres convexes, leurs côtés parallèles, le sommet atténué et étroitement échancré de part et d'autre entre deux courtes dents; ils présentent des stries nettes, profondes et régulières avec les interstries étroits, saillants et ponctués. — Marge antérieure du prosternum droite; prosternum convexe, peu large, subacuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales et les sutures métasternales droites. — Métasternum échancré au sommet et profondément sillonné en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure horizontale et sinueuse, la postérieure oblique et droite. — Milieu du premier segment abdominal sillonné; extrémité du dernier segment ♂ tronquée; ♀ arrondie. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes; tibias subcylindriques à leur base, aplanis et élargis au sommet, semblables dans les deux sexes; tarses assez allongés, le premier article des postérieurs un peu plus long que le suivant. — Forme allongée, subcylindrique, arrondie en avant et en arrière, les côtés parallèles.

Je fonde ce genre sur une espèce dont les différences sexuelles sont si prononcées, que jusqu'ici on avait cru voir une espèce distincte dans chacun des deux sexes, le ♂ étant bleu violacé en dessus avec les bords du pronotum et trois bandes élytrales et transversales jaunes, et une tache rouge de chaque côté et à la base du pronotum, tandis que la ♀ est rouge vermillon en dessus avec la tête, quelques taches sur le pronotum et des taches élytrales bleues, ces dernières parfois réunies en vagues bandes transverses. ♂ et ♀ jaunes en dessous avec les sutures sternales et les abdominales ainsi que les pattes bleues. C'est M. Champion qui a tout récemment reconnu, dans une notice claire et succincte

accompagné d'une planche (Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, pt. 4, p. 379, pl. 13), que des spécimens du genre *Buprestis*, recueillis à Gibraltar et très différents l'un de l'autre, constituaient les deux sexes d'une seule et même espèce.

Les caractères génériques, tels que la forme des articles des antennes, plus courts et plus épais, celle du premier article des tarses postérieurs, moins allongée, le faciès, le corps moins aplani en dessus, plus étroit et plus cylindrique, enfin, le curieux dimorphisme sexuel, me paraissent suffisants pour distraire cette intéressante espèce du genre *Buprestis*, d'autant plus qu'elle n'a pas, comme celui-ci, des crochets en forme d'hameçon à l'extrémité des tibias du ♂.

Distribution géographique de l'espèce. — Fabricius a décrit la seule espèce connue de ce nouveau genre comme provenant du Maroc; le *Bupr. Levaillanti* Lucas et le *Bupr. margaripicta* Marseul, dont l'un est le ♂ et l'autre la ♀ du *B. sanguinea* Fabricius, proviennent de l'Algérie. Les deux sexes ont été récemment découverts à Gibraltar.

1. *Y. sanguinea*, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 135 (1798) (♀) (Gibraltar, Maroc, Algérie).

Levaillanti, Lucas, Rev. Zool. p. 50 (1844) (♂).

margaripicta, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 185 (1865) (♀).

* *sanguinea*, Champion, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 379, pl. 13 (1901).

4. GENUS MELOBASINA, KERREMANS

Melobasina, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 68 (1900).

Caractères. — Tête convexe; front aplani; épistome faiblement échancré au milieu et bilobé sur les côtés; cavités antennaires grandes, triangulaires, ouvertes à leur partie antérieure contre le bord inférieur et interne de l'œil; vertex finement sillonné. — Antennes à article 1 médiocre et pyriforme; le 2^e court et globulaire; les suivants..... — Yeux épais et saillants, elliptiques et subparallèles, à peine rapprochés en dessus. — Pronotum transversal, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure droite; les côtés obliques et faiblement arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé sur les élytres et aigu; la base bisinuée avec un large lobe médian arqué; le disque avec deux impressions obliques et nettes situées plus près de la base que du sommet et avec une fossette présutellaire. — Ecusson très petit, transversal et quadrangulaire. — Elytres sillonnés le long de la base avec des séries longitudinales et régulières de points, les interstries plans et à peine ponctués sur la région antérieure où ils présentent de petits plis transversaux; les côtés postérieurs dentelés; le sommet obliquement tronqué de part et d'autre, la troncature limitée extérieurement par une courte dent légèrement saillante en dehors et intérieurement par deux très petites dents suturales et gemellées. — Marge antérieure du prosternum droite; prosternum large, plan, bordé d'une strie marginale entière, contournant le sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales arquées avec la suture un peu oblique. — Métasternum faiblement échancré en avant; épisternum métathoracique en trapèze, plus étroit en arrière qu'en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la postérieure oblique et légèrement cintrée en dedans. — Pattes peu robustes; fémurs fusiformes, les antérieurs un peu plus renflés au milieu que les suivants; tibias grêles, subcylindriques, les antérieurs et les médians un peu arqués, les postérieurs droits; tarses courts et grêles, leurs articles comprimés; le premier des postérieurs à peine plus long que les suivants. — Abdomen ponctué; extrémité du dernier segment ♂ trifide. — Corps allongé et peu robuste; faciès des *Melobasis* et des *Diceropygus*.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce du genre habite l'Archipel Solo, en Mélanésie.

1. **M. apicalis*, Kerreman, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 69 (1900) (Ile Tugela).

5. GENUS PYGICERA, NOV. GEN.

Caractères. — Tête plane; épistome court, à peine sinueux et situé sur un plan inférieur à celui du front; cavités antennaires très petites et situées à égale distance du bord inférieur et interne des yeux et du bord de l'épistome. — Antennes allongées, à article 1 en massue allongée, amincie à la base et légèrement courbe; 2 et 3 un peu plus courts que le premier et égaux entre eux; 2 obconique, 3 triangulaire; les suivants en triangle allongé, plus longs que 3, dentés au côté interne, rugueux munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux médiocres, peu saillants, elliptiques et parallèles. — Pronotum un peu plus large que haut et un peu plus étroit en avant qu'en arrière avec un large sillon longitudinal au milieu du disque; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé et anguleux; les côtés faiblement arqués avec l'angle postérieur obtus; la base subtronquée, à peine sinueuse. — Ecusson médiocre, mais assez grand pour le groupe, en triangle élargi. — Elytres à stries ponctuées, de la largeur du pronotum à la base, à peine sinueux aux hanches, atténués du tiers supérieur au sommet, celui-ci échancré de part et d'autre entre deux dents aiguës. — Marge antérieure du prosternum largement et peu profondément échancrée en arc; prosternum large et plan, atténué et subanguleux à son sommet, creusé sur son pourtour latéro-postérieur. — Mésosternum divisé à branches latérales étroites et courtes; les sutures droites. — Méta sternum plan, échancré en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure subsinueuse, la postérieure oblique. — Pattes grêles; fémurs subfusiformes, les antérieurs un peu plus renflés que les autres; tibias grêles et cylindriques; tarses allongés, le premier article des postérieurs aussi long que les deux suivants réunis. — Dessous villeux; extrémité du dernier segment abdominal ♀ (?) largement tronquée entre deux longues épines aiguës. — Corps peu robuste, allongé, subnaviculaire, peu convexe, atténué en avant et en arrière.

Je crois pouvoir fonder ce genre pour l'*Epistomentis scriptus* Gory, qui présente, outre le faciès, des caractères qui ne permettent pas de le laisser parmi les *Epistomentis*.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre habite le Chili.

1. *E. scripta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 139, pl. 34, f. 190 (1837) (Chili).

* *Gaudichaudi*, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 479 (1850).

6. GENUS PERONÆMIS, WATERHOUSE

Peronæmis. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 178 (1887).

Caractères. — « Faciès approchant du *Cinyra albonotata*, mais avec le pronotum plus convexe et » plus parallèle sur les côtés. Pores antennaires antérieurs. Ecusson transversal et trapézoïdal. Cavité » sternale formée par le méso- et par le métasternum. Premier article des tarses postérieurs aussi long » que les deux suivants réunis. Tête légèrement convexe; cavités antennaires petites et arrondies. » Pronotum un peu plus large que long; très convexe en avant avec trois impressions ovales et » profondes le long de la base; les angles postérieurs légèrement divergents et aigus. Elytres aussi larges » que le pronotum, subparallèles sur les deux tiers de la longueur (légèrement sinueux sur les côtés), » graduellement et obliquement rétrécis au sommet; celui-ci anguleux au milieu de part et d'autre. » Premier et deuxième segments abdominaux non soudés, carène marginale du pronotum obliquement » inclinée et interrompue en avant. »

C'est par analogies de caractères que je place ici cette coupe générique; n'ayant pas vu le type, je ne puis savoir si les pores antennaires sont concentrés dans une fossette terminale ou inférieure, car la position ordinaire de cette dernière peut tout aussi bien s'appliquer au terme employé par M. Waterhouse (*anterior*) que la position de la première.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre habite la Jamaïque.

1. *P. thoracicus*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 178 (1887) (Jamaïque).

7. GENUS PTEROBOTHRIS, FAIRMAIRE & GERMAIN

Pterobothris. Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 714 (1858).

Caractères. — Tête inégale, rugueuse et bossuée; épistome largement et peu profondément échancré en arc; cavités antennaires petites, arrondies et situées sur les côtés du bord épistomal, entre celui-ci et le bord inférieur des yeux. — Antennes peu robustes, à articles épais et écourtés; 1 renflé au bout; 2 plus court et globulaire; 3 et 4 un peu plus longs que 2, subégaux entre eux, obconiques et subtriangulaires; les suivants triangulaires, plus larges que hauts, épais, villos, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère située sur la tranche externe. — Yeux médiocres elliptiques et parallèles. — Pronotum large, inégal, bossué, bisinué en avant avec un lobe médian arqué en avant, faiblement bisinué en arrière; les côtés dilatés et anguleusement arqués au milieu. — Ecusson très petit, plus long que large, subovale. — Elytres à ponctuation très grossière, inégale, espacée, arrondis à l'épaule, parallèles sur les côtés jusque vers le sommet, brusquement atténués ensuite et prolongés en pointe large, échancrée et bidentée à son extrémité. — Marge antérieure du prosternum largement et profondément échancrée en arc; prosternum large, plan, rugueux et arrondi à son sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes et à peine obliques; les sutures droites. — Métasternum sillonné au milieu et échancré en arc au sommet. — Hanches postérieures étroites, peu dilatées au côté interne, leur marge antérieure sinueuse et la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes et renflés au milieu, les postérieurs subcylindriques et un peu aplanis sur leurs deux faces; tibias grêles et subcylindriques, les antérieurs et les médians un peu sinueux; tarses à articles triangulaires, le premier des postérieurs à peine plus long que le suivant. — Abdomen ponctué; extrémité du dernier segment ♀ (?) tronqué. — Corps écourté, peu robuste et peu convexe, subparallèle, brusquement atténué au sommet et terminé en pointe peu allongée et assez large.

Distribution géographique de l'espèce. — On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre et propre au Chili.

1. **P. curviusculus*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 714, pl. 15, f. 2 (1858) (Chili).

8. GENUS NASCIO, CASTELNAU & GORY

Nascio. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1 (1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 38 (1857).

Caractères. — Tête inégale et bossuée; front sillonné; épistome légèrement relevé en gouttière, échancré en arc au milieu et lobé sur les côtés; cavités antennaires petites, arrondies et surmontées d'une carène qui les surplombe. — Antennes médiocres; article 1 pyriforme; 2 court, obconique; 3 allongé, triangulaire; les suivants diminuant graduellement en longueur; 4 aussi long que 3, triangulaire, les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux petits, elliptiques et légèrement rapprochés en dessus. — Pronotum convexe, inégal, impressionné et bossué, plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; bisinué en avant avec un lobe médian avancé et arqué; dilaté et arrondi sur les côtés antérieurs avec les angles postérieurs saillants en dehors et aigus; la base sinueuse avec un large lobe médian peu arqué. — Ecusson en trapèze, rétréci en avant. — Elytres médiocrement convexes, de la largeur du pronotum à la base, arrondis et un peu élargis à l'épaule, droits ensuite jusqu'au tiers antérieur où ils sont légèrement élargis, atténués jusqu'au sommet où ils se redressent un peu suivant un appendice inerme et peu allongé. — Marge antérieure du prosternum largement et peu profondément

échancrée en arc; prosternum large, plan, arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes, étroites et tronquées en avant; leurs sutures obliques. — Métasternum tronqué en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure très sinueuse, la postérieure oblique et bisinuée, le sinus externe plus large et plus échancré que l'interne, ce dernier formant la dilatation interne. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, les antérieurs et les médians un peu plus renflés que les postérieurs; tibias subcylindriques, légèrement élargis au sommet, les antérieurs et les médians légèrement arqués, les postérieurs droits; tarses peu robustes, leurs articles triangulaires et subdéprimés, le premier article des postérieurs plus long que le suivant. — Abdomen ponctué; extrémité du dernier segment abdominal arrondie. — Caractères sexuels extérieurs nuls.

Faciès rappelant celui du genre *Pterobothris* qui précède, mais avec la ponctuation générale moins épaisse et l'extrémité des élytres moins brusquement rétrécie, leur appendice caudal moins accentué et inerme.

Distribution géographique des espèces. — Les espèces de ce genre se trouvent en Australie à l'exclusion de toutes les autres régions du globe.

1. *N. vetusta*, Boisduval, Voy. Astrol. Ins. Col. p. 85 (1832) (Australie).
xanthura, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 2, pl. 1, f. 1 (1837).
2. *N. simillima*, van de Poll, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 122 (1889) (Australie)
3. **N. lunaris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 294 (1900) (Australie).

9. GENUS NASCIOIDES, NOV. GEN.

Caractères. — Tête assez forte; front aplani; épistome échancré au milieu et relevé sur les côtés; cavités antennaires médiocres, arrondies et subterminales. — Antennes assez longues, grêles; article 1 très allongé, recourbé et renflé au bout; 2 très court, obconique; 3 une fois aussi long que 2, triangulaire; les suivants un peu plus courts, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux assez gros, saillants, elliptiques et sensiblement rapprochés en dessus. — Pronotum subcylindrique, un peu plus large que long, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, parfois impressionné au milieu de la base; la marge antérieure subsinueuse avec un lobe médian peu arqué; les côtés droits ou à peine obliques et faiblement arqués; la base peu sinueuse. — Ecusson très petit, en trapèze plus long que large. — Elytres allongés, de la largeur du pronotum à la base, arrondis à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet, dentelés sur les bords postérieurs, bidentés à l'extrémité, sérialelement ponctués sur toute leur surface, les points épais et rapprochés. — Marge antérieure du prosternum droite ou à peine échancrée en arc; prosternum large, plan et subacuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches assez courtes avec leurs sutures obliques. — Métasternum lobé en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne, leur marge antérieure à peine sinueuse; la postérieure oblique et faiblement échancrée intérieurement. — Pattes peu robustes; fémurs fusiformes; tibias grêles et subcylindriques; tarses peu allongés, le premier article des postérieurs plus long que le suivant. — Corps allongé, peu robuste, atténué en avant, élargi au tiers supérieur et acuminé au sommet; subcylindrique ou subplan.

Ces caractères diffèrent essentiellement de ceux du genre *Nascio*, qui précède et dans lequel différents auteurs ont rangé les espèces qui suivent.

Distribution géographique des espèces. — Parmi les six espèces que je crois pouvoir être admises dans ce nouveau genre, cinq habitent l'Australie et la sixième la Nouvelle Zélande.

1. *N. Parryi*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 103 (1845) (Australie).
Saundersi, Hope, idem. Vol. 5, p. 213 (1846).
2. *N. Enysi*, Sharp, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 193 (1877) (Nouvelle-Zélande).
3. *N. viridis*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 239 (1872) (Australie).

4. *N. carissima*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist (5^e) Vol. 9, p. 51 (1882) (Australie septentrionale).
5. *N. pulchra*, van de Poll, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 122 (1889) (Queensland).
6. *N. quadrinotata*, van de Poll, idem, p. 123 (Tasmanie).

10. GENUS ASTRAEUS, CASTELNAU & GORY

Astraeus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1 (1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 43 (1857); van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 79 (1889).

Caractères. — Tête plane, plus ou moins large; épistome très court, largement et peu profondément échancré en arc; cavités antennaires petites et arrondies, situées contre le bord interne et vers la partie inférieure des yeux. — Antennes médiocres; article 1 allongé, obconique et renflé au bout; 2 très court, obconique; 3 triangulaire, un peu plus grand que les suivants; ceux-ci diminuant graduellement, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux assez gros, elliptiques et parallèles. — Pronotum transversal, convexe, arrondi sur les côtés, atténué en avant, fortement bisinué à la base avec un lobe médian avancé et très aigu. — Ecusson invisible. — Elytres plus ou moins convexes, largement lobés à la base, le lobe encastré dans le sinus du pronotum; graduellement atténués en arc de la base au sommet, l'apex terminé par deux dents aiguës recourbées en dehors et divergentes, l'interne plus forte et terminale, l'externe située plus en avant sur le côté; les côtés dilatés à l'épaule, la dilatation terminée par une échancrure nettement accusée. — Marge antérieure du prosternum droite ou à peine échancrée en arc; prosternum large, plan ou légèrement convexe, largement lobé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et très étroites; les sutures droites. — Métasternum échancré en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; la marge antérieure sinueuse, la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, les antérieurs et les médians un peu plus renflés que les postérieurs; tibia subcylindriques; tarses allongés, leurs articles augmentant graduellement en largeur, le premier article des postérieurs aussi long que les deux suivants réunis. — Corps écourté, robuste, convexe, subovoïde, atténué en avant et acuminé en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre est répandu sur tout le continent australien, à l'exclusion des autres régions. Les espèces qui le composent ont toutes, sauf trois d'entre elles, été très bien décrites et admirablement figurées dans l'*Essai monographique* de M. J. Neervoort van de Poll (Tijds. Ent. Vol. 32, 1889).

1. *A. navarchis*, Thomson, Rev. Mag. Zool. p. 115, pl. 6, f. 2 (1856) (Australie).
 2. *A. crassus*, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 95, pl. 2, f. 9 (1889) (Australie).
flavopictus || van de Poll, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 180 (1886).
 3. *A. flavopictus*, Castelnau & Gory, Mon Bupr. Vol. 1, p. 2, pl. 1, f. 1 (Australie).
 4. **A. cyaneus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 295 (1900) (Nouvelles-Galles du Sud).
 5. *A. elongatus*, van de Poll, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 177 (1886) (Australie).
 6. *A. dilutipes*, van de Poll, idem, p. 180 (Australie).
 7. *A. fansonii*, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 94, pl. 2, f. 8 (1889) (Australie).
tepperi, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1258 (1889).
 8. *A. simulator*, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 102, pl. 3, f. 15 (Australie).
 9. *A. pygmaeus*, van de Poll, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 178 (1886) (Australie).
subfasciatus, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 104, pl. 3, f. 16b (1889).
 10. *A. Samouelli*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 10, pl. 1, f. 12 (1868).
Mastersi, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. Vol. 2, p. 239 (1872).
 11. *A. splendens*, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 108, pl. 3, f. 19 (1889).
-
12. *A. aberrans*, van de Poll, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 176 (1886) (Australie orientale).
picticollis, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 91 (1889).
 13. *A. Badeni*, van de Poll, idem, p. 93, pl. 2, f. 7 (Australie méridionale).
Meyricki, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1256 (1889).

14. *A. fraterculus*, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 92, pl. 2, f. 6 (1889) (Victoria).
15. *A. irregularis*, van de Poll, idem, Vol. 32, p. 86, pl. 2, f. 1 (1889) (Australie).
16. *A. lineatus*, van de Poll, ibidem, p. 87, pl. 2, f. 2 (Australie).
17. *A. major*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1257 (1889) (Australie).
18. *A. multinotatus*, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 89, pl. 2, f. 3 (1889) (Australie).
19. *A. Oberthuri*, van de Poll, idem, p. 100, pl. 3, f. 13 (Australie).
20. *A. prothoracicus*, van de Poll, ibidem, p. 98, pl. 3, f. 11 (Australie).
21. *A. simplex*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 211 (1892) (Australie).
22. *A. vittatus*, van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 99, pl. 3, f. 12 (1889) (Australie).

II. GENUS TYLAUCHENIA, BURMEISTER

Tylauchenia. Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 377 (1872).

Ocypetes. Thomson, Typ. Bupr. p. 55 (1878).

Caractères. — Tête médiocre; front convexe; épistome court, tronqué ou faiblement bilobé; cavités antennaires assez grandes, elliptiques, transversales et situées contre les yeux, limitées antérieurement par le bord de l'épistome. — Antennes courtes, dentées à partir du 6^e article; le 1^{er} court, pyriforme; 2 plus court, globulaire; 3 allongé, obconique, épaissi au bout, deux fois aussi long que 2; 4 et 5 subégaux entre eux et semblables à 3; les suivants triangulaires, dentés au côté interne, diminuant graduellement en longueur et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux petits, elliptiques, un peu obliques et légèrement rapprochés en dessus. — Pronotum grand, très convexe, plus étroit en avant qu'en arrière, bisinué en avant avec un lobe médian étroit et subanguleux; arrondi sur les côtés avec une carène marginale lisse plus ou moins droite, inclinée en avant; la base très fortement bisinuée avec le lobe médian plus avancé que les latéraux, tous trois très aigus. — Ecusson petit, ponctiforme. — Elytres assez convexes, lobés à la base, graduellement atténués sur les côtés et sinueux d'avant en arrière, le sommet légèrement divergent et bidenté avec la dent externe saillante en dehors. — Marge antérieure du prosternum bordée d'un étroit bourrelet lisse; prosternum bombé en avant et aplani en arrière, le sommet un peu atténué et arrondi. — Mésosternum divisé; ses branches latérales allongées et un peu obliques; la suture métasternale un peu oblique. — Métasternum largement lobé en avant, le lobe un peu arqué; épisternum recouvert par le lobe latéral des élytres. — Hanches postérieures peu dilatées au côté interne; leurs marges subparallèles et sinueuses. — Pattes peu robustes; fémurs peu renflés; tibias subcylindriques; tarses médiocres et comprimés, le premier article des postérieurs un peu plus long que le suivant. — Soudure du premier et du deuxième segment abdominal distincte; extrémité du dernier segment carénée au milieu, la carène souvent allongée et saillante en arrière (♂ ou ♀?). — Corps épais, convexe, subovoïde, atténué en avant et acuminé en arrière avec les élytres légèrement divergents au sommet.

Les caractères énoncés par M. J. Thomson (*G. Ocypetes*) seraient insuffisants pour pouvoir de prononcer sur la validité du genre, s'il n'en donnait pour type la même espèce que celle qui avait servi, six ans auparavant, à Burmeister pour fonder son genre *Tylauchenia* qui, par son faciès et par ses caractères, vient se placer incontestablement à la suite du genre *Astraeus*, qu'il représente dans l'Amérique du Sud.

Distribution géographique des espèces. — On connaît six espèces de ce genre; parmi celles-ci, une se trouve dans l'Equateur, deux au Chili et trois dans la province de Cordova (République Argentine).

1. *T. crassicollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 113, pl. 29, f. 156 (1837) (Cordova).
2. **T. dispar*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 337 (1899) (Equateur).
3. **T. guttulata*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 738 (1858) (Chili).

4. *T. compacta*, Berg, An. Univ. Buenos-Ayres, Vol. 6, p. 152 (1889) (Cordova).
5. *T. irrorata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 72, pl. 13, f. 70 (1840) (Chili).
attenuata, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 261 (1854).
6. *T. sphaericollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 40, pl. 10, f. 49 (1837) (Cordova).

12. GENUS BULIS, CASTELNAU & GORY

Bulis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 1, pl. 1, f. 1a (1836); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 42 (1857).

Caractères. — Tête plane; front étroitement silloné; épistome court, largement et peu profondément échancré en arc; cavités antennaires assez grandes, terminales et triangulaires, — Antennes assez longues et grêles; article 1 allongé et pyriforme; 2 et 3 plus courts, obconiques; 4 à 10 allongés, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère subterminale; 11 ovoïde. — Yeux médiocres, elliptiques et légèrement rapprochés en dessus. — Pronotum convexe, plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure tronquée; les côtés obliques avec la carène marginale linéaire et obliquement abaissée en avant; la base fortement bisinué, formant trois lobes aigus. — Ecusson très petit, ponctiforme et enfoui. — Elytres allongés, convexes, cunéiformes, faiblement sinués sur les côtés avant le milieu, fortement lobés à la base, acuminés et épineux au sommet; l'épine externe légèrement divergente en dehors. — Marge antérieure du prosternum presque droite, à peine échancrée en arc; prosternum large, plan, arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes. — Métasternum largement échancré en avant avec un fin sillon médian. — Pattes peu robustes; hanches postérieures peu dilatées au côté interne; la marge antérieure sinueuse, la postérieure subsinueuse; fémurs antérieurs et médians subfusiformes, renflés au milieu, les postérieurs subcylindriques et légèrement aplanis sur leurs deux faces; tibias grêles et cylindriques; tarses presque aussi longs que les tibias, le premier article des postérieurs presque aussi long que les deux suivants réunis. — Différences sexuelles extérieures nulles. — Corps allongé, subcylindrique, atténué aux extrémités.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que deux espèces de ce genre, toutes deux de la région du Cap de Bonne-Espérance.

1. *B. bivittata*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 186 (1801) (Cap de Bonne-Espérance).

2. *B. varians*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 2, pl. 1, f. 2 (1836) (Cap de Bonne-Espérance).

13. GENUS BUBASTES, CASTELNAU & GORY

Bubastes. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 1, pl. 1, f. a (1836); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 14 (1857).

Neobubastes. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 213 (1892).

Caractères. — Tête courte, plane en avant, un peu déprimée sur le front; épistome large, très court, faiblement bisinué avec une échancrure médiane peu accusée; cavités antennaires médiocres et irrégulières. — Antennes assez robustes, écourtées; article 1 gros, épaissi au bout; 2 très court, obconique; 3 plus long que 2, renflé au bout; les suivants triangulaires, dentés au côté interne, assez épais et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, convexes, elliptiques et subparallèles. — Pronotum grand, convexe, subcylindrique, atténué en avant et bisinué en arrière; les angles postérieurs plus abaissés et plus aigus que le lobe médian; les côtés arqués avec une étroite carène marginale invisible en dessous. — Ecusson petit, carré. — Elytres cylindro-coniques, lobés à la base,

atténués du tiers supérieur au sommet; celui-ci obliquement tronqué et bidenté de part et d'autre. — Prosternum court, subconvexe, large et arrondi au bout. — Mésosternum divisé; ses branches latérales allongées et subparallèles; la suture métasternale un peu oblique. — Métasternum tronqué en avant au milieu et oblique sur les côtés. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse et la postérieure oblique. — Pattes assez robustes; fémurs antérieurs et médians un peu renflés au milieu, les postérieurs subcylindriques et un peu aplanis; tibias cylindriques; tarses médiocres, le premier article des postérieurs à peine plus long que le suivant. — Abdomen assez convexe, le dernier segment abdominal en trapèze, tronqué au bout. — Différences sexuelles extérieures nulles. — Corps allongé, cylindrique, atténué en avant et en arrière; les côtés parallèles.

Distribution géographique des espèces. — On connaît actuellement huit espèces de ce genre toutes habitent l'Australie.

1. *B. globicollis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 14 (1879) (Australie).
laticollis, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 3, p. 1415 (1888)
2. *B. inconsistans*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 14 (1879) (Australie).
inconstans, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 3, p. 1414 (1888).
3. *B. splendens*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 294 (1891) (Australie).
4. *B. sphenoidea*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 2, pl. 1, f. 1 (1836) (Australie).
5. *B. aureocincta*, Blackburn (*Neobubastes*), Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 213 (1892) (Australie centrale).
6. *B. cylindrica*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 3, p. 1228 (1888) (Détroit de King).
7. *B. occidentalis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 293 (1891) (Australie occidentale).
8. *B. vagans*, Blackburn, idem, p. 212 (1892) (Australie méridionale).

14. GENUS EURYSPIUS, LACORDAIRE

Eurybia || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1, f. a (1838).

Euryspilus. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 44 (1857).

Caractères. — Tête peu développée; front plan; épistome court, échancré en arc en avant; cavités antennaires médiocres, subarrondies et subterminales, étroitement closes en avant. — Antennes courtes; article 1 pyriforme, épais et renflé au bout; 2 court, obconique; 3 à 5 allongés, obconiques et subégaux entre eux; les suivants épais, écourtés, subtriangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux petits, elliptiques, situés à une certaine distance du pronotum et parallèles. — Pronotum cylindrique, un peu plus large que long, à peine plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure largement lobée; la base bisinuée; les côtés munis d'une carène invisible en dessus. — Ecusson petit, subcordiforme. — Elytres allongés, subcunéiformes, lobés à la base, sinués à hauteur des hanches postérieures, atténués à l'extrémité; le sommet acuminé, obliquement tronqué de chaque côté avec une très petite échancrure terminale. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large et plan, le sommet échancré sur les côtés et largement tronqué au milieu. — Mésosternum divisé; ses branches latérales étroites et assez longues; la suture métasternale droite. — Métasternum large, faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures obliques; leurs côtés subparallèles; à peine dilatées au côté interne. — Pattes peu robustes; fémurs assez épais et renflés; tibias normaux, subcylindriques; tarses assez grêles et assez allongés, le premier article des postérieurs allongé. — Extrémité du dernier segment abdominal arrondie (♂ ou ♀?). — Corps allongé, svelte et cunéiforme; faciès des *Bubastes*, mais moins robuste et plus acuminé en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Les deux espèces actuellement connues de ce genre habitent l'Australie.

1. *E. chalcodes*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1, f. 1 (1838) (Australie).
2. *E. australis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 247 (1887) (Australie).

15. GENUS ISOPHAENUS, WATERHOUSE

Isophaenus. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 175, pl. 9, f. 11a-c (1889).

Caractères. — « Allongé, parallèle. Menton très court et transversal, arrondi sur les côtés, »
 » membraneux en avant. Palpes maxillaires ayant l'article terminal subcylindrique et deux fois aussi »
 » long que large. Antennes à fossettes porifères larges et terminales, ces fossettes s'élargissant sur les »
 » articles terminaux. Pronotum transversal et quadrangulaire. Ecusson assez petit, pentagonal. Elytres »
 » plus étroits au milieu qu'à la base et au sommet, laissant à découvert les côtés supérieurs de »
 » l'abdomen, arrondi et denticulés au sommet. Prosternum acuminé au sommet, faiblement dilaté »
 » entre les hanches. Cavité sternale formée par le mésosternum (qui est assez large) et le métasternum; »
 » la marge postérieure du mésosternum toutefois peu visible. Episternum du métasternum assez large, »
 » un peu plus étroit en arrière; épimères triangulaires, non recouvertes par les élytres. Les hanches »
 » postérieures sont graduellement élargies au côté interne. Les pattes sont grêles; les tibias droits; les »
 » tarses allongés, grêles, villeux, spécialement entre le 2^e et le 3^e article où se remarque une frange de »
 » poils blancs remplaçant la lamelle, le 4^e distinctement lamellé, le 1^{er} article des postérieurs aussi long »
 » que les quatre suivants réunis.

» J'ai des doutes quant aux affinités de ce genre dont le meilleur groupement est dans le voisi- »
 » nage des *Melanophila*. Le système de coloration et la sculpture le rapprochent des *Anthaxia*. »

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre habite le Mexique.

1. *I. parallelus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 175, pl. 9, f. 11, 11 a-c (1889) (Mexique).

16. GENUS ARISTOSOMA, THOMSON

Aristosoma, (La Ferté, mss.). Saunders, Cat. Bupr. p. 50 (1871) non décrit; Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 24 (1879).

Caractères. — Tête peu convexe; front déprimé et sillonné; épistome très court, peu profondément échancré en arc au milieu; cavités antennaires assez grandes, arrondies, subterminales et situées à une certaine distance du bord interne des yeux. — Antennes grêles et médiocres; article 1 allongé, légèrement courbe, obconique et épaissi au bout; 2 très court, obconique; 3 allongé, subcylindrique, aplani, épaissi en avant; les suivants allongés, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux moyens, elliptiques et subparallèles. — Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé; les côtés obliquement arqués; arrondis un peu avant le milieu et droits ensuite avec une carène marginale lisse et droite, invisible en-dessus et située sous l'intersection des plans du pronotum et de l'épisternum; la base bisinuée avec un large lobe médian peu arqué. — Ecusson petit, subtriangulaire. — Elytres larges, subtronqués à la base, sinueux à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet. — Marge antérieure du prosternum tronquée et bordée d'un étroit bourrelet lisse; prosternum large, subconvexe, légèrement élargi et subanguleux entre les hanches antérieures et les médianes, arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes et obliques; la suture métasternale un peu cintrée. — Métasternum échancré au milieu et lobé sur les côtés en avant, étroitement sillonné au milieu dans toute sa longueur. — Hanches postérieures peu dilatées au côté interne, horizontales; leur marge antérieure peu sinueuse, la postérieure un peu oblique et faiblement arquée. — Pattes peu robustes; fémurs assez épais, carénés sur leur tranche interne; tibias normaux, subcylindriques; tarses assez longs, le premier article des postérieurs aussi long que les deux

suivants réunis. — Abdomen pointillé avec une impression de chaque côté des quatre premiers segments; extrémité du dernier segment arrondie (♂ ou ♀?). — Corps large, écourté, peu convexe, élargi au tiers postérieur.

Distribution géographique des espèces. — Les deux espèces admises dans ce genre appartiennent à la faune de l'Afrique méridionale.

1. *A. suturalis*, Thunberg, Nov. Spec. Ins. Diss. Vol. 5, p. 94, f. 106 (1789) (Cap de Bonne-Espérance).

aurata, || Thunberg, Mus. Acad. Upsal. Vol. 4, p. 52 (1787).

caffra, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 25 (1879).

2. *A. crassa*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 291 (1887) (Afrique méridionale).

17. GENUS PARASTASSA, MARSEUL

Parastassa. Marseul, L'Abeille, Vol. 20, p. 167 (1888).

Caractères. — Tête médiocre; front aplani et légèrement déprimé en avant; épistome court, largement et régulièrement échancré en arc; cavités antennaires petites, arrondies et situées à égale distance du bord de l'épistome et de celui des yeux. — Antennes presque aussi longues que la tête et le pronotum réunis; article 1 allongé, légèrement courbe, subcylindrique et légèrement renflé au bout; 2 très court, obconique; 3 allongé, obconique, plus court que 1 et plus long que 2; les suivants triangulaires, très élargis, très acuminés au côté interne, spongieux sur leurs deux faces et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux elliptiques, médiocres, un peu obliques, très légèrement rapprochés en dessous et plus espacés sur le vertex que vers l'épistome. — Pronotum subcylindrique, plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure largement lobée en avant; les côtés un peu arqués en avant et un peu sinueux ensuite; la base tronquée; à peine sinueuse; la marge latérale étroitement carénée sur toute sa longueur. — Ecusson petit, triangulaire et très acuminé en arrière. — Elytres assez convexes, tronqués à la base, largement lobés aux épipleures, séparément arrondis et dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc; prosternum large, plan, arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et très étroites; les sutures métasternales droites. — Métasternum échancré en avant. — Hanches postérieures peu dilatées au côté interne; leur marge antérieure subsinueuse, la postérieure un peu oblique. — Pattes médiocres; fémurs renflés et normaux; tibias cylindriques et normaux; tarses assez courts, le premier article des postérieurs plus long que le suivant. — Abdomen et dessous villeux; extrémité du dernier segment arrondie (♂ ou ♀?). — Corps allongé, cylindro conique; faciès rappelant vaguement celui de certains *Sphenoptera*.

Distribution géographique de l'espèce. — On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre; elle habite l'Algérie. M. Fairmaire l'a décrite sous le nom de *Sphenoptera coraciformis*, et une variété, un peu plus grande que le type et d'un cuivreux brillant a reçu de M. A. Théry le nom d'*aurulenta*.

1. *P. coraciformis*, Fairmaire (*Sphenoptera*), Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 7, p. 511 (1874) (Algérie).

Caroli, Marseul, L'Abeille, Vol. 20, p. 167 (1888).

2. *aurulenta*, Théry.

18. GENUS PHILANTHAXIA, H. DEYROLLE

Philanthaxia. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 72 (1864).

Engycera. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 308 (1867).

Caractères. — Tête carrée; front large, légèrement convexe; épistome court, échancré au milieu, faiblement lobé sur les côtés; cavités antennaires très petites, arrondies et situées plus près du bord de

l'épistome que du bord interne des yeux. — Antennes courtes et grêles; article 1 allongé, renflé au bout; 2 court, globulaire; 3 grêle, aussi court que 2; les suivants courts, épais, subtriangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, plus ou moins saillants en dehors et parallèles. — Pronotum transversal, plus large que long, en trapèze et plus étroit en avant qu'en arrière; sa marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés obliques avec une étroite carène marginale abaissée en avant; la base tronquée. — Ecusson assez grand, triangulaire, plus large que long. — Elytres tronqués à la base, larges et parallèles en avant, rétrécis en arrière, denticulés sur les côtés postérieurs. — Marge antérieure du prosternum tronquée et très légèrement rebordée; prosternum large, anguleusement dilaté entre les hanches antérieures et les médianes, le sommet atténué et anguleusement arrondi. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes et un peu obliques; suture métasternale horizontale. — Métasternum tronqué en avant. — Hanches postérieures peu obliques, faiblement dilatées au côté interne, leur marge antérieure horizontale et un peu sinueuse au côté interne, la postérieure légèrement arquée. — Fémurs et tibias normaux; tarses assez robustes, le premier article des postérieurs presque aussi long que les deux suivants réunis. — Premier et deuxième segments abdominaux soudés, la suture peu distincte; plus longs à eux deux que les trois suivants réunis, 3 et 4 courts, celui-ci plus court que l'autre, le dernier arrondi au sommet. — Corps large et court, peu convexe, atténué en avant et en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend onze espèces, confinées dans la région indo-malaise.

1. **P. andamana*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 32 (1887) (Iles Andaman).
2. *P. curta*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 73, pl. 2, f. 8 (1864) (Java).
3. *P. purpuriceps*, Saunders (*Engycera*), Trans. Ent. Soc. Lond. p. 39 (1867) (Bengale).
4. **P. clara*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 211 (1895) (Cochinchine).
5. *P. aenea*, Saunders (*Engycera*), Trans. Ent. Soc. Lond. p. 309 (1867) (Pachbon).
6. *P. aureoviridis*, Saunders (*Engycera*), idem. p. 513 (Penang).
7. *P. cupricauda*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 211 (1895) (Philippines).
8. *P. dorsalis*, Waterhouse, Ann. Nat. Hist. p. 290 (1887) (Java).
9. *P. latifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 173 (1892) (Bengale).
10. *P. rufomarginata*, Saunders (*Engycera*), Trans. Ent. Soc. Lond. p. 308, pl. 21, f. 4 (1867) (Pachbon).
11. *P. splendida*, van de Poll, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 17 (1892) (Saïgon).

GROUPE 3. ANTHAXITES, LE CONTE & HORN

Anthaxiae. Le Conte & Horn, Smiths. Instit, 1883.

Anthaxini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 109 (1893).

Caractères. — Fossettes porifères des antennes terminales; yeux plus ou moins parallèles; épimères du métasternum recouvertes par le prolongement latéral de l'abdomen; premier article des tarses postérieurs plus long que le suivant.

- | | |
|--|----------------|
| 1. — Cavités antennaires recouvertes en arrière par une carène transversale et oblique | 2. |
| — — — petites, arrondies et découvertes. | 9. |
| 2. — Côtés postérieurs des élytres inermes; le sommet bidenté. | 3. |
| — — — dentelés | 4. |
| 3. — Pronotum tronqué à la base | 1. AGLAOSTOLA. |
| — — — fortement bisinué à la base. | 2. EXAGISTUS. |
| 4. — Extrémité du dernier segment abdominal échancrée et bidentée. | 5. |
| — — — — — inerme | 7. |

5. — *Ecusson grand, semicirculaire* 6.
 — *petit, au plus médiocre* 4. MELOBASIS.
6. — *Marge antérieure du prosternum tronquée, sans tubercules latéraux* 5. DICEROPYGUS.
 — — — *droite au milieu entre deux tubercules arrondis* 6. BRISEIS.
7. — *Pronotum non ou à peine rétréci à la base* 8.
 — *très rétréci en arrière* 15. NOTOGRAPHUS.
8. — *Pronotum bisinué à la base et sillonné au milieu* 12. TRIGONOGENIUM.
 Non 3. TORRESITA.
9. — *Tête plane ou légèrement convexe; épistome court* 10.
 — *convexe ou longitudinalement excavée; épistome allongé* 19.
10. — *Pronotum distinctement bisinué à la base* 11.
 — *tronqué, non ou à peine bisinué à la base* 16.
11. — *Cavités antennaires largement closes en avant* 12.
 — — — *très étroitement closes et avant* 13.
12. — *Antennes flabellées chez les ♂* 7. XENORHIPIS.
 — *semblables dans les deux sexes* 8. PHAENOPS.
13. — *Fémurs antérieurs et médians normaux* 14.
 — — — *dentés au côté interne* 11. MERIMNA.
14. — *Prosternum sans mentonnière* 15.
 — *muni d'une mentonnière* 9. KISANTHOBIA.
15. — *Elytres recouvrant le pygidium* 10. MELANOPHILA.
 — *écourtés, laissant le pygidium à découvert* 14. TETRAGONOSHEMA.
16. — *Bords postérieurs des élytres inermes* 17.
 — — — *dentelés* 13. CHALCOGENIA.
17. — *Corps large et écourté; épistome court et assez large* 18.
 — *étroit et allongé; épistome allongé et étroit; faciès des Agrilus* 18. AGRILAXIA, nov. gen.
18. — *Premier segment abdominal aussi court que le deuxième, leur soudure à peine distincte* 16. ANILARA.
 Non 17. ANTHAXIA.
19. — *Bords postérieurs des élytres inermes* 19. NEOCURIS.
 — — — *dentelés* 20. CURIS.

I. GENUS AGLAOSTOLA, THOMSON

Aglaostola. Thomson, Typ. Bupr. p. 42 (1878).

Caractères. — Tête plane; front rugueux; épistome étroitement et profondément échancré en arc entre deux lobes aigus; cavités antennaires assez grandes, triangulaires, subterminales et situées à une certaine distance du bord interne des yeux. — Antennes assez longues et grêles; article 1 épais, allongé; 2 court, obconique; 3 allongé, subcylindrique, aussi long que 1; 4 et 5 allongés, aussi longs que 3, triangulaires et dentés au côté interne; les suivants plus courts et plus élargis en avant, triangulaires et dentés au côté interne; 4 à 11 munis d'une large fossette porifère subterminale. — Yeux saillants, elliptiques, obliques et sensiblement rapprochés sur le vertex. — Pronotum plus large que long, en trapèze, atténué en avant; la marge antérieure faiblement bisinuée avec un large lobe médian peu arqué; les côtés obliquement atténués en ligne droite d'arrière en avant; la base à peine bisinuée. — Ecusson subpentagonal, un peu plus large que long et atténué en arrière. — Elytres allongés, tronqués à la base, saillants à l'épaule avec un calus huméral bien marqué; les côtés droits jusqu'au tiers supérieur, ensuite atténués

en ligne droite et acuminés au sommet; celui-ci échancré de part et d'autre entre deux dents aiguës. — Marge antérieure du prosternum saillante et droite au milieu, la troncature large et légèrement lobée à ses extrémités; prosternum large, peu convexe, anguleusement saillant entre les hanches postérieures et les médianes, acuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales allongées et courbes, les sutures métasternales très obliques. — Métasternum lobé en avant. — Hanches postérieures distinctement dilatées au côté interne; la marge antérieure presque droite, la postérieure très oblique. — Pattes assez robustes; fémurs antérieurs et médians très renflés au milieu; tibias normaux, grêles et cylindriques; tarses assez long, le premier article des postérieurs presque aussi long que les deux suivants réunis. — Premier segment abdominal prolongé sur les côtés en avant et recouvrant en partie les épimères du métasternum; extrémité du dernier segment ♂ échancrée, ♀ subacuminée. — Corps allongé peu convexe, naviculaire, atténué en avant et acuminé en arrière.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre, très anciennement connue, habite la Jamaïque. Castelnau & Gory en faisaient un *Chrysodema*; ses caractères la placent incontestablement parmi les *Anthaxites*.

1. *A. tereticollis*, Pallas, Icon. Ins. p. 78, pl. D, f. 18 (1782) (Jamaïque).

corrusca, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 176 (1787).

2. GENUS EXAGISTUS, H. DEYROLLE

Exagistus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 65, pl. 2, f. 5 (1864).

Caractères. — « Tête, labre, yeux et antennes absolument semblables à ceux des *Melobasis*; »
 » menton un peu plus large et plus court. — Prothorax épais, étroit, subparallèle, sillonné légèrement
 » sur le disque, très fortement biéchancré en arc de cercle à la base; lobe médian étroit et tronqué. —
 » Ecusson petit, en pentagone légèrement allongé. — Elytres plus larges que le prothorax aux épaules,
 » très fortement lobées et arrondies en avant, peu rétrécies en arrière, obliquement et fortement
 » échancrées à leur extrémité qui est biépineuse, l'épine suturale plus large et plus postérieure. —
 » Prosternum court, large et bombé en avant. — Abdomen tronqué à l'extrémité, fortement épineux à
 » chaque angle de la troncature; la base des deux épines reliée par une étroite plaque lisse transversale
 » qui se trouve sur un plan rentré relativement au dernier segment abdominal. — Pattes et tarses abso-
 » lument pareils à ceux des *Melobasis*. — Corps étroit et allongé. »

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre habite l'île de Bornéo.

1. *E. igniceps*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 65, pl. 2, f. 5 (1864) (Bornéo).

3. GENUS TORRESITA, GEMMINGER & HAROLD

Plagiope || Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 12 (1868).

Torresita. Gemminger & Harold, Cat. Col. Vol. 5, p. 1382 (1869); Thomson, Typ. Bupr. p. 41 (1878).

Caractères. — Tête large en avant, étroite en arrière; front aplani; épistome court, étroitement et profondément échancré au milieu entre deux lobes avancés, couvrant en partie les cavités antennaires; celles-ci petites, arrondies, terminales et situées à une certaine distance des yeux. — Antennes assez longues et grêles, à article 1 allongé, obconique, épaissi au bout; 2 court, obconique; 3 un peu plus long que 2, triangulaire; 4 et les suivants allongés, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale, allongée, prolongée sur la tranche interne. — Yeux assez gros, saillants, elliptiques, très obliques et rapprochés sur le vertex. — Pronotum élargi, transversal, bisinué en avant et tronqué en arrière, les côtés obliques et arqués. — Ecusson petit, subpentagonal — Elytres larges,

finement chagrinés, tronqués à la base, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, atténués en arc un peu après le milieu, conjointement acuminés au sommet, légèrement creusés en gouttière le long du bord extérieur et finement denticulés depuis le sinus huméral jusqu'à l'extrémité. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large, plan, acuminé en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales obliques et presque contiguës en arrière; la suture méso-métasternale légèrement concave. — Métasternum tronqué en avant avec une étroite échancrure médiane formant le prolongement de celle du mésosternum. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure horizontale et sinueuse, la postérieure oblique et échancrée au côté interne. — Pattes assez grêles; fémurs renflés, aplanis sur les côtés; tibias cylindriques; tarses allongés, le premier article des postérieurs presque aussi long que les suivants réunis. — Abdomen peu convexe; les côtés du premier segment remontant le long des hanches et couvrant en partie les épimères du métasternum; dernier segment en triangle arrondi à son sommet. — Différences sexuelles extérieures nulles? — Corps élargi, écourté et peu convexe, déclive sur les côtés.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, qui ne comprend que deux espèces, dont la première avec plusieurs variétés dans lesquelles la coloration seule paraît entrer en ligne de compte, paraît exclusivement propre à l'Australie où il représente, avec les *Melobasis*, les *Melanophila* de l'Europe et de l'Amérique.

1. *T. cuprifera*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 457 (1818) (Australie).
var. chrysochloris, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 122, pl. 31, f. 169 (1837).
var. dilatata, Redtenbacher, Reise Novara, Col. Vol. 11, p. 85 (1867).
var. aenea, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 23 (1879).
1. **T. parallela*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 120 (1898) (Queensland).

4. GENUS MELOBASIS, CASTELNAU & GORY

Melobasis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 118, pl. 1; Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 46 (1857).

Caractères. — Tête courte et large; front aplani; épistome court et étroit, échancré au milieu; cavités antennaires médiocres et recouvertes en arrière. — Antennes assez longues; article 1 allongé, obconique; 2 et 3 plus courts, 2 toujours plus court que 3, obconiques; les suivants subtriangulaires, assez épais, presque aussi larges que longs, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux elliptiques, allongés, assez grands, obliques et sensiblement rapprochés en dessus. — Pronotum transversal, en trapèze, peu convexe, atténué en avant avec la marge antérieure subsinueuse; les côtés plus ou moins obliques et plus ou moins arqués avec une carène marginale rarement visible en dessus, oblique et inclinée en avant, rarement entière et le plus souvent interrompue avant son sommet; la base faiblement bisinuée ou tronquée. — Ecusson petit, arrondi en arrière, rarement triangulaire ou acuminé en arrière. — Elytres peu convexes, tronqués ou faiblement lobés à la base, sinueux aux hanches, denticulés sur les bords depuis le milieu jusqu'au sommet. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large et plan, légèrement dilaté entre les hanches antérieures et les médianes, acuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales presque contiguës en arrière; la suture métasternale droite. — Métasternum tronqué ou faiblement lobé en avant. — Hanches postérieures étroites, peu dilatées au côté interne; leur marge antérieure subsinueuse et horizontale, la postérieure oblique et droite, faiblement échancrée vers le côté interne. — Pattes peu robustes; fémurs assez épais, renflés au milieu; tibias subcylindriques, grêles et normaux, les antérieurs plus arqués chez le ♂ que chez la ♀; tarses grêles et allongés, décroissant graduellement en longueur et croissant en largeur du 1^{er} au 4^e article, le premier des postérieurs plus long que le suivant. — Abdomen ponctué; extrémité du dernier segment ♂ largement échancrée ou tronquée entre deux dents aiguës, ♂ plus étroite-

ment et plus profondément échancrée, les épines plus courtes et moins aiguës. — Corps peu robuste, oblong ovale, subdéprimé ou peu convexe.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend une centaine d'espèces connues et qui sont répandues en Malaisie, en Australie et en Mélanésie. La Polynésie paraît moins bien partagée tandis que l'Australie, par contre, est la patrie de la majeure partie de ses espèces.

1. *M. cupreovittata*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 155 (1876) (Australie).
vittigera, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 16 (1879).
2. *M. Saundersi*, Masters (Australie).
costata || Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 155 (1876).
costifera, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 16 (1879).
3. *M. nervosa*, Boisduval, Voy. Astrol. Ins. Vol. 2, p. 77, pl. 6, f. 8 (1832) (Swan River).
4. *M. Lathamii*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 120, pl. 31, f. 166 (1837) (Australie).
serrata, Hope, Bupr. p. 8 (1846).
5. *M. serrata*, Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 251 (1860) (Nouvelle-Calédonie, Australie).
6. **M. Fairmairei*, nov. sp. (1) (Australie).
7. **M. incerta*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 12, p. 1002 (1892) (Nouvelle-Guinée).
8. *M. viridipes*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 178 (1891) (Nouvelle-Calédonie, Australie).
9. **M. Jakowleffi*, nov. sp. (2) (Nouvelle-Guinée).
10. **M. nigrata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 296 (1900) (Australie).
11. **M. lugubrina*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 69 (1900) (Nouvelle-Guinée).
12. *M. placida*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 17 (1879) (Australie).
13. **M. acuta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 296 (1900) (Australie).
14. **M. melanura*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 121 (1898) (Australie).
15. **M. ignipicta*, Kerremans, ibidem, Vol. 44, p. 297 (1900) (Australie).
16. **M. aenea*, nov. sp. (3) (Australie).
17. **M. sordida*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 238 (1887) (Australie).
18. *M. obscura*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 241 (1872) (Australie).
19. *M. costata*, Mac Leay, idem, p. 240 (Australie).
20. **M. cuprina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 122 (1898) (Australie).
21. *M. propinqua*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 120, pl. 31, f. 165 (1837) (Austr., Tasm.).
verna, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 214 (1846).
Porteri, Hope, idem, p. 215.
suaveola, Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 176 (1848).
- metallifera*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 15, pl. 1, f. 17 (1868).
- prasina*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 17 (1879).
22. *M. cruentata*, Thomson, idem, p. 16 (Australie).
23. *M. superba*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 123, pl. 31, f. 171 (1837) (Swan River).
24. *M. gloriosa*, Castelnau & Gory, idem, f. 170 (Australie).
25. *M. cuprifera*, Castelnau & Gory, ibidem, p. 119, pl. 30, f. 163 (Australie).
Goryi, Saunders, Cat. Bupr. p. 44, n° 6 (1871).

(1) Long. 14; larg. 4-5 mm. — Oblong ovale, élargi au tiers postérieur; tête pourpre obscur, vertex et pronotum noir verdâtre; écusson pourpre obscur, élytres noirs. Dessous bronzé clair et très brillant; tarses postérieurs bleu d'acier. — Voisin du *M. serrata*, Montrouzier, qui précède mais moins robuste, les côtés du pronotum obliquement atténués en ligne droite de la base au sommet, l'écusson plus petit, arrondi en arrière. — Tête finement et régulièrement chagrinée; pronotum en trapèze, la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian arqué, les côtés droits avec la carène marginale oblique, abaissée vers l'avant et n'atteignant pas la suture de l'épisternum prothoracique; sa base bisinuée avec le lobe médian subanguleux; écusson médiocre, tronqué en avant et arrondi en arrière; élytres avec quatre côtes régulières, étroites et espacées, très vagues, les espaces intercostaux larges et subrugueux, inégalement ponctués. Dessous finement et densément ponctué. — Australie.

(2) Long. 11; larg. 3, 7 mm. — Oblong, allongé, atténué en arrière, noir verdâtre en dessus, le front cuivreux obscur; dessous entièrement bronzé brillant, antennes noires. — Un peu plus étroit et plus parallèle que le précédent, les côtés du pronotum plus régulièrement arqués, l'arc peu tendu, l'écusson plus grand, tronqué en avant et arrondi en arrière, la dentelure marginale des élytres plus forte et plus espacée. — Tête chagrinée, à villosité grise; vertex sillonné. Pronotum en trapèze, faiblement bisiné en avant; les côtés un peu obliques et faiblement arqués avec la carène marginale abaissée en avant, arquée et touchant presque la suture épisternale; la base faiblement bisinuée. Elytres sérialelement ponctués, les stries également espacées. Dessous à ponctuation plus épaisse. — Nouvelle-Guinée.

(3) Long. 10, larg. 3 mm. — Oblong ovale, allongé, subcylindrique, peu convexe en dessus et d'un bronzé terne très obscur; dessous bronzé brillant, tarses bleu d'acier. — Plus cylindrique et moins robuste que les précédents, les côtés postérieurs à peine dilatés. — Tête finement et régulièrement chagrinée; vertex avec un sillon médian linéaire. Pronotum à ponctuation très fine et excessivement dense, plus épaisse sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure sinueuse avec le lobe médian peu avancé et largement arqué; les côtés un peu obliques et peu arqués, avec la carène marginale droite et inclinée en avant, la base faiblement bisinuée. Ecusson très petit, arrondi. Elytres à stries ponctuées régulières, plus accentuées en avant qu'en arrière, les interstries étroits et rugueux, ponctués, ridés transversalement sur les côtés. Dessous assez grossièrement ponctué et couvert d'une très courte villosité grisâtre. — Australie.

26. *M. cupriceps*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 457 (1818) (Australie).
viridinitens, Boisduval, Voy. Astrol. Ins. Vol. 2, p. 94 (1832).
iridescens, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 119, pl. 30, f. 164.
 27. **M. costipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 124 (1898) (Australie).
 28. **M. concolor*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 125 (1898) (Australie).
 29. *M. innocua*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 20 (1879) (Australie).
 30. **M. callichloris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 125 (1898) (Australie).
 31. **M. cupricollis*, Kerremans, idem, p. 121 (Australie).
 32. **M. viridiventris*, Kerremans, ibidem, p. 124 (Australie).
 33. **M. viridifrons*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. p. 369 (1896) (Sumatra).
 34. *M. viridiobscura*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 19 (1879) (Australie).
obscura || Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 157 (1876).
 35. *M. obscurella*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 19 (1879) (Australie).
 36. **M. nitidiventris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 122 (1898) (Australie).
 37. *M. simplex*, Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 175 (1848) (Adélaïde).
 38. **M. violacea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 123 (1898) (Australie).
 39. **M. rotundicollis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 241 (1887) (Australie).
 40. **M. coeruleiventris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 123 (1898) (Australie).
 41. *M. cyaneipennis*, Boheman, Eug. Res. Zool. Vol. 2, p. 59 (1858) (Moreton Bay).
azureipennis, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 240 (1872).
aureipennis, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 22 (1879).
 42. **M. vicina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 126 (1898) (Australie).
 43. **M. terminata*, Kerremans, idem, p. 127 (Melbourne).
 44. *M. fulgurans*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 20 (1879) (Australie).
 45. *M. viridis*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 158 (1876) (Australie, Tasmanie).
 46. *M. suturalis*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 148 (1886) (Australie).
 47. *M. hypocrita*, Erichson, Wieg. Arch. Naturg. p. 135 (1842) (Australie).
 48. **M. affinis**, Kerremans (Australie).
cupreoittata || Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 22 (1879).
 49. *M. subfulgurans*, Thomson, idem, p. 21 (1879) (Australie).
 50. **M. miranda*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 128 (1898) (Melbourne).
 51. *M. faceta*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 18 (1879) (Tasmanie, Australie).
 52. *M. inflammabilis*, Thomson, idem, p. 19 (Australie).
 53. **M. viridicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 127 (1898) (Australie).
 54. **M. amabilis*, Kerremans, idem, p. 128 (Moreton Bay).
 55. *M. gratiosissima*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 18 (1879) (Australie).
 56. *M. pyritosa*, Hope, Trans. Ent. Soc. Vol. 4, p. 214 (1846) (Australie).
 57. **M. auronotata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 127 (1898) (Australie).
 58. *M. trifasciata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 29, pl. 6, f. 41 (1838) (Sumatra).
-
59. *M. aeneipennis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 71 (1864) (Batchian).
 60. *M. Andersoni*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 234 (1887) (Australie).
 61. *M. apicalis*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 241 (1872) (Australie).
suturalis, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 17 (1879).
 62. *M. aurata*, Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 72 (1864) (Ile Arou).
 63. *M. auribasis*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 178 (1891) (Nouvelle Calédonie).
 64. *M. beltanensis*, Blackburn, Proc. Soc. N. S. Wales, p. 499 (1891) (Australie méridionale).
 65. *M. bicolor*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 295 (1891) (Australie occidentale).
 66. *M. Blackburni*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 104 (1892) (Australie).
intricata, || Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 243 (1887).
 67. *M. chrysoptera*, Boisduval, Voy. Astrol. Ins. Vol. 2, p. 95 (1832) (Australie).
 68. *M. circumflexa*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 65 (1888) (Inde).
 69. *M. coerulea*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 12, p. 1000 (1892) (Engano).
 70. *M. cupreoaenea*, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol. 2, p. 286 (1878) (Iles Fidji).

71. *M. derbyensis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 15, p. 44 (1892) (Australie).
72. *M. Elderi*, Blackburn, idem, Vol. 16, p. 35 (1893) (Australie intérieure).
73. *M. empyrea*, Oliff, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 93 (1889) (Ile Lord Howe).
74. *M. ignicauda*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 12, p. 1002 (1892) (Nouv. Guinée).
75. *M. igniceps*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 156 (1876) (Australie).
76. *M. intricata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 70 (1864) (Ile Arou).
77. *M. laeta*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 156 (1876) (Australie).
78. *M. lauta*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 3, p. 228 (1888) (Détroit de King).
79. *M. Meyricki*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 238 (1887) (Australie).
80. *M. modesta*, Lansberge, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. 136 (1880) (Nouv. Guinée).
81. *M. monticola*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 496 (1891) (Victoria).
82. *M. nobilitata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 22 (1879) (Svan River).
83. *M. obsoleta*, Thomson, idem, p. 15 (Australie).
84. *M. paitana*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 179 (1891) (Nouvelle Calédonie).
85. *M. pretiosa*, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Aust. p. 244 (1887) (Victoria).
86. *M. prisca*, Erichson, Wieg. Arch. Naturg. p. 135 (1842) (Tasmanie).
87. *M. pulchra*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 294 (1891) (Australie centrale).
88. *M. puncticollis*, Blackburn, idem, Vol. 10, p. 239 (1887) (Australie).
89. *M. purpurascens*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 217 (1801) (Australie).
purpureosignata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Apatura*, p. 6, pl. 2, f. 9 (1837).
90. *M. purpuriceps*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 512, pl. 25, f. 6 (Penang).
91. *M. Rothi*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 236 (1887) (Australie).
92. *M. rubromarginata*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 3, p. 156 (1887) (Australie).
93. *M. semistriata*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 235 (1887) (Australie).
94. *M. semistularis*, Blackburn, idem, p. 246 (Australie).
95. *M. sexplagiata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 124, pl. 31, f. 172 (Australie).
96. *M. soror*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 237 (1887) (Australie).
97. *M. speciosa*, Blackburn, idem, p. 245 (Australie).
98. *M. splendida*, Donovan, Ins. Austral. pl. 1, f. 4 (187?) (Australie).
99. *M. subcyanea*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 287 (1892) (Australie méridionale).
100. *M. Thomsoni*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. N. S. Wales, p. 146 (1890) (Australie).
purpureosignata, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 18 (1879).
101. *M. thoracica*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 246 (1877) (Australie).
102. *M. variabilis*, Lansberge, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. 136 (1880) (Nouvelles-Guinée).
103. *M. viridiceps*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 157 (1876) (Nouvelle-Galles du Sud).
104. *M. vittata*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 19, p. 242 (1881) (Australie).

5. GENUS DICEROPYGUS, H. DEYROLLE

Diceropygus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 68 (1864).

Caractères. — Tête courte et large; front aplani; épistome court, largement et peu profondément échancré en arc; cavités antennaires médiocres, terminales, recouvertes en arrière. — Antennes grêles, à article 1 allongé, obconique; 2 court, obconique; 3 presque aussi long que 1, obconique et un peu aplani; les suivants diminuant graduellement en longueur et augmentant en largeur, triangulaires, aplanis, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques, un peu obliques et légèrement rapprochés en dessus. — Pronotum transversal, en trapèze, peu convexe, atténué en avant avec la marge antérieure subsinueuse et présentant un large lobe médian, un peu arqué; les côtés obliques, droits ou arqués; la base faiblement bisinuée ou subtronquée. — Ecusson assez grand, semi circulaire, tronqué à la base et arrondi en arrière. — Elytres plus ou moins convexes, tronqués ou faiblement lobés à la base, sinueux à hauteur des hanches, obliquement atténués du tiers supérieur au sommet, les côtés largement dentelés. — Marge antérieure du prosternum tronquée,

étroitement rebordée et sillonnée le long du bord, souvent épaisse et saillante ensuite; prosternum large, plan, trifide au sommet. — Mésosternum divisé, ses branches latérales assez allongées et subparallèles; la suture métasternale un peu oblique. — Métasternum tronqué en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures étroites, dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs assez épais, renflés au milieu; tibias cylindriques, grêles et normaux; tarses assez allongés, le premier article des postérieurs aussi long que les deux suivants réunis. — Extrémité du dernier segment abdominal largement échancrée ou subtronquée entre deux longues épines (♂ ou ♀?). — Corps peu robuste, subconvexe, oblong ovale et légèrement élargi à l'épaule.

Ce genre ne diffère des *Melobasis* que par l'écusson toujours grand et semicirculaire et par les dents du bord postérieur des élytres plus grandes et plus espacées. Il pourrait, à la rigueur, constituer une section de ce dernier genre; mais en raison de la constance des caractères précités et d'un faciès propre; il est préférable de le maintenir.

Distribution géographique des espèces. — Huit espèces peuvent être admises parmi les *Diceropygus*, dont une seule de l'Australie et les autres de la Malaisie et de la Mélanésie.

1. *D. viridiauratus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 72 (1864) (Woodlark).
2. *D. maculatus*, H. Deyrolle, idem, p. 68, pl. 2, f. 7 (Iles Key).
3. **D. scutatus*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 177 (1891) (Nouvelle-Calédonie)
4. **D. tristis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 70 (1900) (Ile Tulagi).
5. **D. viridis*, Kerremans, idem, p. 70 (Woodlark).

-
6. *D. auricollis*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 358 (1896) (Nouvelle-Guinée).
 7. *D. australis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 15 (1879) (Australie).
 8. *D. scutellaris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 68 (1864) (Mysolè).

6. GENUS BRISEIS, KERREMANS

Briseis. (La Ferté mss.) Saunders Cat. Bupr. p. 44 (1871) (non décrit); Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 110 (1893).

Caractères. — Tête courte et large; front aplani; épistome court, faiblement échancré en arc; cavités antennaires médiocres, terminales et recouvertes en arrière. — Antennes courtes et grêles, à article 1 allongé, pyriforme; 2 court, obconique, 3 triangulaire, un peu plus long que 2, les suivants dentés au côté interne, subégaux entre eux, spongieux sur leur face interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez gros, elliptiques, obliques et sensiblement rapprochés en dessus. — Pronotum plus large que long, en trapèze, un peu plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian arrondi; les côtés obliques avec une carène marginale lisse; la base bisinuée. — Ecusson assez grand, semicirculaire, tronqué à la base et arrondi à l'arrière. — Elytres étroits, allongés, faiblement lobés à la base; droits sur les côtés, atténués subacuminés du tiers postérieur au sommet, dentelés sur le bord postérieur. — Marge antérieure du prosternum tronquée entre deux tubercules latéraux épais et peu saillants; prosternum large, son sommet trifide, l'angle médian inséré contre le métasternum, entre les branches du mésosternum. — Celui-ci divisé; ses branches latérales courtes; la suture métasternales oblique. — Métasternum anguleusement échancré en avant et étroitement sillonné au milieu. — Hanches postérieures peu obliques, faiblement dilatées au côté interne; leur marge antérieure horizontale et peu sinueuse, la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias grêles, subcylindriques, les antérieurs légèrement arqués, les autres droits; tarses assez allongés, s'élargissant graduellement du deuxième au quatrième article, le premier des postérieurs presque aussi long que les deux suivants réunis. — Premier et deuxième segments abdominaux soudés; les côtés du premier

segment remontant le long des hanches et couvrant en partie les épimères du métasternum; les épipleures de celui-ci étroites et rectangulaires; extrémité de dernier segment ♂ (?) échancrée entre deux longues épines aigües. — Corps étroit, allongé, cylindro-conique.

Distribution géographique des espèces. — On connaît trois espèces de ce genre, habitant toutes trois l'Australie.

1. **B. curta*, nov. sp. (1) (Australie).
2. *B. conica*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 118, pl. 30, f. 132 (Moreton Bay).
3. **B. acuminata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 129 (1898) (Quéensland, Tasmanie).

7. GENUS XENORHIPIS, LE CONTE

Xenorhipis. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 384 (1866); Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 11 (1882).

Lamesis. Westwood.

Caractères. — Genre fondé par Le Conte pour un très petit *Anthaxide* que Horn place à la suite des *Melanophila* et remarquable par la structure des antennes ♂, tandis que celles de la ♀ reproduisent la forme normale de celles de tous les autres Buprestides. Ce caractère seul justifie le maintien de ce genre. Voici ce qu'en dit Horn :

« Ce genre diffère considérablement, non seulement de tous les autres du groupe, mais aussi de tous ceux de la famille par la structure des antennes du mâle. Les articles des antennes du mâle sont, du premier au dixième, prolongés en forme de rameaux de longueur variable, le deuxième étant le plus court. J'ai entrepris de reproduire dans la planche incluse (Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 10, p. 111, pl. 4, f. 7-9, 1882), aussi exactement que possible, la forme de chaque rameau, ce qui m'a paru préférable à une description détaillée. Les antennes de la femelle ne diffèrent pas sensiblement de la forme usuelle de celles des Buprestides et sont dentées à partir du cinquième article. »

Distribution géographique de l'espèce. — On ne connaissait, en 1888, que trois exemplaires de l'unique espèce de ce genre, l'un provenant de l'Illinois, le deuxième du Texas et le troisième trouvé dans le parc de Brooklyn. J'ignore si elle a été retrouvée depuis.

1. *X. Brendeli*, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 384 (1866) (Etats-Unis d'Amérique).

8. GENUS PHAENOPS, LACORDAIRE

Phaenops, Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 47 (1857).

Caractères. — Tête assez large; front aplani; épistome court, échancré en arc; cavités antennaires petites, arrondies, non recouvertes et non terminales, situées à égale distance du bord de l'épistome et du bord inférieur interne des yeux. — Antennes médiocres, à article 1 en massue allongée; 2 court, obconique; les suivants allongés, triangulaires, villeux, ponctués, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux elliptiques, allongés, à peine obliques et subparallèles; très peu rapprochés sur le vertex. — Pronotum transversal, peu convexe, obliquement atténué en avant et très légèrement rétréci en arrière. — Ecusson très petit, un peu plus large que haut. — Elytres peu allongés, subdéprimés, rétrécis et très finement denticulés en arrière. — Marge antérieure du prosternum droite et finement rebordée; prosternum court, large, son sommet trifide, l'extrémité anguleuse. — Mésosternum

(1) Long. 12-15; larg. 4-5 mm. — Allongé, conique, légèrement élargi au tiers supérieur, noir verdâtre ou noir violacé en dessus, l'écusson pourpré; dessous noir brillant, très légèrement verdâtre et couvert d'une villosité grise médiocrement dense et assez longue. — Voisin de ses congénères, mais moins acuminé au sommet, les élytres moins prolongés en arrière, le pronotum non sillonné. — Tête plane, granuleuse et ponctuée; vertex sillonné. Pronotum moins rugueux que le front, sauf sur les côtés, avec une très vague ligne médiane lisse. Elytres à stries ponctuées; les interstries subplans à peine convexes. — Australie.

divisé, ses branches latérales obliques; la suture métasternale un peu oblique. — Mésosternum subsinueux en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne, leur marge antérieure subsinueuse et horizontale, la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs assez épais, les antérieurs et les médians un peu plus robustes que les postérieurs; tibias normaux, grêles, subcylindriques; tarses assez allongés, le premier article des postérieurs plus long que le suivant. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ tronquée, ♀ plus allongée et subarrondie. — Corps elliptico-ovale, peu convexe, légèrement élargi au tiers supérieur.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre ne comprendra probablement qu'une seule espèce à variétés régionales. Il est répandu par toute l'Europe tempérée et méridionale.

1. *P. cyanea*, Fabricius, Syst. Ent. p. 223 (1774) (Finlande, Pyrénées, Tyrol, Caucase).

chalybea, Villers, Ent. Vol. 1. p. 339 (1789).

* *tarda*, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1. p. 209 (1794).

clypeata, Paykull, Faun. Suec. Vol. 2, p. 223 (1799).

* *integra*, Abeille.

2. *P. Knoteki*, Faust, Deutsch. Ent. Zeit. p. 345 (1898) (Herzégovine).

9. GENUS KISANTHOBIA, MARSEUL

Kisanthobia, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 200 (1865).

Caractères. — Après avoir donné la description de l'unique espèce pour laquelle il crée ce genre, S. de Marseul ajoute :

« Ce joli Bupreste, découvert et décrit par M. Robert comme un *Anthaxia* et depuis rapporté au genre *Melanophila* par M. Reiche, ne me semble devoir se rapporter à aucun des deux, quoiqu'il ait en effet de nombreux points de contact avec l'un et l'autre. Il a la sculpture, la forme de l'un, son prosteronum, son pronotum tronqué droit à la base, son écusson plus large cordiforme, son abdomen, etc. (*aurulenta*), la tête, les yeux, les antennes, les élytres de l'autre (*cyanea*). Mais son épistome armé de chaque côté d'une grosse dent mousse, et surtout son menton et sa mentonnière, large et remarquable, suffisent pour l'en séparer. On pourrait lui réserver le nom de *Apatura*, inutilement inventé pour les *Melanophila* par MM. de Castelnau et Gory, mais ce nom étant déjà employé, je l'ai appelé *Kisanthobia*. »

Distribution géographique de l'espèce. — Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, découverte dans le midi de la France et en Algérie.

1. *K. Ariasi*, Robert, Bull. Soc. Draguignan, Vol. 2 (1858) (France, Algérie).

Engel, Ganglbauer, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 38 (1886).

Krufereri, Ganglbauer, idem, p. 38.

algerica, Pic, Misc. Ent. Vol. 5, p. 41 (1897).

10. GENUS MELANOPHILA, ESCHSCHOLTZ

Melanophila. Eschscholtz, Zool. Atl. p. 9 (1829); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 47 (1857); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 72 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 193 (1865); Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 10, p. 101 (1882).

Apatura. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 1, pl. 1 (1836).

Diana. Castelnau & Gory, idem, Vol. 1, *Buprestis*, p. 155 (1837).

Trachypteris. Kirby, Fauna Bor. Amer. p. 158 (1837).

Oxypteris. Kirby, idem, p. 160.

Caractères. — Tête plus ou moins large en arrière; front aplani; épistome très court et étroit, échancré en demi-cercle; cavités antennaires terminales, étroitement closes en avant. — Antennes

médiocres, subfiliformes, leurs articles médians plus larges que les extrêmes; 1 en massue allongée 2 très court, obconique; 3 plus long que 2 et moins long que 1, triangulaire; les suivants triangulaires, obtusément dentés au côté interne, décroissant graduellement en longueur et en largeur, munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux elliptiques, allongés, plus ou moins obliques et plus ou moins rapprochés sur le vertex. — Pronotum plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière, plus étroit que les élytres à leurs bases, souvent sillonné au milieu ou impressionné sur les côtés; ceux-ci plus ou moins anguleux ou arqués avec une carène marginale lisse. — Ecusson petit, arrondi ou transversal. — Elytres plus larges que le pronotum à la base, arrondis à l'épaule, médiocrement allongés, subdéprimés, rétrécis en arrière et denticulés sur les bords postérieurs, arrondis ou mucronés au sommet. — Marge antérieure du prosternum étroitement rebordée et tronquée; prosternum étroit entre les hanches postérieures et anguleusement acuminé à son sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales assez allongées; la suture méso-métasternale droite. — Métasternum tronqué ou faiblement lobé à son sommet. — Hanches postérieures obliques, peu dilatées au côté interne; les marges parallèles, l'antérieure sinueuse et la postérieure subsinueuse. — Pattes peu robustes; fémurs assez épais, subfusiformes, les antérieurs plus robustes que les postérieurs; tibias normaux, grêles et cylindriques; tarses allongés et grêles, le premier article des postérieurs presque aussi long que les deux suivants réunis. — Extrémité du dernier segment abdominal plus ou moins échancrée. — Corps elliptico-ovale, subdéprimé; taille moyenne, faciès peu robuste.

Distribution géographique des espèces. — On connaît une cinquantaine d'espèces de ce genre, répandues sur tout le globe, mais très inégalement réparties. Elles sont relativement nombreuses en Europe, aux Etats-Unis et dans l'Amérique du Sud, tandis qu'elles sont très clairsemées dans les autres régions. On n'en connaît qu'une seule de l'Afrique transéquatoriale et aucune à Madagascar.

1. **M. rubrocincta*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 15 (1897) (Goyaz).
2. **M. limbata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pl. 1, p. 16 (1882) (Chiriqui).
3. *M. obliquata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 156, pl. 39, f. 215 (1837) (Brésil).
4. *M. chrysoloma*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 72 (1837) (Brésil, Mexique).
5. **M. guianensis*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 70 (1838) (Mexique, Brésil).
cayennensis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 125, pl. 22, f. 123 (1840).
6. **M. bahiana*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 14 (1897) (Brésil).
7. **M. aeneocuprera*, nov. sp. (1) (Brésil).
8. **M. cupricollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 332 (1899) (Goyaz).
9. **M. Gounellei*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 14 (1897) (Bahia, Goyaz).
10. **M. albovillosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 331 (1899) (Goyaz).
11. **M. antiqua*, Kerremans, idem, p. 331 (Goyaz).
12. **M. laevipennis*, Kerremans, ibidem, p. 330 (Goyaz).
13. *M. aeneipennis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 155, pl. 38, f. 213 (1837) (Goyaz).
14. **M. Oberthuri*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 13 (1897) (Ega).
15. **M. laticeps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 126 (1898) (Australie).
16. **M. australasiae*, Kerremans, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Vol. 19, p. 59 (1902) (Gayndah).
17. *M. gentilis*, Le Conte, List. Col. p. 42 (1860) (Etats-Unis d'Amérique).
prasina || Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 254 (1860).
18. *M. Delagrangi*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 268 (1891) (Syrie).
19. *M. Marmottani*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 483 (1868) (Algérie).
Legrandi, Mulsant & Pellerin, Opusc. Ent. Liv. 14, p. 220 (1871).

(1) Long. 11; larg. 4 mm. — Oblong ovale, élargi au tiers supérieur, bronzé cuivré en dessus, plus clair sur le pronotum que sur les élytres; dessous bronze obscur et brillant. — Tête finement granuleuse et ponctuée, à très courte villosité blanche; yeux obliques et rapprochés en dessus. Pronotum moins rugueux que la tête, à fossettes latérales assez allongées et subtriangulaires; les côtés obliques en avant et rentrants à partir du tiers inférieur jusqu'à la base. Elytres très finement granuleux, ayant chacun deux fossettes le long de la base, l'externe arrondie et l'interne allongée, une fossette discale arrondie au tiers antérieur et une triangulaire au tiers postérieur, celle-ci prolongée en avant et formant un sillon oblique; un vague sillon longeant la suture du tiers postérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi. — Dessous finement ponctué, à courte villosité blanche, plus visible en avant qu'en arrière. — Brésil: Jatahy (Goyaz).

20. *M. picta*, Pallas, Iter. Vol. 2, p. 719 (1773) (Alpes, Autriche, Russie, Turkestan).
decostigma, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 180 (1787).
silphoides, Schrank, Ent. Beob. Nat. Vol. 24, p. 82 (1789).
 * *quatuordecimguttata*, Olivier, Ent. Vol. 2, Gen. 32, p. 89, pl. 42, f. 138 (1790).
chrysostigma, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 2, p. 203 (1794).
picta, Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 249 (1803).
consobrina, Chevrolat, Rev. Zool. p. 395, pl. 6, f. 3 (1854).
 * *dccostigma*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 197 (1865).
21. *M. Drummondi*, Kirby, Fauna Bor. Amer. (1837), p. 159, pl. 2, f. 8 (1837) (Canada, États-Unis d'Amérique).
guttulata, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 221 (1853) (1).
22. *M. fulvoguttata*, Harris, New Engl. Farm. p. 2 (1829) (États-Unis d'Amérique, Sibérie).
guttulata, Gebler, Ledeb. Reise, p. 75 (1830).
discofunctata, Falderman, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 47, pl. 2, f. 5 (1833).
octospilota, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Apatura*, p. 4, pl. 1, f. 4 (1836).
croceosignata, Castelnau & Gory, idem, p. 5, pl. 1, f. 6.
decolorata, Castelnau & Gory, ibidem, f. 7.
Drummondi, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. 1. 236 (1843) (2).
23. *M. notata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Apatura*, p. 4, pl. 1, f. 5 (1836) (États-Unis d'Amérique).
luteosignata, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 70 (1837).
opaca, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 213 (1860).
24. *M. cuspidata*, Klug, Symb. Phys. p. 34, pl. 3, f. 8 (Sicile, Algérie, Syrie).
aequalis, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 71 (1837).
oxyura, Marquet, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, Vol. 8, p. 30 (1874).
aerata, Costa, Atti Soc. Napoli, Vol. 9, p. 142 (1882).
25. *M. acuminata*, De Geer, Mém. Ins. Vol. 4, p. 133 (1774) (Canada, États-Unis d'Amér., Suède, Bavière).
acuta, Gmelin, Syst. Nat. p. 1939 (1788).
appendiculata, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 210 (1794).
morio, Paykull, Faun. Suec. Vol. 2, p. 230 (1799).
atrofufpurea, Say, Journ. Acad. Philad. Vol. 3, p. 160 (1823).
longipes, Say, idem, p. 164.
immaculata, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 1, p. 8, pl. 2, f. 14 (1836).
Pecchioli, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Anthaxia*, p. 33, pl. 8, f. 46 (1836) (3).
26. *M. atra*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 74, pl. 13, f. 73 (1840) (Cayenne).
27. **M. coriacea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 468 (1894) (Bengale).
- — — — —
28. *M. aeneola*, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 146 (1846) (Etats-Unis d'Amérique).
metallica, Melsheimer, idem, p. 146.
29. *M. anthaxoides*, Marquet, L'Abeille, p. 368 (France méridionale).
30. *M. caudata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Apatura*, p. 8, pl. 2, f. 13 (1836) (Nouvelle-Orléans).
31. *M. chalcea*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 116 (1895) (Syrie).
32. *M. Chevrolati*, Saunders, Cat. Bupr. p. 47, n° 2 (1871).
inflammata || Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 70 (1839).
33. *M. Couradi*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 335 (1891) (Turkestan).
34. *M. consputa*, Le Conte, Pacif. Rep. Expl. p. 44 (1857) (Orégon).
35. *M. cordicollis*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 179 (1891) (Nouvelle-Calédonie).
36. *M. dentipennis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 155, pl. 39, f. 214 (1837) (Brésil).
37. *M. excavata*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 180 (1891) (Nouvelle-Calédonie).
38. *M. flammifrons*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 337 (1891) (Turkestan).
39. *M. inflammata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Apatura*, p. 6, pl. 2, f. 10 (1836) (Cayenne).
40. *M. inornata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 124, pl. 21, f. 122 (1840) (Brésil).
41. *M. intrusa*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 10, p. 105 (1882) (Californie).

(1) C'est à tort que Horn (*Trans. Amer. Ent. Soc.*, Vol. 10, p. 104, 1882) incline à penser que cette espèce peut être identifiée avec le *guttulata* Gebler, de Sibérie, qui n'en serait qu'une variété. Cette dernière espèce n'a pas de côtes élytrales et a plutôt les caractères de *M. fulvoguttata* Harris.

(2) Le *M. guttulata* Gebler, de Sibérie, est indiqué par de Marseul comme provenant de la Kirghisie, d'Irkoutsik et de la Mongolie. Un de mes exemplaires vient de la Daourie, l'autre de la Sibérie, sans autre indication plus précise; ils ne présentent aucune différence bien sensible avec le *M. fulvoguttata* Harris qui, suivant Horn, se trouve par tous les États-Unis d'Amérique.

(3) L'aire de dispersion de cette espèce est encore plus vaste que celle du *fulvoguttata* Harris. Elle s'étend, par tous les États-Unis d'Amérique et le Canada jusque dans l'Alaska et elle est répandue en Europe depuis la Laponie jusqu'au sud de l'Italie, d'où elle s'étend vers l'Orient, à travers la Sibérie jusqu'au Kamtschatka. Elle est toutefois assez rare en Europe.

42. *M. nigra*, Dugès, La Natureza. p. 8, pl. 1, f. 11 (1891) (Mexique).
43. *M. nigrita*, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 134 (1798) (Afrique méridionale).
regalis, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 187 (1801).
lugubrina, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 325 (1851).
44. *M. obscurata*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 331 (1892) (Japon).
45. *M. obtusa*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 10, p. 106 (1882) (Etats-Unis d'Amérique).
46. *M. orientalis*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 373 (1872) (Uruguay).
47. *M. prasina*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 73 (1837) (Brésil).
prasinata, Thomson, Typ. Bupr. Appl. 1a, p. 27 (1879).
48. *M. subcuprea*, Erichson, Voyage de Schomburgk en Guyane, Vol. 3, p. 557 (1848) (Guyane).
49. *M. unicolor*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 73, pl. 13, f. 71 (1840) (Cap de Bonne-Espérance).
50. *M. viridiobscura*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Apatura*, p. 5, pl. 2, f. 7 (1836) (Amérique centr.).

5. GENUS MERIMNA, THOMSON

Merimna. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 18 (1868) (non décrit); Thomson, Typ. Bupr. p. 42 (1878).

Caractères. — Tête élargie en avant et étroite en arrière sur le vertex; front aplani avec une étroite carène médiane, lisse et longitudinale; épistome court et large, profondément échancré en arc au milieu, l'échancrure subanguleuse; cavités antennaires petites, arrondies, subterminales et situées près des yeux. — Antennes médiocres; article 1 en massue épaisse, arquée et allongée; 2 très court, obconique; 3 deux fois aussi long que 2, cylindro-conique; les suivants triangulaires, peu élargis, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux allongés, elliptiques, assez forts, obliques et sensiblement rapprochés en dessus. — Pronotum large, peu convexe, bisinué en avant et en arrière, le lobe médian de la marge antérieure anguleux, celui de la base largement arqué; les côtés arqués en avant et droits en arrière avec l'angle postérieur abaissé et aigu. — Ecusson petit, triangulaire. — Elytres plans, larges, subparallèles, lobés et plus larges que le pronotum à la base, sinueux à hauteur des hanches postérieures, atténués ensuite et inermes jusqu'au sommet; celui-ci conjointement arrondi avec une très petite dent suturale. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum légèrement bombé, rétréci entre les hanches antérieures, dilaté ensuite et anguleux entre celles-ci et les médianes, atténué et arrondi à son sommet. — Mésosternum divisé: ses branches latérales arquées, la suture métasternale horizontale. — Métasternum tronqué en avant et étroitement sillonné au milieu. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la postérieure très oblique. — Pattes assez longues et grêles; fémurs antérieurs et médians très robustes, renflés au milieu, lobés sur leur bord interne et munis d'une dent obtuse, plus accentuée sur les antérieurs que sur les médians; tibias grêles et subcylindriques, les antérieurs et les médians arqués, les postérieurs droits; tarses antérieurs et médians robustes, leurs articles graduellement élargis du 1^{er} au 4^e, très échancrés et dentés de part et d'autre, les postérieurs grêles et plus longs que les tibias, le premier article très allongé, les suivants triangulaires et bidentés, le cinquième rectangulaire et allongé. — Côtés du premier segment abdominal remontant le long des hanches postérieures et recouvrant une partie des épipleures métasternales; segments abdominaux 1 à 4 avec une fossette latérale arrondie et assez profonde; extrémité du dernier segment largement échancrée en arc peu tendu (♂ ou ♀?). — Robuste, grand, oblong, large, peu convexe et noir.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre a été rangée par Hope, parmi les *Belionata* et par Castelnau & Gory parmi les *Chrysobothris*. L'armature des fémurs antérieurs justifierait l'erreur dans laquelle sont tombés ces auteurs, si les cavités antennaires, le front et d'autres caractères secondaires ne venaient confirmer l'opinion de M. Edw. Saunders, qui la range dans le voisinage des *Anthaxia*. Elle habite l'Australie.

1. *M. atrata*, Hope, Bupr. p. 10 (1836) (Australie).

12. GENUS TRIGONOGENIUM, HAROLD

Trigonophorus. † Solier, Gay, Hist. fis. Chile. Vol. 4, p. 493 (1851).

Trigonogenium. Harold, Col. Hefte. Livr. 5 (1869).

Caractères. — Tête courte; front légèrement concave; épistome court, large, creusé sur toute sa largeur, faiblement échancré en arc et séparé du front par une carène transversale; bord interne des joues formant une saillie aiguë le long de la cavité buccale; menton triangulaire; cavités antennaires assez grandes, recouvertes, subtriangulaires et terminales. — Antennes courtes et grêles à article 1 en massue; 2 très court, globulaire; 3 allongé, cylindro conique et presque aussi long que 1; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, allongés, subovales, presque parallèles et à peine rapprochés sur le vertex. — Pronotum deux fois aussi large que haut, la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian subanguleux; les côtés très arqués; sa base presque tronquée. — Ecusson petit, arrondi. — Elytres peu convexes, tronqués à la base, parallèles et droits sur les côtés antérieurs, régulièrement arqués et dentelés sur les bords du tiers postérieur au sommet; celui-ci conjointement arrondi et subacuminé. — Marge antérieure du prosternum largement et peu profondément échancrée en arc, son bord formé par un assez large bourrelet limité en arrière par un vague sillon transversal; prosternum large, court et subconvexe, son sommet anguleux. — Mésosternum divisé, ses branches latérales obliques et contiguës à leurs bases; la suture métasternale droite. — Métasternum tronqué en avant, sillonné au milieu. — Hanches postérieures subparallèles, faiblement dilatées au côté interne, leur marge antérieure horizontale et sinueuse, la postérieure oblique et faiblement cintrée. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, les antérieurs un peu plus épais que les médians et subfusiformes, les postérieurs cylindriques et légèrement aplanis sur leurs deux faces; tarses assez allongés, leurs articles diminuant graduellement en longueur, le premier article des postérieurs allongé, un peu plus court que les deux suivants réunis.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre habite le Chili.

1. *T. angulosum*, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 496 (1851) (Chili).

* *subaequale*, Fairmaire, Rev. Mag. Zool. p. 262 (1864).

* *ruginosum*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 624 (1867).

rugifer, Redtenbacher, Reise Novara, Col. Vol. 2, Col. p. 88 (1867).

13. GENUS CHALCOGENIA, THOMSON

Chalcogenia. (La Ferté mss). Saunders, Cat. Bupr. p. 51 (1871), non décrit; Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 25 (1879).

Caractères. — Tête large et plane; front uni, caréné ou légèrement bituberculé; épistome court et étroit, profondément échancré, l'échancrure subanguleuse; cavités antennaires petites, arrondies, terminales et situées à une certaine distance des yeux. — Antennes médiocres; article 1 épais, allongé et en massue; 2 très court, obconique; 3 deux fois aussi long que 2, triangulaire; les suivants plus courts et plus larges, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère subterminale située à l'extrémité de la tranche interne. — Yeux assez grands, elliptiques, allongés, obliques, distants en avant et rapprochés sur le vertex. — Pronotum large, légèrement bombé; la marge antérieure et la base tronquées, à peine sinueuses; les côtés arqués en avant et droits en arrière. — Ecusson assez grand pour le groupe, triangulaire. — Elytres tronqués à la base, droits sur les côtés, très légèrement élargis au tiers postérieur, obliquement atténués ensuite et dentelés sur les bords jusqu'au sommet; celui-ci subacuminé avec un très petit vide anguleux sutural. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large, plan ou faiblement sillonné, son sommet trifide, les pointes latérales aiguës et avancées entre les hanches antérieures et le mésosternum, la terminale très allongée et très aiguë. — Mésosternum divisé; ses bran-

ches latérales allongées; la suture métasternale un peu oblique et faiblement arquée. — Métasternum faiblement bilobé en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; les marges parallèles jusqu'à ce côté, ensuite divergentes. — Pattes peu robustes; fémurs assez épais, parfois plus robustes et arqués chez le ♂, subfusiformes; tibias normaux, subcylindriques; tarses un peu comprimés, le premier article des postérieurs aussi long que les deux suivants réunis. — Abdomen parfois sillonné au milieu; dernier segment ♂ largement et peu profondément échancré au milieu, ses côtés dentelés, ♀ caréné au milieu avec une très petite échancrure terminale. — Corps peu robuste, subovalaire, peu convexe et atténué en arrière.

Distribution géographique des espèces. — On connaît sept espèces de ce genre, toutes propres au continent africain et dont une en Egypte, quatre en Abyssinie et deux dans la région du Cap de Bonne-Espérance.

1. *C. sulcipennis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 299, pl. 50, f. 294 (1840) (Natal, Transvaal).
 2. *C. contempta*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 84 (1837) (Caffrerie, Cap de Bonne-Espérance).
metallica, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Anthaxia*, p. 5, pl. 1, f. 5 (1839).
cuprea, Castelnau & Gory, idem, f. 6.
depilata, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 329 (1851).
impressicollis, Fahreus, idem, p. 330.
cuprea, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 26 (1879).
 3. **C. Theryi*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 28 (1897) (Egypte).
 4. **C. suturalis*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 161 (1891) (Abyssinie).
**cupreosuturalis*, Fairmaire (*Chalcotania*), Rev. Ent. Caen, p. 101 (1892).
 5. **C. azurea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 266 (1899) (Abyssinie).
 6. *C. appendiculata*, Roth, Wieg. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 119 (1851) (Abyssinie).
-
7. *C. viriditarsis*, Nonfried, Ent. Nachtr. Vol. 18, p. 140 (1892) (Abyssinie).

14. GENUS TETRAGONOSCHEMA, THOMSON

Tetragonoschema. Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 116 (1851).

Pachypyga. Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. Vol. 5, p. 564 (1872).

Caractères. — Tête rectangulaire; front déprimé au milieu; épistome étroit, court et faiblement échancré au milieu; cavités antennaires grandes, arrondies et terminales, situées assez près du bord interne des yeux. — Antennes médiocres; article 1 épais et en massue; 2 et 3 courts, obconiques, égaux entre eux; 4 un peu plus long, triangulaire; les suivants assez épais, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, elliptiques et parallèles. — Pronotum plus large que long, bisinué en avant avec le lobe médian anguleux; les côtés plus ou moins arrondis avec les angles postérieurs droits ou obtus; la base tronquée. — Ecusson triangulaire. — Elytres courts, sinueux, subparallèles, tronqués à la base, largement et séparément arrondis au sommet, laissant le pygidium à découvert; celui-ci concave. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc; prosternum plan, acuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales subcontiguës; la suture métasternale horizontale. — Métasternum tronqué en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; la marge antérieure à peine sinueuse, la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux; tarses médiocres. — Abdomen court et convexe; le dernier segment ♂ avec une carène transversale, sinueuse au milieu, ♀ avec une large dépression transversale. — Corps aplani, écourté et rectangulaire.

Distribution géographique des espèces. — Les six espèces actuellement connues de ce genre très caractéristique proviennent des Antilles, du Guatemala, du Brésil et de la République Argentine.

1. **T. fossicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 297 (1900) (Goyaz).

2. **T. aenea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 332 (1899) (Goyaz).
 3. **T. purpurascens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 15 (1897) (Pernambuco, Goyaz).
-
4. *T. humeralis*, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 17, pl. 2, f. 1 (1882) (Guatemala).
 5. *T. quadrata*, Buquet, Rev. Zool. p. 194 (1841) (Brésil).
chrysomelina, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 116, pl. 10, f. 2 (1857).
 6. *T. undata*, Steinheil (*Pachyphyga*), Atti Soc. Ent. Ital. Vol. 5, p. 564 (1872) (Pampas).

15. GENUS NOTOGRAPHUS, THOMSON

Notograptus || Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 243 (1872).

Notographus. Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 26 (1879).

Caractères. — Tête assez large, en trapèze; front aplani; épistome court, étroitement échancré en arc; cavités antennaires médiocres, arrondies, situées à une certaine distance du bord interne des yeux et surmontées d'une faible carène oblique. — Antennes grêles; article 1 allongé, obconique; 2 et 3 courts; 3 plus court que 1 et 2 plus court que 3; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux allongé, subréniformes, elliptiques, un peu obliques et légèrement rapprochés sur le vertex. — Pronotum plus large que long, rétréci à la base, sa plus grande largeur avant le milieu; la marge antérieure échancrée en arc avec l'angle antérieur avancé et aigu; les côtés arqués; la base bisinuée avec un large lobe médian arrondi. — Ecusson triangulaire, un peu plus long que large. — Elytres plans, faiblement lobés à la base, droits sur les côtés antérieurs, brusquement atténués et dentelés du tiers postérieur sommet; celui-ci séparément arrondi. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum aplani, trifide au sommet, l'angle médian aigu et avancé entre les branches du mésosternum. — Celui-ci divisé; ses branches latérales subparallèles; la suture métasternale à peine oblique. — Métasternum faiblement échancré en avant, sillonné au milieu. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure et la postérieure sinueuses au côté interne et subparallèles à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux; tarses assez longs et grêles; le premier article des postérieurs aussi longs que les deux suivants réunis. — Dernier segment abdominal légèrement excavé au milieu; le sommet tronqué (♂ ou ♀ ?). — Corps aplani, ses côtés subparallèles, arrondi en avant et en arrière, le pronotum très atténué à la base.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que deux espèces de ce genre, toutes deux de l'Australie, mais plus spécialement de la Tasmanie.

1. *N. sulcipennis*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 244 (1872) (Australie, Tasmanie).
2. *N. hieroglyphicus*, Mac Leay, idem, p. 243 (Tasmanie)

16. GENUS ANILARA, THOMSON

Anilara (H. Deyrolle mss), Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 19 (1868) (non décrit); Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 28 (1879).

Caractères. — Tête large et convexe; front uni ou faiblement déprimé en avant au-dessus de l'épistome; celui-ci très court et large, tronqué ou faiblement sinué en avant; cavités antennaires médiocres, arrondies, terminales et situées assez loin du bord interne des yeux. — Antennes courtes, assez épaisses; article 1 robuste, allongé, en massue arquée; 2 et 3 subégaux, obconiques, un peu plus courts que 1; les suivants épais, triangulaires, écourtés, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez gros, saillants, oblongs, parallèles ou obliques, dans ce cas légèrement

rapprochés sur le vertex. — Pronotum assez grand, toujours plus large que haut; la marge antérieure bisinué avec un lobe médian anguleux; les côtés variables, arqués au milieu ou avant le milieu, sinueux ou droits en arrière; la base tronquée ou subsinueuse. — Ecusson petit, en triangle allongé. — Elytres tronqués à la base; leurs côtés parallèles jusqu'au tiers supérieur, ensuite atténués jusqu'au sommet; celui-ci subacuminé ou arrondi. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large, obtusément anguleux au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales contiguës à leurs bases; la suture métasternale horizontale. — Métasternum sillonné au milieu. — Hanches postérieures courtes et sinueuses; les marges parallèles et légèrement distantes au côté interne. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et postérieurs assez épais, subfusiformes, les postérieurs moins robustes, cylindriques et aplanis; tibias grêles et normaux; tarsi peu robustes, le premier article des postérieurs plus long que le suivant. — Premier et deuxième segments abdominaux soudés, plus longs ensemble que les trois suivants réunis; segment 1 plus long que 2, 3 et 4 très courts, subégaux entre eux, le 5^e triangulaire, rebordé sur son pourtour et largement déprimé, la dépression profonde et semi-circulaire. — Corps aplani, rectangulaire, avec une tache postmédiane, comme aux deux élytres et brillante, allongée ou transversale, tranchant sur le fond mat et visible seulement sous un certain angle.

Distribution géographique des espèces. — La majeure partie des espèces de ce genre habite l'Australie; une seule se trouve au Brésil et deux dans l'Afrique équatoriale.

1. **A. brasiliensis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 15 (1897) (Bahia).
 2. *A. Adelaidae*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 216 (1846) (Australie).
 3. **A. viridula*, Kerremans, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Vol. 19, 60 (1902) (Tasmanie).
 4. **A. nigrita*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 130 (1898) (Australie).
 5. **A. sulcicollis*, Kerremans, idem, p. 129 (1898) (Nouvelles-Galles du Sud).
 6. **A. tasmanica*, nov. sp. (1) (Tasmanie).
 7. **A. cuprescens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 131 (1898) (Australie).
 8. *A. Deyrollei*, Thomson, Tvp. Bupr. App. 1 a, p. 29 (1879) (Australie).
planifrons, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 247 (1887).
 9. *A. angusta*, Blackburn, idem, p. 296 (1887) (Australie).
 10. **A. sulcipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 129 (1898) (Rockhampton).
 11. **A. uniformis*, Kerremans, idem, p. 131 (Nouvelle-Zélande, Australie).
 12. **A. convexa*, Kerremans, ibidem, p. 132 (Australie).
-
13. *A. gemmata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Anthaxia*, p. 28, pl. 6, f. 38 (1839) (Cap de B.-Esp.).
 14. *A. laeta*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 294 (1891) (Australie méridionale).
 15. *A. platessa*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 29 (1879) (Adelaïde).
 16. *A. semireticulata*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 75 (1838) (Sénégal).
rotundicollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Anthaxia*, p. 6, pl. 2, f. 8 (1839).
 17. *A. soror*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 296 (1891) (Queensland).
 18. *A. subcostata*, Blackburn, idem, p. 296 (Australie méridionale).

17. GENUS ANTHAXIA, ESCHSCHOLTZ

Anthaxia. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 9 (1829); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 297, pl. 12, f. 22 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col.

(1) Long. 5; larg. 1, 7 mm. — Oblong, aplani, écorté, entièrement noir; le front verdâtre. — Plus large et un peu plus écorté que *sulcicollis*, le dessus moins mat et plus rugueux, le sillon médian du pronotum moins net, deux sillons latéraux plus allongés et plus accentués, la marge antérieure du pronotum plus fortement bisinuée avec un lobe médian plus avancé et plus anguleux. — Tête brillante et finement granuleuse; pronotum finement granuleux avec des petites rides sinueuses et transversales, ses côtés régulièrement arqués et médiocrement dilatés; élytres granuleux. Dessous noir, un peu plus brillant que le dessus. — Tasmanie.

Vol. 4, p. 49 (1857); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 76 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 201 (1865).

Cratomerus. Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 295, pl. 12, f. 21 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839).

Caractères. — Tête enfoncée, verticale; front aplani ou convexe, parfois impressionné en avant; épistome court, assez large et sinueux; cavités antennaires petites, arrondies, terminales et situées plus près de l'épistome que du bord interne des yeux. — Antennes courtes et grêles, exceptionnellement robustes chez le ♂ (*Cratomerus*); article 1 allongé, en massue; 2 et 3 courts, obconiques; 3 ordinairement plus long que 2; 4 et suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovalaires, allongés, subparallèles ou rapprochés sur le vertex, leur bord interne sinueux. — Pronotum transversal, rarement presque aussi long que large, subquadrangulaire; la marge antérieure échancrée ou bisinuée, dans ce cas avec un lobe médian plus ou moins anguleux; les côtés plus ou moins dilatés et arqués; la base tronquée. — Ecusson petit, triangulaire et subpentagonal. — Elytres tronqués à la base, subparallèles de la base au tiers postérieur et ensuite obliquement atténués en arrière, ou bien atténués de la base au sommet; le bord postérieur dentelé ou inerme. — Marge antérieure du prosternum tronquée et rebordée; prosternum large, plan, parallèle, prolongé en pointe aiguë au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales arquées; la suture métasternale tronquée. — Métasternum tronqué en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures médiocrement dilatées au côté interne; la marge antérieure sinueuse et horizontale, la postérieure oblique et à peine arquée. — Pattes plus ou moins robustes, le plus souvent grêles; fémurs fusiformes, assez épais, les postérieurs ♂ parfois (*Cratomerus*) très renflés et arqués; tibia grêles et cylindriques; tarses s'élargissant graduellement du 2^e au 4^e article, le premier des postérieurs allongé, 2 plus court, 3 et 4 élargis et cordiformes. — Premier et deuxième segments abdominaux soudés, la soudure plus nette sur les côtés. — Corps ovalaire, peu convexe en dessus, rarement allongé; taille petite ou au plus moyenne.

Les caractères qui différencient les *Cratomerus* des *Anthaxia* : antennes épaisses avec les articles médians élargis, fémurs postérieurs renflés et arqués chez le ♂, sont peu constants et varient non seulement d'une espèce à l'autre, mais aussi d'individu à individu dans une même espèce. Ils ne peuvent donc servir à délimiter un genre et pourraient même difficilement servir à former un groupe dans le genre.

Distribution géographique des espèces. — On a découvert des *Anthaxia* dans toutes les régions du globe, hormis en Australie. Le noyau de densité de ce genre est l'Europe; il n'en existe que peu d'espèces sur le vaste territoire des Etats-Unis d'Amérique et l'Afrique paraît n'en posséder qu'un très petit nombre.

1. *A. hungarica*, Scopoli, Obs. Zool. (Ann. Nat. Hist. Vol. 5), p. 104 (1772) (Alpes, Pyrén., Hongr., Algér.).
trochilus, Fabricius, Gen. Ins. p. 236 (1777).
elegantula, Schrank, Ins. Austr. p. 195 (1781).
cyanicornis, Fabricius, Spec. Ins. Vol. 1, p. 278 (1781).
Stephanellii, Petagna, Ins. Calab. p. 22 (1787).
femorata, Villers, Ent. Vol. 1, p. 338, pl. 1, f. 40 (1789).
exaltata, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 136 (1898).
sitta, Küster, Käfer Eur. p. 24 (1846).
* *cyanicornis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 210 (1865).
juvenilis, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 116 (1895).
algorica, Abeille.
2. *A. Bonvouloiri*, Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 401 (1869) (Algérie).
3. *A. diadema*, Fischer, Ent. Ross. p. 196, pl. 21, f. 3 (1823) (Algérie).
adusta, Küster, Coleopt. Vol. 24, p. 76 (1852).
4. *A. scorzonerae*, Friwalds, Coleopt. Balk. p. 21, pl. 7 (1828) (Turquie).
* *scorzonerae*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 242 (1865).
5. * *A. divina*, Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 415, pl. 12, f. 10 (1856) (Asie mineure).
sponsa, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 82, note (1857).
nupta, Kiesenwetter, idem, p. 82.

6. *A. Eugeniae*, Ganglbauer, Deutsch. Ent. Zeit. p. 317 (1885) (Syrie).
7. **A. amplithorax*, nov. sp. (1) (Afrique orientale allemande).
8. **A. nigricornis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 302 (1898) (Natal).
9. **A. Hauzeri*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 304 (1900) (Afrique orientale allemande).
10. **A. dispar*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 400 (1898) (Lac Moero, Transvaal).
11. **A. pilifrons*, Kerremans, ibidem, p. 299 (Lac Moero).
12. **A. Duvivieri*, Kerremans, ibidem, p. 300 (Lac Moero).
13. *A. Kiesenwetteri*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 228 (1865) (Salonique).
melancholica || Kraatz, Berl. Ent. Zeit. p. 121 (1862).
14. *A. tenuicauda*, Boheman, Oefv. Vet. Ak. Forh. p. 18 (1860) (Damara, Natal).
15. **A. zanzibarica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 301 (1898) (Zanzibar).
16. *A. angustipennis*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 36, pl. 3, f. 10 (1829) (Egypte).
stufida, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 224 (1865).
17. **A. fossicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 266 (1899) (Usumbara).
18. *A. congregata*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 35, pl. 3, f. 9 (1829) (Perse).
arabs, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 216 (1865).
* *congregata*, Marseul, idem, p. 217.
19. *A. Thunbergi*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 6, pl. 2, f. 7 (1839) (Cap de Bonne-Espérance).
20. **A. obockiana*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 99 (1892) (Obock).
21. *A. plicata*, Kiesenwetter, Berl. Ent. Zeit. p. 58 (1859) (Serbie).
22. **A. aterrima*, nov. sp. (2) (Cap de Bonne-Espérance).
23. *A. rugicollis*, Lucas, Expl. Alg. Ins. p. 156, pl. 15, f. 12 (1846) (Algérie).
* *rugicollis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 251 (1865).
24. *A. corsica*, Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 206 (1861) (Corse).
25. **A. biimpressa*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 248 (1865) (Algérie, Egypte).
Marmottani, Brisout, Rev. Ent. Caen, Vol. 2, p. 81 (1883).
26. *A. sepulchralis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 34, pl. 8, f. 48 (1839) (France, Bohême, Algérie).
umbellatarum || Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 81, pl. 3, f. 23 (1790).
istriana, Roth, Beitr. Eur. Vol. 1, p. 13 (1847).
* *sepulchralis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 253 (1865).
27. **A. Chobauti*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 64 (1894) (Algérie).
28. **A. collaris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 334 (1893) (Sumatra, Bengale).
29. *A. viridifrons*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 284, pl. 47, f. 277 (1841) (Etats-Unis d'Amér.).
viridicornis || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 5, f. 25 (1839).
subacnea, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 216 (1859).
30. **A. smaragdifrons*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 222 (1865) (Algérie).
polychloros, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 64 (1894).
31. *A. Hackeri*, Frivalsky, Term. Fuzet. Vol. 8, p. 371 (1884) (Hongrie).
32. **A. rudis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 336 (1892) (Bengale).
33. *A. cupriventris*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 215 (1865) (Syrie).

(1) Long. 7, 2; larg. 2 mm. — Oblong, ovale, élargi en avant et atténué en arrière, bleu verdâtre en dessus avec les côtés du pronotum et la base des élytres verdâtres. Le milieu de ceux-ci bien ainsi que deux lignes sur le pronotum. Dessous bleu brillant à reflets verts. — Faciès des précédents, mais plus écourté et plus trapu, les élytres moins aplanis, et légèrement convexes. — Tête finement granuleuse et couverte de points aréolés très denses, front impressionné en avant au-dessus de l'épistome, l'impression triangulaire; épistome étroit et anguleusement échancré au milieu; antennes assez courtes les articles dentés épais et globulaires. Pronotum grand, élargi un peu avant le milieu, couvert d'une ponctuation semblable à celle de la tête, mais moins épaisse au milieu, sur les lignes bleues que sur les côtés; la marge antérieure largement et peu profondément échancrée en arc, les côtés arqués; la base subsinueuse avec les angles postérieurs abaissés et aigus. Elytres granuleux, tronqués à la base, biimpressionnés de part et d'autre et le long de celle-ci, finement rebordés sur les côtés et dentelés du tiers postérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous granuleux, couvert de rugosités simulant des fines écailles et revêtu d'une fine pubescence blanchâtre très espacée. — Afrique orientale: Massai.

(2) Long. 6,5; larg. 2,5 mm. — Noir profond, très légèrement bleuâtre en dessus, les dépressions légèrement pourprées ou violacées; dessous bronze brillant, antennes et tarses noirs ou bleuâtres; villosité gris blanchâtre. — Un peu plus large et plus parallèle que *plcata* Kiesenwetter, plus rugueux en dessus, le front plus large, plus finement sillonné sur le vertex, le pronotum plus allongé avec le sillon médian plus net mais ne touchant pas les extrémités, les fossettes latérales plus grandes et plus accentuées, les élytres moins plissés, l'allure des plis différente, la coloration générale toute autre. — Tête finement réticulée, les mailles très serrées; vertex avec un très fin sillon médian. Pronotum plus rugueux sur les côtés que sur le disque, vaguement réticulé dans l'angle postérieur, transversalement et finement ridé au milieu; les côtés un peu plus larges en avant qu'en arrière, faiblement arqués avant le milieu et droits ensuite; le milieu du disque profondément sillonné au dessus de l'écusson, le sillon atteignant à peu près la moitié de la longueur du pronotum; les côtés assez largement déprimés dans l'angle postérieur. Ecusson allongé et subpentagonal. Elytres rugueux et ponctués ayant chacun deux vagues impressions arrondies, l'une au tiers antérieur et l'autre au postérieur; le calus huméral prolongé en large côte sinueuse, limité intérieurement par un sillon linéaire peu allongé et extérieurement par un large sillon sinueux naissant sous le calus et finissant vers le tiers postérieur des élytres; la marge latérale légèrement creusée en gouttière. — Cap de Bonne-Espérance.

34. *A. cyanescens*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 284, pl. 47, f. 276 (1841) (Espagne, Algérie).
luctuosa, Lucas, Expl. Alg. Ent. p. 137 (1846).
aeneiventris, Küster, Col. Vol. 23, p. 31 (1851).
 * *cyanescens*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 246 (1865).
35. *A. quadripunctata*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 1, p. 410 (1758) (Europe).
punctata, Ponza, Mem. Acad. Sc. Torino, Vol. 13, p. 81 (1805).
Godeti, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 31, pl. 7, f. 42 (1839).
granulata, Küster, Col. Vol. 23, p. 27 (1851).
angulicollis, Küster, idem, p. 28.
angulata, Küster, ibidem, p. 50.
quadriimpressa, Motschulsky, Mem. Biol. Acad. Petrop. Vol. 3, p. 226 (1859).
 * *quadripunctata*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 253 (1865).
36. * *A. aeneopicea*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 71 (1900) (Cachemyre).
37. *A. nigritula*, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 52 (1839) (Pyrénées, Corse, Algérie).
umbellatarum, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pl. 7, f. 40 (1839).
 * *pratricula*, La Ferté, Rev. Zool. p. 49 (1841).
38. * *A. helvetica*, Stierlin, Mitth. Schw. Ent. Ges. Vol. 2, p. 345 (1868) (France, Suisse).
39. *A. morio*, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 2, p. 210 (1792) (Russie).
 * *morio*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 249 (1865).
similis, Saunders, Cat. Bupr. p. 54, no 65 (1871).
40. *A. aeneogaster*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 32, pl. 7, f. 44 (1839) (Etats-Unis).
inornata, Randall, Journ. Bost. Vol. 2, p. 4 (1839).
expansa, Le Conte, Pacif. Rep. Expl. Vol. 11, p. 44 (1857).
imperfecta, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 215 (1859).
retifer, Le Conte, idem, p. 215.
 * *foveicollis*, Le Conte, ibidem, p. 215.
strigata, Le Conte, ibidem, p. 215.
41. * *A. carinifrons*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 351 (1893) (Turkestan).
42. * *A. tenella*, Kiesenwetter, Berl. Ent. Zeit. p. 246 (1858) (Grèce).
 * *tenella*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 256 (1865).
43. * *A. nigritorum*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 301 (1898) (Zanguebar).
44. *A. viridicornis*, Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 162 (1823) (Missouri).
45. *A. corynthia*, Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 414 (1856) (Grèce, Syrie).
griseocuprea, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 99 (1857).
pinguis, Kiesenwetter, Entom. Monatsb. Vol. 2, p. 131.
46. * *A. sericea*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 286 (1891) (Algérie).
47. * *A. virescens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 335 (1898) (Bengale).
48. * *A. subviolacea*, Kerremans, idem, p. 335 (Bengale).
49. * *A. Sedilloti*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 129 (1893) (Tunisie).
50. *A. pumila*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 37, pl. 3, f. 11 (1829) (Egypte).
51. * *A. pulex*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 130 (1893) (Egypte).
52. * *A. Gastoni*, Desbrochers, Le Frelon (1902) (Algérie).
53. * *A. capensis*, nov. sp. (1) (Cap de Bonne-Espérance).
54. *A. Martini*, Brisout, Rev. Ent. Caen, Vol. 2, p. 82 (1883) (Algérie).
55. *A. confusa*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 296, pl. 50, f. 291 (1841) (France, Corse, Syrie).
 * *confusa*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 99 (1857).
 * *confusa*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 251 (1865).
56. *A. nitidula*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 1, p. 410 (1758) (Europe).
laeta, Fabricius, Syst. Ent. p. 123 (1775).
styria, Voet, Cat. Col. Vol. 1, p. 95, pl. 50, f. 18 (1806).
signaticollis, Krynick, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 92, pl. 3, f. 4 (1832).
cyanipennis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 286, pl. 48, f. 279 (1841).
 * *nitidula*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 239 (1865).

(1) Long. 4,2; larg. 1,5 mm. — Oblong, subparallèle, écourté, peu convexe, largement arrondi en arrière, bronzé en dessus, clair et brillant sur le front, mat sur le pronotum, obscur et brillant sur les élytres; dessous noir brillant légèrement verdâtre. — Tête finement réticulée, front vaguement sillonné. Pronotum à réticulations semblables à celles de la tête, ses côtés arrondis, leur plus grande largeur un peu avant le milieu, le milieu du disque sillonné, les angles postérieurs impressionnés. Elytres régulièrement striés ponctués, le calus huméral allongé et prolongé suivant une étroite côte sinueuse, la marge latérale creusée en gouttière et impressionnée par une série de points qui s'élargissent graduellement jusqu'au sommet. Dessous plus brillant que le dessus. — Cap de Bonne-Espérance.

57. *A. quercata*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 216 (1801) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).
viridicornis, var. Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 4, p. 161 (1834).
cuneiformis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 290, pl. 48, f. 284 (1841).
bivittata, Gory, idem, p. 292, pl. 49, f. 286.
58. **A. namula*, Casey, Contrib. Vol. 2, p. 174 (1884) (Californie).
59. *A. senilis*, Wollaston, Col. Canar. p. 208 (1864) (Madère).
60. **A. Olivieri*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 28, pl. 7, f. 39 (1839) (Rhodes).
cichorii, var. Schœnherr, Syn. Ins. Vol. 1, p. 260 (1817).
61. *A. deleta*, Le Conte, Bull. U. S. Geol. Surv. Vol. 4, p. 459 (Etats-Unis d'Amérique).
62. *A. umbellatarum*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 183 (1787) (Pyrénées, Dalmatie, Turquie).
inculta, Germar, Reis. Dalm. p. 217 (1817).
* *inculta*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 224 (1865).
63. *A. cichorii*, Olivier, Ent. Vol. 2, Gen. 32, p. 91, pl. 12, f. 151 (1790) (France, Corse, Algérie, Asie-Mineure).
auripennis, Sturm, Cat. p. 104 (1826).
chlorocephala, Lucas, Expl. Alg. Col. Vol. 2, p. 155, pl. 16, f. 2 (1846).
* *cichorii*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 86 (1857).
* *cichorii*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 220 (1865).
64. *A. millefolii*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 215 (1801) (Europe, Caucase, Syrie, Algérie).
umbellatarum, || Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 201 (1801).
chamomillae, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 90 (1837).
* *millefolii*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 84 (1857).
* *millefolii*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 221 (1865).
pleuralis, Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Bel. Vol. 27, p. 157 (1883).
65. **A. binotata*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 75 (1838) (Sénégal).
aurata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 27, pl. 6, f. 35 (1839).
66. **A. senegalensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 302 (1898) (Sénégal).
67. *A. polychloros*, Abeille (Syrie).
68. *A. mundula*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 85, note (1857) (Syrie).
69. **A. auricollis*, nov. sp. (2) (Bengale).
70. **A. capitata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 173 (1892) (Bengale).
71. *A. Baconis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1A, p. 27 (1879) (Himalaya).
72. *A. funerula*, Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 251 (1803) (Alsace, Suisse, Corse, Morée, Maroc).
* *pygmaea*, Brullé, Expl. Morée, p. 134 (1832).
* *Chevrieri*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 33, pl. 8, f. 45 (1839).
Spinolae, Castelnau & Gory, idem, p. 36, pl. 8, f. 40.
bannatica, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 297, pl. 50, f. 292 (1841).
* *funerula*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 246 (1865).
73. *A. Proteus*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 511 (1873) (Japon).
74. *A. hypomelaena*, Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 252 (1803) (Pyrénées, Savoie, Grèce).
nitidicollis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 287, pl. 48, f. 280 (1841).
annulicollis, Sturm, Cat. p. 62 (1843).
* *hypomelaena*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 240 (1865).
75. *A. praeclara*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 87 (1837) (Grèce).
variipennis, Küster, Käf. Eur. Vol. 2, p. 23 (1851).
76. *A. israelita*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 146 (1882) (Syrie).
77. *A. Croesus*, Villers, Ent. Vol. 1, p. 339 (1789) (Sardaigne, Sicile, Algérie, Maroc).
viminalis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 14, pl. 3, f. 17 (1839).
* *scutellaris*, Génè, Mém. Ac. Soc. Torino, p. 52, pl. 1, f. 7 (1839).
fulgidipennis, Lucas, Expl. Alg. Col. p. 155, pl. 15, f. 13 (1846).
ditescens, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 42 (1872).
78. **A. vittula*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 91 (1857) (Grèce).
79. *A. fulgidipennis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 218 (1865) (Syrie).
olympica, Kiesenwetter, Ent. Monatsb. Vol. 2, p. 131.
ignipennis, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 146 (1882).

(2) Long. 4; larg. 1 mm. — Oblong, peu convexe, atténué en arrière; front vert doré à reflets cuivreux; élytres verts. Dessous vert en avant et obscur en arrière. — Tête plane, très finement réticulée et à granulations excessivement fines; pronotum large, subquadrangulaire, à sculpture semblable à celle de la tête, les côtés faiblement arqués, leur plus grande largeur un peu après le milieu avec les angles postérieurs obtus et présentant une fossette arrondie assez éloignée du bord et située à égale distance de celui-ci et de la base; élytres moins rugueux que le pronotum, très finement granuleux et à ponctuation indistincte, dentelés sur les bords depuis le milieu jusqu'au sommet, celui-ci séparément arrondi avec un vide sutural anguleux. — Bengale; Barway.

80. *A. parallela*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 15, pl. 3, f. 18 (1839) (France, Esp., Alg., Syr.).
basalis, Küster, Käf. Eur. Vol. 10, p. 29 (1847).
81. *A. aurulenta*, Fabricius, Mant. Ins. p. 182 (1787) (Autriche, Podolie, Algérie).
deaurata, Gmelin, Syst. Nat. p. 1934 (1788).
senicula, Schrank, Ent. Beob. Naturf. Vol. 14, p. 85 (1789).
auricolor, Herbst, Col. Vol. 9, p. 88, pl. 147, f. 4 (1801).
Hanacki, Küster, Col. Vol. 23, p. 18 (1851).
* *auricolor*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 226 (1865).
82. *A. candens*, Panzer, Fauna Germ. Vol. 1, p. 9 (1789) (France, Bavière, Hongrie).
fulminans, Schrank, Ent. Beob. Naturf. Vol. 24, p. 84 (1789).
fulminatrix, Herbst, Col. Vol. 9, p. 297 (1801).
* *candens*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 233 (1865).
83. *A. lucens*, Küster, Käf. Eur. Vol. 24, p. 66 (1852) (Illyrie, Hongrie).
candens || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pl. 2, f. 12 (1839).
* *lugens*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 92 (1857).
* *lucens*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 234 (1865).
phaenica, Ganglbauer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 1, p. 68 (1882).
urens, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 147 (1882).
84. *A. Passerinii*, Pecchioli, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 446, pl. 16, f. 7 (1837) (Italie).
85. *A. salicis*, Fabricius, Gen. Ins. p. 237 (1781) (France, Allemagne, Savoie, Etats-Unis d'Amérique).
* *salicis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 231 (1865).
86. *A. brevis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 18, pl. 4, f. 22 (1839) (Grèce).
ephippiata, Redtenbacher, Denks. Akad. Wien. Vol. 1, p. 47 (1850).
* *brevis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 230 (1865).
87. *A. semicuprea*, Küster, Käf. Eur. Vol. 23, p. 21 (1851) (Hongrie).
88. *A. fulgurans*, Schrank, Entom. Beob. Naturf. Vol. 24, p. 85 (1789) (Europe, Altaï).
nitida, Rossi, Faun. Etrur. Mant. p. 63 (1790).
bifurcata, Olivier, Ent. gen. 32, p. 81, pl. 11, f. 118, a. b.
lucidula, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 4, p. 451 (1784).
formosa, Thomson, Trav. Hung. p. 466, pl. 11, f. 8 (1797).
nitens, Fabricius, Syst. Eteuth. Vol. 2, p. 215 (1801).
foveolata, Herbst, Col. Vol. 9, p. 233, pl. 147, f. 12 (1801).
fulgens, Herbst, idem, p. 242, pl. 147, f. 10.
dorsalis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 18, pl. 4, f. 21 (1839).
azurescens, Castelnau & Gory, idem, p. 23.
* *nitida*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 237 (1865).
89. *A. dimidiata*, Thumberg, Nov. Sp. Ins. Diss. Vol. 5, p. 91 (1789) (Portugal, Sicile, Algérie).
saliceti, Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 254 (1803).
90. *A. podolica*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 89 (1837) (Tyrol, Corse).
grammica, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 4, f. 24 (1839).
* *grammica*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 98 (1857).
91. *A. Myrmidon*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 214 (1891) (Espagne, Syrie).
92. *A. bicolor*, Faldernmann, Mém. Soc. Nat. Mosc. Vol. 4, p. 149, pl. 5, f. 4 (1835) (Crimée, Caucase, Syrie).
* *bicolor*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 236 (1865).
togata, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 214 (1891).
93. * *A. Weyersi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 10 (1890) (Sumatra).
94. *A. concinna*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 88 (1837) (Chili).
optata, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 296, pl. 50, f. 291 (1841).
95. *A. manca*, Linné, Syst. Nat. (ed. 12), p. 1067 (1767) (France, Savoie, Caucase).
bistriata, Fabricius, Syst. Ent. p. 222 (1774).
elongatula, Schrank, Ent. Austr. p. 365 (1781).
rubina, Fourcroy, Ent. Paris, Vol. 1, p. 33 (1785).
* *manca*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 227 (1865).
96. *A. verecunda*, Erichson, Nov. Act. Leop. Acad. Suppl. p. 229 (1834) (Chili).
97. * *A. chinensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 132 (1898) (Hong-Kong).
98. * *A. splendida*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 76 (1838) (Natal, Cap de Bonne-Espérance).
marginata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 27, pl. 6, f. 36 (1839).
viridis, Castelnau & Gory, idem, f. 37.
99. * *A. anatolica*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 75 (1838) (Sardaigne, Grèce, Syrie, Algérie).
* *ferulae*, Génè, Mem. Acad. Sc. Torino, p. 53, pl. 1, f. 8 (1839).
vittaticollis, Lucas, Rev. Zool. p. 89 (1844).
hilaris, Mulsant, Ann. Soc. Agr. Lyon, p. 7 (1855).
Mulsanti, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 243 (1865).

100. *A. auriceps*, Ménétries, Mém. Acad. Petrop. Vol. 6, p. 45, pl. 2, f. 4 (1849) (Turkestan).
 101. **A. cupriceps*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 717 (1858) (Chili).
 102. *A. marginicollis*, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 502, pl. 12, f. 10 (1851) (Chili, Tucuman).
-
103. *A. abyssinica*, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 108 (1896) (Abyssinie).
 104. *A. acutiangula*, Motschulsky, Schr. Reis. p. 108 (1860) (Sibérie occidentale).
 105. *A. aenea*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pl. 2, f. 9 (1839) (Afrique).
trivialis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 295, pl. 49, f. 290 (1841).
 106. *A. aenescens*, Casey, Contrib. Vol. 2, p. 175 (1884) (Californie).
 107. *A. Appoloni*, Ballion, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 43, p. 349 (1871) (Turkestan).
 108. *A. auriventris*, Ballion, idem, p. 350 (Turkestan).
 109. *A. Bedeli*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 132 (1893) (Algérie).
 110. *A. berytensis*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 117 (1895) (Beyrouth).
 111. *A. callicera*, Gerstaecker, Jahrb. Wiss. Anst. Hamb. Vol. 1, p. 52 (1884) (Afrique orientale).
 112. *A. chlorocephala*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 76 (1838) (Cap Bonne-Espérance).
 113. *A. Conradi*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 337 (1890) (Turkestan).
 114. *A. cordicollis*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 179 (1891) (Nouvelle Calédonie).
 115. *A. cupripes*, Mac Leay (1), Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 242 (1872) (Gayndakh).
 116. *A. cyanella*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 285, pl. 47, f. 278 (1841) (Etats Unis d'Amérique).
scoriacea, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 148 (1846).
 117. *A. Demaisoni*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 230 (1895) (Perse).
 118. *A. denticulata*, Roth, Wieg. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 119 (1851) (Abyssinie).
 119. *A. duo*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 31, p. 599 (1897) (Transcaucasie).
 120. *A. excavata*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 180 (1891) (Nouvelle Calédonie).
 121. *A. facialis*, Erichson, Wieg. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 224 (1843) (Angola).
 122. *A. fariniger*, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 314 (1882) (Samarkande).
 123. *A. flammifrons*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 337 (1890) (Turkestan).
 124. *A. Feldtschenkoi*, Semenow, idem, Vol. 30, p. 346 (1895) (Turkestan).
 125. *A. Fritschii*, Heyden, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 31, p. 446 (1887) (Mogador).
 126. *A. Gerneti*, Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 4, p. 35 (1886) (Lac Aral).
 127. *A. hemichrysis*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 353 (1893) (Askhabad).
 128. *A. Heydeni*, Abeille, idem (Turkestan).
 129. *A. hirticollis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 131 (1893) (Beyrouth).
 130. *A. humilis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 293, pl. 49, f. 288 (1841) (Bengale).
 131. *A. hyrcana*, Kiesenwetter, Ent. Monatsb. Vol. 2, p. 132 (1881) (Astrabad).
 132. *A. implexa*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 328 (1851) (Natal).
 133. *A. Kollari*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 214 (1865) (Mésopotamie).
 134. *A. Kruperi*, Ganglbauer, Deutsch. Ent. Zeit. p. 317 (1885) (Smyrne).
 135. *A. lucidiceps*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 289, pl. 48, f. 282 (1841) (Boukkarah).
 136. *A. Magdalenae*, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 140 (1884) (Turquie).
 137. *A. malachitica*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 129 (1893) (Tunisie).
 138. *A. marginata*, Thunberg, Mus. Acad. Ups. Vol. 4, p. 52 (1787) (Cap de Bonne-Espérance).
coerulea, Thunberg, Nov. Sp. Ins. Vol. 5, p. 91 (1789).
hilaris, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 293, pl. 49, f. 287 (1841).
sulcaticeps, Abeille, Etud. Col. Cav. p. 31.
 139. *A. Mascheli*, Kiesenwetter, Ent. Monatsb. Vol. 2, p. 130 (Astrabad).
 140. *A. melancholica*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 283, pl. 47, f. 275 (1841) (Sénégal).
 141. *A. Midas*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 90 (1857) (Italie).
Crocus || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 16, pl. 4, f. 19 (1839).
 142. *A. miranda*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 74 (1864) (Singapour).
 143. *A. morosa*, Kerremans, idem, Vol. 36, p. 173 (1892) (Bengale).
 144. *A. nigra*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 243 (1872) (Gayndah).

(1) Les espèces australiennes décrites par Mac Leay sous le nom d'*Anthaxia* sont probablement des *Anilara*, mais les descriptions sont insuffisantes pour se prononcer avec certitude.

145. *A. nitidiventris*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 160 (1901) (Madagascar).
146. *A. obscura*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 242 (1872) (Gayndah).
147. *A. obscurata*, Reed, An. Univ. Chile, Vol. 38, p. 411 (1873) (Chili).
148. *A. occipitalis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 75 (1864) (Bornéo).
149. *A. Paulseni*, Fairmaire & Germain, Rev. Zool. p. 268 (1860) (Chili).
150. *A. permira*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. 19, p. 120 (1898) (Lenkoran).
151. *A. platysoma*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 261 (1891) (Syrie).
152. *A. potamina*, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 23 (1890) (Chine).
153. *A. psittacina*, Heyden, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 31, p. 303 (1887) (Fleuve Amour).
154. *A. purpurascens*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 3, p. 1229 (1888) (Détroit de King).
155. *A. purpurea*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 262 (1891) (Syrie).
156. *A. purpureicollis*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 242 (1872) (Gayndah).
157. *A. quadrifoveolata*, Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 7, p. 359 (1870) (Sibérie).
158. *A. recticollis*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. p. 3, pl. 1, f. 1 (1886) (Malange).
159. *A. reticulata*, Motschulsky, Schrenk Reise, p. 108, pl. 7, f. 14 (1860) (Daourie).
160. *A. rutilipennis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 263 (1891) (Syrie).
161. *A. sarawakensis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 76 (1864) (Bornéo).
162. *A. semilimbata*, Fleischer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 209 (1892) (Loc.?).
163. *A. semiusta*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 117 (1895) (Lenkoran).
164. *A. simiola*, Casey, Contrib. Vol. 2, p. 174 (1884) (Californie).
165. *A. sordidata*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 25, p. 346 (1895) (Cormoso).
166. *A. Starkei*, Ganglbauer, Deutsch. Ent. Zeit. p. 87 (1886) (Shiraz).
167. *A. sternalis*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 118 (1895) (Akbès).
168. *A. subsinuata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 289, pl. 48, f. 283 (Cuba).
169. *A. togata*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 147 (1882) (Syrie).
170. *A. triangularis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 294, pl. 49, f. 188 (1841) (Cap de Bonne-Espérance).
171. *A. Turki*, Ganglbauer, Deutsch. Ent. Zeit. p. 87 (1886) (Autriche).
172. *A. uniformis*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1229 (1888) (Détroit de King).
173. *A. venerabilis*, Marseul, Col. Hefte, Vol. 5 (1889) (Chili).
- verecunda* † Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 256 (1865).
174. *A. violaceiventris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 75 (1864) (Singapore).

18. GENUS AGRILAXIA, NOV. GEN.

Caractères. — Tête large, concave et longitudinalement creusée; épistome étroit et allongé, bilobé avec une échancrure médiane; cavités antennaires terminales, étroites et arrondies. — Antennes courtes, à article 1 allongé, grêle, subcylindrique et légèrement courbe; 2 très court, globulaire; 3 un peu plus long que 2, obconique; les suivants assez épais, courts, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, ovalaires, saillants en dehors, dépassant les bords du pronotum, le plus souvent écartés en arrière sur le vertex et légèrement rapprochés en avant, vers l'épistome. — Pronotum assez grand, convexe sur le disque et déprimé sur les côtés, plus convexe en avant qu'en arrière au milieu, souvent plus large en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian anguleux; les côtés arqués en avant et subsinueux en arrière; la base tronquée. — Ecusson petit, triangulaire. — Elytres étroits, laissant souvent à découvert les côtés de la région supérieure des segments abdominaux; tronqués à la base, arrondis à l'épaule, sinueux et rétrécis ensuite, légèrement élargis au tiers postérieur, ensuite atténués jusqu'au sommet. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large, aplani, trifide, légèrement élargi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales non contiguës, courtes et arquées; suture métasternale droite. — Métasternum tronqué en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures obliques, peu dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la postérieure droite. — Pattes peu robustes; fémurs et

tibias normaux et médiocres; tarses graduellement élargis du 2^e au 4^e article, le premier des postérieurs aussi long que les deux suivants réunis. — Premier segment abdominal prolongé en avant sur les côtés de façon à couvrir les côtés des hanches postérieures et les épipleures du métasternum. — Corps allongé, grêle et linéaire; faciès des *Agrilus*.

Ce genre est très voisin des *Anthaxia* et je ne l'en aurais pas séparé n'était le faciès qui a fait prendre certaines de ses espèces pour des *Agrilus*. Outre ce faciès, il existe d'autres caractères différentiels, tels que la largeur du front, l'allongement et l'étroitesse de l'épistome, la forme des élytres, etc.

Distribution géographique des espèces. — Toutes les espèces de ce genre habitent les régions chaudes de l'Amérique; on en connaît peu de l'Amérique du Nord, mais elles paraissent être très nombreuses dans l'Amérique du Sud et notamment au Brésil, où elles représentent les *Anthaxia* de l'ancien continent. On n'en connaît pas encore du Chili ni du Pérou, ni de tout le versant occidental de la Cordillère et ce n'est que tout récemment que le nombre des espèces s'est considérablement accru.

1. *A. agriliformis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1 a, p. 28 (1879) (Goyaz).
2. **A. brunneipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 299 (1900) (Goyaz).
3. **A. angusta*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 16 (1897) (Goyaz).
4. **A. Gounellei*, nov. sp. (1) (São Paulo).
5. **A. bella*, nov. sp. (2) (Goyaz).
6. **A. suturalis*, nov. sp. (3) (Goyaz).
7. **A. lata*, nov. sp. (4) (Brésil : Goyaz).
8. **A. unicolor*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 334 (1899) (Goyaz).
9. **A. maculicollis*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 6 (1887) (Uruguay, Banda).
10. **A. thoracica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 334 (1899) (Goyaz).
11. **A. meridionalis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 19 (1897) (Pernambuco).
12. **A. alterna*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 300 (1900) (Goyaz).
13. *A. flavimana*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 291, pl. 285 (1841) (Texas).
gracilis, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 148 (1846).
14. **A. rugosa*, nov. sp. (5) (Brésil).
15. **A. occidentalis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 301 (1900) (Goyaz).
16. **A. splendidicollis*, Kerremans, idem, p. 301.
17. **A. clara*, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 333 (1899) (Goyaz).
18. **A. modesta*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 17 (1897) (Goyaz).
19. **A. opima*, Kerremans, idem, p. 17 (Goyaz).

(1) Long. 6; larg. 13 mm. — Oblong, allongé, subplan en dessus, tête et pronotum vert doré, celui-ci avec deux taches allongées et parallèles, d'un noir bleuâtre mat; élytres bien foncé brillant avec la base et la suture étroitement bordées de vert doré. Dessous vert doré, antennes un peu cuivreuses. — Tête réticulée, front avec une impression triangulaire au-dessus de l'épistome, pronotum à peine plus large en avant qu'en arrière et un peu plus large que haut, à fines réticulations semblables à celles de la tête, ses côtés régulièrement arqués; élytres légèrement déprimés le long de la suture leur ponctuation aciculée. Rugosité du dessous semblable à celle des précédents. — Brésil, São Paulo.

(2) Long. 5; larg. 0.9 mm. — Oblong, allongé, aplati; tête et pronotum vert doré, le second avec deux taches allongées et parallèles, violacées; les élytres violacées avec la suture, la base et une ligne prémarginale antérieure sinuée, vert doré. Dessous vert doré. — Voisin des deux précédents. Ressemble beaucoup à l'*angusta*, mais plus petit, la tête plus large et plus convexe; le front à peine sillonné, le pronotum plus court et plus élargi en avant, les élytres avec le calus huméral moins accentué et non prolongé en côte sinuée. — Tête granuleuse et réticulée; pronotum moins grossièrement réticulé que la tête, ses côtés obliquement élargis d'arrière en avant; élytres très finement granuleux, la ponctuation à peine accusée et non aciculée, le sommet séparément arrondi et finement dentelé; dessous un peu moins rugueux que chez les précédents. — Brésil : Goyaz.

(3) Long. 4.5; larg. 0.8 mm. — Oblong, allongé, peu convexe, entièrement vert avec deux taches allongées obscures sur le pronotum; le disque élytral et l'abdomen plus sombres que le restant du corps. — Un peu plus écourté que les précédents; tête convexe, sans sillon médian, finement et régulièrement réticulée; pronotum réticulé, plus large en avant qu'en arrière, ses côtés arqués avant le milieu et sinués en arrière; les élytres très finement granuleux avec des séries longitudinales peu régulières de très fins reliefs aciculés. Dessous entièrement réticulé, les réticulations plus faibles et plus petites sur le sternum que sur le premier segment abdominal. — Brésil : Goyaz.

(4) Long. 5; larg. 1.5 mm. — Plus large, plus convexe et plus trapu que l'*A. suturalis* qui précède, entièrement vert, un peu mat en dessus, doré et brillant en dessous; le pronotum avec deux taches allongées, parallèles et obscures; antennes obscures, les trois premiers articles cuivreux. — Tête réticulée, étroitement sillonnée sur toute sa longueur; pronotum réticulé, à peine plus large en avant qu'en arrière, sa plus grande largeur avant le milieu; élytres finement granuleux, sans traces de stries ni de côtes, la ponctuation subaciculée, les côtés présentant une carène droite longeant le bord, naissant sous le calus huméral et interrompue à hauteur de la suture du premier et du deuxième segment abdominal. — Brésil : Goyaz.

(5) Long. 5, 2; larg. 1 mm. — Oblong, allongé, peu convexe, légèrement élargi en avant et atténué en arrière; front vert clair, vertex noir, pronotum obscur, verdâtre, avec les côtés bordés de vert clair; élytres vert obscur avec une mince ligne suturale verte. Dessous vert, plus clair en avant que sur l'abdomen. — Tête large en arrière, écartée en arrière sur le vertex; pronotum réticulé comme la tête, plus large en avant qu'en arrière, les côtés arqués avant le milieu et sinués en arrière; élytres à peine aciculés, rugueux, très vaguement striés en séries longitudinales, avec une côte médiane peu accusée, le sommet séparément arrondi et assez fortement dentelé. Dessous réticulé en avant avec l'abdomen parsemé de rides simulant des petites écailles. — Brésil (C. Bruch).

20. **A. brasiliensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 300 (1900) (Goyaz).
 21. **A. plagiata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 17 (1897) (Pernambuco, Goyaz).
 * *fasciennsis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 299 (1900).
 22. **A. decipiens*, Burm., Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 385 (1872) (Paraguay).
 23. **A. coriacea*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 6 (1887) (Uruguay).
 24. **A. canaliculata*, Kerremans, ibidem (Banda).
 25. **A. minuta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 303 (1900) (Goyaz).
 26. **A. cyaneoviridis*, Kerremans, ibidem, p. 299 (Goyaz).
 27. **A. subviridis*, Kerremans, ibidem, p. 302 (Goyaz).
 28. **A. decolorata*, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 344 (1899) (Goyaz).
 29. ***A. declivis**, nov. sp. (1) (Goyaz).
 30. **A. plana*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 301 (1900) (Goyaz).
 31. *A. chrysifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 162 (1896) (Goyaz).
 elongata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 333 (1899).
 32. *A. funebris*, Kerremans, ibidem, Vol. 44, p. 303 (1900) (Goyaz).
 33. *A. aeruginosa*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 19 (1897) (2).
 34. *A. agriloides*, Kerremans, ibidem, p. 18 (Rio).
 35. *A. debilipennis*, Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. Vol. 15, p. 563 (Mendoza).
 36. *A. fasciata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Vol. 3. pt. 1, p. 177 (1889) (Mexique).
 37. *A. ocularis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 302 (1900) (Goyaz).
 38. *A. varians*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 216, pl. 35, f. 206 (Brésil).
 39. *A. vitticollis*, Gory, idem, p. 215, pl. 35, f. 205 (Montevideo).

19. GENUS NEOCURIS, FAIRMAIRE

Neocuris, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 19 (1868) (non décrit); Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 334 (1877); Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. p. 249 (1887).

Caractères. — Tête plane ou plus ou moins creusée; épistome étroit, plus ou moins allongé et échancré ou non au milieu; cavités antennaires petites, arrondies, terminales et situées à une certaine distance du bord interne des yeux. — Antennes assez épaisses, peu allongées, à article 1 allongé, en massue; 2 court, obconique; 3 un peu plus long que 2, triangulaire, aplani; 4 à 7 s'élargissant graduellement, 8 à 11 diminuant; à partir du 4^e triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, oblongs, parallèles. — Pronotum plus large que long, convexe, faiblement bisinué en avant, obliquement et faiblement arqué sur les côtés avec une carène marginale entière; la base bisinuée avec un lobe médian subanguleux. — Ecusson petit, triangulaire. — Elytres courts, parallèles sur les côtés, largement arrondis en arrière et laissant le pygidium à découvert. — Marge antérieure du prosternum tronquée et finement rebordée; prosternum large, légèrement convexe, son sommet trifide, l'extrémité anguleuse. — Mésosternum divisé, les branches latérales un peu obliques et subtriangulaires; suture métasternale droite. — Métasternum tronqué en avant et finement sillonné au milieu. — Hanches postérieures peu dilatées au côté interne, leur marge antérieure sinueuse et horizontale, la postérieure droite et un peu oblique. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, creusés le long de leur tranche interne; tibias normaux, grêles; tarses plus courts que les tibias, le premier article des postérieurs un peu plus long que le suivant. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ largement arquée, ♀ subacuminée. — Corps court, épais, oblong, plan en dessus, subquadrangulaire.

(1) Long. 4, 2; larg. 0.8 mm. — *Étroit, allongé, déclive en arrière, noir mal en dessus avec la partie antérieure du front et l'épistome cuivreux pourpre obscur; dessous bronze obscur et brillant.* — Voisin de *A. decolorata*, mais un peu moins allongé et plus arqué en dessus, déclive en arrière; tête réticulée, subconvexe, faiblement sillonnée au milieu; pronotum plus large en avant qu'en arrière, à réticulations semblables à celles de la tête; élytres finement granuleux, les granulations aciculées régulières et disposées en séries longitudinales. — Brésil : Goyaz.

(2) Cette espèce et celles qui suivent (et sans aucun doute plusieurs Buprestides de l'Amérique du Sud, décrits sous le nom d'*Anthaxia* ou d'*Agrilus*), font partie de ce nouveau genre.

Distribution géographique des espèces. — On connaît actuellement une vingtaine d'espèces de ce genre et qui proviennent toutes du continent Australien.

1. *N. Guerinii*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 103 (1845) (Adelaïde).
* *Guerinii*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 338 (1877).
 2. **N. discoflava*, Fairmaire, idem, p. 339 (Australie).
 3. *N. Fortnumi*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 216 (1845) (Australie).
* *Fortnumi*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 338 (1877).
 4. **N. coerulans*, Fairmaire, idem, p. 335 (Australie).
 5. *N. gracilis*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 271 (1872) (Gayndah).
 6. **N. pauperata*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 337 (1877) (Adelaïde).
 7. *N. soror*, Fairmaire, idem, p. 337 (Australie).
 8. *N. eremita*, White, Voy. Bounty, pt. 11, p. 6 (Australie).
 9. *N. viridimicans*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 335 (1877) (Australie).
-
10. *N. anthaxoides*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 336 (1877) (Australie).
 11. *N. asperipennis*, Fairmaire, idem, p. 339 (Australie).
 12. *N. cnprilatera*, Fairmaire, ibidem, p. 336 (Australie).
 13. *N. dichroa*, Fairmaire, ibidem, p. 339 (Australie).
 14. *N. dilaticollis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 42 (1892) (Nouvelles-Galles du Sud).
 15. *N. Fairmairei*, Blackburn, idem, Vol. 10, p. 249 (1887) (Australie).
 16. *N. Mastersi*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 241 (1872) (Gayndah).
 17. *N. monochroma*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 334 (1877) (Australie).
 18. *N. nigricans*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 43 (1892) (Nouvelles-Galles du Sud).
 19. *N. pubescens*, Blackburn, idem, Vol. 10, p. 250 (1887) (Australie).
 20. *N. thoracica*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 340 (1877) (Australie).
 21. *N. viridiaenea*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1229 (1888) (Détroit de King).

20. GENUS CURIS, CASTELNAU & GORY

Curis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 47 (1838); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 51 (1857).

Cylindrophora. Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 502 (1851).

Caractères. — Tête étroite, longitudinalement excavée; épistome assez allongé et échancré; cavités antennaires terminales et très petites. — Antennes assez longues; article 1 allongé, en massue; 2 très court, obconique; 3 égal à 2 ou plus long, obconique; les suivants triangulaires, obtusément dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, allongés, ovalaires, obliques et rapprochés sur le vertex. — Pronotum grand, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, les côtés arqués, la marge antérieure à peine sinueuse, la base bisinuée avec un lobe médian subanguleux. — Ecusson petit, subcordiforme. — Elytres larges, peu allongés, aplanis, plus ou moins atténués en arrière et séparément arrondis au sommet. — Marge antérieure du prosternum droite et très finement rebordée; prosternum large, trifide au sommet, l'extrémité aiguë. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes, étroites et arqués, la suture métasternale subsinueuse. — Métasternum échancré au milieu du sommet et sillonné dans sa longueur. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse et horizontale, la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes; tibias grêles, allongés et subcylindriques; tarses allongés, les postérieurs presque aussi longs que les tibias, leur premier article aussi long que les trois suivants réunis, le 2^e triangulaire, allongé; le 3^e trigone, élargi; le 4^e bilobé et le 5^e, allongé; crochets obtusément lobés à la base. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ largement et peu profondément échancré entre deux dents aiguës, ♀ prolongée suivant un lobe arrondi, inerme, dentelé ou bidenté. — Corps large, trapu, oblong et peu convexe.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend seize espèces connues parmi lesquelles douze habitent l'Australie et les autres l'Amérique du Sud et plus spécialement le Chili.

1. *C. splendens*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 244 (1872) (Australie).
brachelytra, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 333 (1877).
 2. *C. aurifera*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 49, pl. 11, f. 59 (1838) (Australie).
* *aurifera*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 329 (1877).
 3. *C. formosa*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, 431 (1877) (Australie).
 4. *C. aurovittata*, Boheman, Eug. Res. Ins. p. 60 (1858) (Australie).
 5. *C. caloptera*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. p. 93 (1832) (Australie).
dives, Hope, Bupr. p. 9 (1846).
* *caloptera*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 330 (1877).
 6. *C. bella*, Guérin, Voy. Duperr. Ent. Vol. 2, p. 66, pl. 2, f. 11 (1830) (Chili).
 7. *C. chloris*, Germain, An. Univ. Chile, p. 391 (1855) (Chili).
* *chloris*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 719 (1858).
 8. *C. viridicyanea*, Fairmaire, idem, p. 332 (1877) (Australie).
 9. *C. Spencei*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 68 (1837) (Australie méridionale).
chloriantha, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 330 (1877).
-
10. *C. aurora*, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 246 (1860) (Chili).
 11. *C. bimaculata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 298, pl. 50, f. 293 (1841) (Mendoza).
debilipennis, Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. Vol. 15, p. 563 (1872).
hemiptera, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 374 (1872).
 12. *C. corrusca*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 51 (1882) (Australie).
 13. *C. despecta*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 328 (1877) (Australie).
 14. *C. discoidalis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. Austral. p. 214 (1892) (Australie).
 15. *C. intercribrata*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 328 (1877) (Australie).
 16. *C. Perroni*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 48, pl. 11, f. 56 (1838) (Iles des Kangur.).

TRIBU 9. CHRYSOBOTHRINI, CASTELNAU & GORY

Chrysobothrites. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2 (1838).

Chrysobothrides. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 70 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 402 (1883).

Chrysobothres. Le Conte & Horn. Smits. Instit. (1883).

Chrysobothrini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 18 (1893).

Caractères. — Front rétréci à l'insertion des antennes; antennes coudées, leur troisième article très allongé; fossettes porifères variables; yeux obliques et très rapprochés sur le vertex; cavité sternale formée dans son fond par le métasternum et latéralement par le mésosternum, exceptionnellement par le métasternum seul; épimères métathoraciques recouvertes en partie par le prolongement latéral de l'abdomen.

Troisième article des tarses inerme, ses côtés ne dépassant pas le quatrième 1. CHRYSOBOTHRITES.

— — — profondément échancré et terminé par deux longues épines 2. ACTENODITES.

GROUPE I. CHRYSOBOTHRITES, KERREMANS

Chrysobothrites. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 111 (1893).

Caractères. — Troisième article des tarses inerme, des côtés ne dépassant pas le quatrième; trois ou quatre lamelles distinctes aux tarses antérieurs, trois aux postérieurs.

1. — *Fémurs antérieurs inermes* 1. COLOBOGASTER.

2. — — — *dentés sur leur tranche interne* 2. CHRYSOBOTHRIS.

I. GENUS COLOBOGASTER, SOLIER

Colobogaster. Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 308 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1838); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 73 (1857); Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 135 (1890).

Caractères. — Tête large en avant et très étroite en arrière sur le vertex; front inégal, plus ou moins bossué ou déprimé; épistome large et plus ou moins sinueux, relevé le long du bord, rétréci en arrière par les cavités antennaires; celles-ci grandes, arrondies et situées plus près du bord antérieur de l'épistome que de celui des yeux. — Antennes médiocres, coudées à partir du 4^e article; 1 allongé, en massue et légèrement arqué; 2 très court, globulaire ou obconique; 3 allongé, obconique, les trois premiers aussi longs que les sept suivants réunis; ceux-ci munis d'une fossette porifère située sur la tranche interne. — Yeux très grands, ovalaires, allongés, très obliques, écartés en avant et rapprochés sur le vertex. — Pronotum large, trilobé à la base, les lobes latéraux formés par les angles postérieurs, très aigus et abaissés sur les élytres, le médian avancé et tronqué. — Ecusson très petit, acuminé en arrière. — Elytres fortement lobés à la base, dentelés ou non sur les côtés postérieurs, leur sommet largement arrondi et plus ou moins sinueux. — Marge antérieure du prosternum subsinueuse et rebordée; prosternum large, renflé, trifide au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales lobées en avant et tronquées en arrière, les sutures horizontales. — Métasternum tronqué en avant avec une étroite échancrure médiane. — Hanches postérieures subcontiguës, dilatées au côté interne; leur marge antérieure subsinueuse, la postérieure oblique. — Eplépleures métasternales recouvertes en partie par un prolongement latéral de l'abdomen. — Pattes assez robustes; fémurs épais, fusiformes, les antérieurs inermes; tibias antérieurs et médians plus arqués que les postérieurs; tarses comprimés, le premier article des postérieurs allongé, les deux suivants plus courts, subégaux entre eux, le quatrième court, le cinquième allongé, plus grêle. — Les côtés des segments abdominaux abaissés, anguleux et aigus; l'extrémité du dernier segment très variable suivant l'espèce et le sexe. — Corps robuste, oblong élargi; taille grande, rarement moyenne.

Distribution géographique des espèces. — Si l'on en excepte une seule espèce propre au continent africain, ce genre est essentiellement américain; ses espèces s'étendent depuis le sud des Etats-Unis jusqu'au sud du Brésil. On en connaît actuellement vingt-sept, mais ce nombre est destiné à s'accroître lorsque le centre du Brésil et les pays circonvoisins seront mieux connus.

1. *C. splendida*, Lucas, Voy. Castelnau, p. 65, pl. 4, f. 6 (1858) (Brésil).
2. *C. cayennensis*, Herbst, Col. Vol. 9, p. 56, pl. 153, f. 3 (1801) (Amazones).
viridicollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pl. 1, f. 1 (1838).
3. *C. quadridentata*, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 186 (1794) (Brésil).
Boulardi, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 143, pl. 24, f. 140 (1841).
4. *C. quadriimpressa*, Thomson, Typ. Bupr. p. 74 (1878) (Amazones).
5. **C. semisuturalis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 334 (1899) (Amazones).
6. *C. Jacquieri*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 144, pl. 25, f. 141 (1841) (Amazones).
7. **C. cupricollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 22 (1897) p. 22 (Chiriqui).
8. *C. cyanitarsis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 6, pl. 1, f. 4 (1838) (Rio-Grande-do-Sul).
9. *C. singularis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 145, pl. 25, f. 142 (1841) (Brésil).
10. **C. biguttata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 23 (1897) (Goyaz).
11. *C. chlorosticta*, Klug, Ent. Bras. Vol. 2, p. 421 (1827) (Brésil).
Hopei, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pl. 1, f. 5 (1838).
12. *C. nigrita*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 40, pl. 9, f. 96 (1790).
senegalensis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 13, pl. 3, f. 12 (1838).
carenifrons, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 155, pl. 26, f. 151 (1841).
13. *C. Acostae*, Rojas, Rev. Mag. Zool. Vol. 8, p. 565 (1856) (Vénézuéla).

14. *C. Annei*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 147, pl. 25, f. 144 (1841) (Cayenne).
15. *C. bella*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 348 (1873) (Pérou).
16. *C. celsa*, Erichson, Schomb. Guy. Vol. 3, p. 557 (1848) (Guyane).
17. *C. decorata*, Thomson, Typ. Bupr. p. 75 (1878) (Cayenne).
18. *C. Desmaresti*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 538, pl. 11, f. 5 (1862) (Cayenne).
19. *C. diversicolor*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 39 (1879) (Cayenne).
20. *C. diviana*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 150, pl. 25, f. 146 (1841) (Para).
21. *C. empyrea*, Gory, Mag. Zool. pl. 19 (1832) (Cayenne).
22. *C. eximia*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 151, pl. 26, f. 147 (1841) (Cayenne).
23. *C. infraviridis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 39 (1879) (Mexique).
24. *C. janthina*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 146, pl. 25, f. 143 (1841) (Brésil).
25. *C. puncticollis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, pl. 33, pl. 3, f. 12 (1882) (Mexique).
26. *C. resplendens*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 148, pl. 25, f. 145 (1841) (Bolivie).
27. *C. triloba*, Olivier. Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 37, pl. 1, f. 5 et 7 (1790) (Cayenne).

2. GENUS CHRYSOBOTHRIS, ESCHSCHOLTZ

Chrysobothris. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 9 (1829); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 310, pl. 12, f. 129 (1832); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, pl. 1, f. 1 (1838); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 75 (1857); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 65 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 402 (1865); Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 13 (1886); Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 135 (1890).

Odontomus. Kirby, Fauna Bor. Amer. p. 156 (1837).

Caractères. — Tête élargie en avant et très étroite en arrière, sur le vertex; front inégal, souvent séparé du vertex par une carène tranchante; épistome large, plus ou moins sinueux et plus ou moins relevé le long du bord, rétréci en arrière par les cavités antennaires; celles-ci petites, arrondies, subtransversales et fermées en arrière. — Antennes médiocres, coudées à partir du 4^e article; 1 allongé, en massue légèrement arquée; 2 très court, globulaire ou obconique; 3 allongé, obconique; ces trois premiers aussi longs ensemble que les suivants réunis; ceux-ci triangulaires, transversaux et munis d'une fossette porifère située sur la tranche interne. — Yeux très grands, allongés, ovalaires et très obliques, écartés en avant et très rapprochés en arrière sur le vertex. — Pronotum transversal, variable, fortement bisinué à la base, souvent lobé au milieu de celle-ci, le lobe parfois avancé et tronqué. — Ecusson très petit et triangulaire. — Elytres lobés à la base, obliquement atténués à partir du sommet jusqu'au milieu, le plus souvent dentelés sur les bords postérieurs. — Prosternum large, plan ou convexe, élargi et trilobé en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales formant un angle droit; la suture métasternale horizontale. — Métasternum tronqué en avant avec une très étroite échancrure médiane. — Hanches postérieures subcontiguës, dilatées au côté interne, leur marge antérieure subsinueuse, la postérieure oblique. — Epipleures métasternales recouvertes en partie par un prolongement latéral de l'abdomen. — Pattes assez robustes; fémurs épais et fusiformes, les antérieurs robustes, tranchants sur le bord interne, celui-ci muni d'au moins une forte dent obtuse; tibias antérieurs et médians plus ou moins arqués; tarses comprimés, le premier article des postérieurs long, le troisième faiblement échancré, le quatrième très court. — Abdomen souvent sillonné au milieu du premier segment, ce sillon parfois prolongé sur les autres, les côtés du dernier segment dentelés ou lisses, ce segment variable suivant l'espèce et le sexe. — Corps oblong ou subheptagonal, large et écourté, rarement allongé.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, très nombreux en espèces, est répandu par tout le globe, mais très inégalement. L'Europe n'en compte que trois; l'Amérique du Nord, mieux partagée, en compte une cinquantaine; les espèces de l'Amérique du Sud sont très nombreuses, sauf sur

le versant occidental. On en connaît une trentaine d'espèces de l'Afrique et de Madagascar, trois ou quatre de l'Australie et une trentaine de la région Indo-Malaise (1).

1. **C. ovalis**, nov. sp. (2) (Brésil : São Paolo).
2. *C. sexpunctata*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 206 (1801) (Guyanes, Brésil).
impressa || Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 44, pl. 5, f. 42 (1790).
splendens, Voet, Cat. Col. Vol. 1, p. 96, pl. 51, f. 20 (1801).
3. *C. consanguinea*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Colobogaster*, p. 10, pl. 2, f. 8 (1838) (Goyaz).
4. *C. cupriventris*, Thomson, Typ. Bupr. p. 75 (1878) (Brésil).
5. **C. dilaticollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 26 (1897) (Goyaz).
6. *C. decolorata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Colobogaster*, p. 15, pl. 3, f. 22 (1838) (Guyan., Goyaz).
7. *C. anoguttata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 154, pl. 26, f. 150 (1840) (Cayenne).
8. **C. maculiventris*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 73 (1839) (São Paolo).
9. *C. amabilis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Colobogaster*, p. 16, pl. 3, f. 16 (1838) (Guyanes, Brésil).
* *biimpressa*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 74 (1839).
10. *C. Orbigny*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 153, pl. 26, f. 149 (1840) (Cayenne, Goyaz).
11. *C. viridifasciata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Colobogaster*, p. 13, pl. 3, f. 13 (1838) (Guyanes).
frontalis || Fabricius, Ent. Syst. Vol. 2, p. 200 (1794).
12. *C. ichthyomorpha*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 42 (1879) (Mexique, Chiriqui).
13. **C. regina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 133 (1898) (Queensland).
14. *C. borneensis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 304 (1900) (Bornéo).
* *delectabilis* || Kerremans, idem, p. 15.
15. *C. Thomsoni*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 35 (1887) (Ile de la Trinité).
collaris || Thomson, Typ. Bupr. p. 76 (1878).
16. **C. rutilans*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 24 (1897) (Goyaz).
17. **C. lobata*, Kerremans, idem, p. 29 (Brésil).
18. *C. frontalis*, Olivier, Entom. Vol. 2, Gen. 32, p. 45, pl. 5, f. 44 (1790) (Goyaz, São Paolo).
* *porracea*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 27 (1897).
19. **C. carminea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 305 (1900) (Goyaz).
20. ***C. pardensis**, nov. sp. (3) (Brésil).
21. **C. boliviana*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 29, (1897) (Bolivie).
22. ***C. cornuta**, nov. sp. (4) (Brésil).
23. *C. capitata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 4 f. 28 (1838) (Mexique).
designata, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 43 (1879).

(1) Pour l'étude détaillée des espèces de l'Amérique du Nord, voyez HORN, *Trans. Amer. Ent. Soc.*, 1886, pp. 65-124; pour celles de la Malaisie, H. DEVROLLE, *Ann. Soc. Ent. Belg.* Vol. 8, pp. 87-113 (1864) et pour celles d'Afrique et de Madagascar, KERREMANS, *Ann. Soc. Ent. Belg.* Vol. 37, pp. 232-260 (1893).

(2) Long. 22; larg. 8 mm. — Oblong ovale, assez large, aplani, atténué en avant et en arrière, tête, pronotum et dessous vert brillant et clair; élytres violacés avec trois petites taches et une étroite ligne suturale antérieure, vertes. — Ressemble au *Colobogaster chlorosticta*, Klug, dont il a la coloration, mais un peu plus trapu et moins convexe, avec les fémurs antérieurs dentés. — Tête inégale; épistome séparé du front par une étroite carène linéaire et sinueuse contournant la moitié supérieure des cavités antennaires; carène frontale bilobée avec une étroite échancrure médiane. Pronotum finement ponctué, les côtés obliquement tronqués au tiers antérieur, sinueux après le milieu avec les angles postérieurs très aigus et abaissés sur l'épaule; deux très vagues dépressions latérales. Elytres à ponctuation excessivement fine et très dense, vaguement plissés en long, les plis un peu sinueux et obliques, avec une très fine carène présuturale et une autre prémarginale, les côtés inermes; le sommet obliquement tronqué de part et d'autre avec une dent médiane plus accentuée que la subsuturale, les taches vertes des élytres situées dans des fossettes dont l'antérieure seule est profonde, bien accusée et située contre le bord, au milieu du lobe antérieur, la seconde au tiers antérieur, un peu plus près de la suture que du bord extérieur, la troisième au tiers postérieur, un peu plus près du bord externe que de la suture. Dessous finement ponctué; segments abdominaux bordés de bleu d'acier. ♂ Tibias antérieurs arqués, dernier segment abdominal caréné au milieu, son sommet échancré entre deux dents aiguës. — Brésil : São Paolo.

(3) Long. 11, 5; larg. 4, 2 mm. — Subheptagonal, atténué en arrière, tête et pronotum vert foncé brillant; élytres noirs à dessin vert clair; dessous vert foncé brillant avec les dépressions latérales pulvérolentes de blanc jaunâtre. — Très voisin du *C. frontalis*, Olivier, mais un peu plus trapu, la coloration générale plus obscure, les côtés du pronotum plus sinueux avec l'angle de la troncature plus saillant et plus accentué, les rides du pronotum plus nettes, surtout sur le disque. le dessin élytral semblable, mais la ligne longitudinale postérieure externe absente, les dents marginales plus petites, plus nombreuses et moins espacées. — Front à rides circulaires et concentriques; carène frontale ♀ tronquée; côtés du pronotum tronqués en avant et sinueux ensuite, anguleusement dilatés en avant; pronotum ridé transversalement; fossettes élytrales nettes, leur nuance verte prolongée en bandes sinueuses, le calus huméral saillant; extrémité du dernier segment abdominal ♀ étroitement échancrée, ce segment caréné longitudinalement au milieu. — Brésil : Vallée du Rio Pardo.

(4) Long. 8; larg. 3 mm. — Peu robuste; tête et pronotum verts, la première profondément excavée et couverte de rides circulaires et concentriques, la carène frontale divisée et prolongée suivant deux appendices en forme de cornes; le second étroit, bisinué sur les côtés et atténué en arrière, la base peu avancée sur l'écusson et non lobée ni tronquée, mais largement arrondie; élytres noir verdâtre et à dessin vert clair, large; le sommet vert doré, les côtes absentes, sauf la présuturale, celle-ci très vague. Dessous vert obscur; extrémité du dernier segment abdominal ♂ échancrée. — Très différent du *C. frontalis*, Olivier, avec lequel il n'a de commun que l'allure de la carène frontale ♂, divisée de façon à former deux petites cornes. Celles-ci plus développées; le pronotum relativement plus étroit et surtout plus atténué en arrière, le lobe médian de la base largement arrondi; les élytres sans côtes, leurs taches vertes de même allure, mais plus larges et non sinueuses; les fémurs postérieurs lobés entre la dent et le genou, la dent moins avancée et moins aiguë. — Brésil : Vallée du Rio Pardo.

24. **C. placida*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 32 (1897) (♂) (São Paulo).
 * *solitarius*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 305 (1900) (♀).
25. **C. puncticollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 35 (1897) (Vénézuéla).
26. *C. nobilis*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 180 (1787) (Guyanes, Brésil).
cayennensis Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, p. 1931 (1788).
maculipennis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 22, pl. 5, f. 33 (1838).
viridimaculata, Sturm, Cat. p. 106 (1826).
27. *C. Maillei*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 23, pl. 5, f. 34 (1838) (Vénézuéla, Brésil).
28. *C. Sallei*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 37, pl. 3, f. 6 (1887) (Mexique).
29. **C. angulipicta*, nov. sp. (1) (Amazones).
30. **C. amazonica*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 26 (1897) (Amazones).
31. **C. Staudingeri*, Kerremans, idem, p. 34 (Amazones).
32. **C. minuta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 147 (1896) (Brésil).
33. **C. gentilis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 33 (1897) (Amazones).
34. **C. aterrima*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 335 (1899) (Espirito Santo).
35. **C. tenebricosa*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg., p. 35 (1897) (Amazones).
36. **C. polita*, Kerremans, idem, p. 36 (Amazones).
37. *C. cordicollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 24, pl. 4, f. 35 (1838) (Brésil).
38. *C. seximpressa*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc., p. 76 (1837) (Cayenne).
subobscura, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 24, pl. 5, f. 36 (1838) (Mexique).
39. *C. delectabilis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 183, pl. 9, f. 13 (1889) (Chiriqui).
40. **C. melazona*, Chevrolat, Col. Mex. n° 104 (1835) (Mexique).
nigrofasciata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 21, pl. 3, f. 32 (1838).
41. *C. viridiimpressa*, Castelnau & Gory, idem, p. 25, pl. 5, f. 39 (Colombie).
42. **C. bogotensis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 31 (1897) (Bogota).
43. **C. auropicta*, Kerremans, idem, p. 30 (Goyaz).
44. *C. chrysoela*, Illiger, Wiedem. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 122 (1800) (Etats-Unis d'Amérique).
hybernata, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 209 (1801).
viridipunctata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 21, pl. 4, f. 31 (1838).
45. *C. lepida*, Castelnau & Gory, idem, p. 16, pl. 3, f. 23 (Cuba).
46. **C. thomae*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 337 (1899) (Antilles).
47. *C. sexsignata*, Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. 158 (1836) (Etats-Unis d'Amérique).
sexguttata || Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 161 (1823).
Germari, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 50, pl. 9, f. 67 (1838).
ignifex, Castelnau & Gory, idem., p. 50, pl. 9, f. 68.
48. **C. Dugesii*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 37 (1897) (Mexique).
49. *C. scitula*, Gory, Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 160, pl. 27, f. 155 (1841) (Etats-Unis d'Amérique).
ultramarina †, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 13, pl. 3, f. 19 (1838).
azurea, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., p. 8 (1857).
concinna, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 238 (1860).
**scitula*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 112, pl. 7, f. 217-221 (1886).
50. *C. pulchella*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 40, pl. 8, f. 56 (1838) (Brésil).
51. **C. punctiventris*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 35 (1897) (Goyaz).
52. **C. apicalis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 306 (1900) (Mexique).
53. *C. elevata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 41, pl. 8, f. 57 (1838) (Brésil).
54. **C. lateralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 47 et 185, pl. 3, f. 20 (1887) (Texas, Mex.).
55. **C. nodipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 337 (1899) (Brésil).
56. **C. taciturna*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg., p. 36 (1897) (Buenos-Ayres).
57. *C. costifrons*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 45, pl. 3, f. 19 (1887) (Mexique).
aerea || Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 104, pl. 6, f. 173-177 (1886).

(1) Long. 9; larg. 3,3 mm. — Oblong, élargi au tiers postérieur, atténué en arrière; noir en dessus avec la fossette basilaire de l'élytre surmontée d'une tache pourprée, la fossette médiane verte et prolongée suivant une ligne brisée de même nuance et remontant anguleusement sur le bord vers le calus huméral, la tache prémarginale postérieure verte et allongée. Dessous noir sur les bords et vert au milieu, fémurs antérieurs et médians verts. — Faciès du *C. Sallei* Waterhouse, différent par le dessin élytral. — Front rugueux, à rides sinueuses irrégulières, carène frontale lisse et un peu cintrée en arrière, pronotum transversalement ridé, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, l'angle antérieur peu nettement tronqué, les côtés subsinués et le lobe médian de la base subanguleux, côtes élytrales nulles en avant et nettes en arrière, surtout la présuturale, dentelure de la marge postérieure des élytres peu accusée et largement espacée. — Paraguay.

58. **C. simplex*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 2, pt. 1, p. 44, pl. 3, f. 17 (1887) (Mexique).
59. **C. acutipennis*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, n° 190 (1835) (Panama, Nicaragua).
cupreoaenea, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 39, pl. 8, f. 35 (1838).
acuminata, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 237 (1860).
cupreosignata, Thomson, Typ. Bupr. p. 80 (1878).
60. **C. antiqua*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 71 (1839) (Espirito Santo).
61. **C. platensis*, Kerremans, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Vol. 19, p. 60 (1902) (Tucuman).
62. *C. impressa*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 182 (1787) (Antilles).
tranquebarica, Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, p. 1932 (1788).
excavata, Olivier, Enc. Method. Vol. 2, p. 232 (1790).
rugosa, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 74, (1837).
denticulata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 46, pl. 8, f. 62 (1838).
denticollis, Gory, Mon. Bupr. Vol. 4, p. 178, pl. 30, f. 173 (1841).
63. *C. chactas*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 47, pl. 8, f. 63 (1838) (Mexique).
inea, Thomson, Typ. Bupr. p. 80 (1878).
inca, Thomson, Typ. Bupr. App. 12, p. 48 (1879).
64. **C. sexangula*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 37 (1897) (Cayenne).
65. **C. subrugosa*, nov. sp. (1) (Cayenne).
66. **C. rudipennis*, nov. sp. (2) (Paraguay).
67. *C. rugosa*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 54, pl. 10, f. 74 (1838) (Déroit de Magellan).
magellanica, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 183, pl. 31, f. 179 (1841).
68. **C. bothrideres*, Fairmaire, Rev. Zool. p. 285 (1864) (Chili).
69. *C. multistigmata*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 82 (1837) (Mexique, Texas, etc.).
atabalipa, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 43, pl. 8, f. 60 (1838).
basalis, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 68 (1858).
70. *C. distincta*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 176, pl. 30, f. 171 (1841) (Mexique).
71. *C. octocola*, Le Conte, Proc. Amer. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 67 (1858) (Texas).
72. *C. texana*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 234 (1860) (Nouveau Mexique).
73. **C. ignicollis*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 12, p. 145 (1885) (Colorado).
74. *C. cuprascens*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 234 (1860) (Colorado).
* *cuprascens*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 81, pl. 2, f. 40-44 (1886).
75. *C. californica*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 255 (1860) (Californie).
vulcanica, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 346 (1861).
76. *C. exesa*, Le Conte, idem, p. 68 (1858) (Texas).
* *exesa*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 95, pl. 4, f. 125-129 (1886).
77. *C. mali*, Horn, idem, p. 97, pl. 5, f. 135-139.
78. *C. carinipennis*, Le Conte, Bull. V. S. Geol. Surv. p. 459 (1878) (Colorado).
79. *C. pusilla*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 53, pl. 10, f. 12 (1838) (Etats-Unis d'Amérique).
biguttata, Castelnau & Gory, idem, pl. 10, f. 12.
strangulata, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 147 (1846).
80. **C. Horni*, nov. sp. (3) (Etats-Unis d'Amérique).

(1) Long. 11; larg. 4,5 mm. — Oblong ovale, peu convexe, très rugueux en dessus; tête et pronotum bronzé, obscur à reflets irisés; élytres bronzés à reliefs noirs et brillants. Dessous vert en avant et bleu d'acier en arrière. — Intermédiaire entre la *C. sexangula*, Kerremans, et le *rugosa*, Castelnau et Gory, moins rugueux que le premier, mais sensiblement plus rugueux que le second, différent par les détails. — Tête plane, mais inégale, grossièrement ponctuée, avec trois carènes transversales irrégulières et peu nettes; pronotum très rugueux, plus étroit que la base des élytres, couvert de rides épaisses, transversales et inégales, le disque et les côtés impressionnés, ceux-ci obliquement tronqués en avant, subsinueux au milieu et légèrement atténués en arrière; reliefs élytraux allongés, noirs, subcostiformes sauf le présutural qui est formé par une côte longitudinale bien marquée, les intervalles entre les reliefs finement pointillés. Dessous finement ponctué; segments abdominaux largement sillonnés dans toute leur longueur; extrémité du dernier segment abdominal ♀ trifide, la dent médiane plus courte que les latérales, celles-ci formant le prolongement de deux carènes subparallèles. — Cayenne.

(2) Long. 11; larg. 4,5 mm. — Oblong ovale, peu convexe, très rugueux; noir brillant avec le fond des rugosités très légèrement verdâtre ou cuivreux pourpre sombre, antennes et tarses bleu d'acier. — Voisin du *subrugosa*, Kerremans, qui précède, mais les dépressions du pronotum plus profondes, les reliefs élytraux plus épais et moins costiformes, sauf la côte présuturale. — Tête inégale; front rugueux; carène frontale peu nette; pronotum un peu plus large en avant qu'en arrière, déprimé au milieu et sur les côtés, ceux-ci très rugueux; élytres à reliefs longitudinaux épais alternant avec des dépressions granuleuses. — Paraguay.

(3) Long. 9; larg. 3,6 mm. — ♀ Subovale, plan en dessus, légèrement élargi au tiers supérieur, noir terne, un peu verdâtre, granuleux. Dessous bronzé brillant légèrement pourpre cuivreux et grossièrement ponctué. — Tête convexe, couverte d'une villosité argentée; front rugueux et ponctué avec deux reliefs lisses irréguliers; épistome anguleusement échancré entre deux lobes arrondis; vertex finement caréné, la carène vaguement bifurquée en avant. Pronotum rugueux, subquadrangulaire, le disque vaguement sillonné. Elytres plans, inégalement chagrinés, sans dépressions ni fossettes irrégulières, mais avec des vagues replis et des impressions peu nettes; les côtés dentelés à partir des hanches postérieurs jusqu'au sommet. Dessous à ponctuation assez forte et inégale; tibias antérieurs simples, à peine arqués à la base, dernier segment abdominal dentelé sur ses bords, vaguement caréné au milieu contre la base et déprimé près du sommet, celui-ci à peine bisinué avec un petit vide anguleux. — Etats-Unis d'Amérique.

81. *C. purpurifrons*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 183 (1859) (Etats-Unis d'Amérique).
semisculpta, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 12, p. 254 (1860).
contigua, Le Conte, idem, p. 255 (1860).
82. *C. trinervia*, Kirby, Fanna Bor. Amer. Ins. p. 157, pl. 2, f. 9 (Orégon, Californie).
cicatricosa, Motschulsky, Etud. Ent. p. 77 (1852).
83. *C. dentipes*, Germar, Ins. nov. p. 38 (1824) (Etats-Unis d'Amérique).
characteristica, Harris, New Engl. Farm. p. 2 (1829).
posticalis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 56, pl. 10, f. 76 (1838).
planata, Castelnau & Gory, idem, f. 77.
ruficornis, Sturm, Cat. p. 61 (1843).
84. **C. lata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 336 (1899) (Floride).
85. *C. floricola*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 179, pl. 30, f. 175 (1841) (Californie).
femorata || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 48, pl. 9, f. 65 (1838).
**floricola*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 81, pl. 2, f. 45-50 (1886).
86. *C. femorata*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 47, pl. 11, f. 121 (1790) (Canada, Etats-Unis).
insculpta, Herbst, Col. Vol. 9, p. 145, pl. 146, f. 10 (1801).
cribaria, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 77 (1837).
quadriimpressa, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 48, pl. 9, f. 64 (1838).
Lesuevi, Castelnau & Gory, idem, p. 49, pl. 9, f. 66.
dentipes, Castelnau & Gory, ibidem, p. 52, pl. 9, f. 70.
nigritula, Castelnau & Gory, ibidem p. 54, pl. 10, f. 73.
dissimilis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 181, pl. 31, f. 177 (1841).
alabamæ, Gory, idem, p. 185, pl. 32, f. 183.
viridiceps, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 147 (1846).
rugosiceps, Melsheimer, idem, p. 147 (1846).
soror, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 232 (1860).
obscura, Le Conte, idem, p. 232.
misella, Le Conte, ibidem, p. 233.
adelpa, Harold, Col. Heft. Vol. 5 (1869).
87. *C. scabripennis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 53, pl. 9, f. 71 (1838) (Canada, Etats-Unis).
proxima, Kirby, Fauna Bor. Amer. Vol. 4, p. 157 (1837).
scabra, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 182, pl. 31, f. 178 (1841).
88. *C. debilis*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 236 (1860) (Texas, Mexique).
disjuncta, Le Conte, idem, p. 236.
**debilis*, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 47 (1887).
89. **C. lixa*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 108, pl. 6, f. 193-197 (1886) (Arizona).
90. *C. purpureovittata*, Horn, idem, p. 76, pl. 2, f. 25-29 (Etats-Unis d'Amérique).
91. *C. cyanella*, Horn, ibidem, p. 102, pl. 5, f. 164-168 (Etats-Unis d'Amérique).
92. *C. Harrisii*, Hentz, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 5, p. 373, pl. 13, f. 1 (1827) (Etats-Unis).
chlorocephala, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 161, pl. 27, f. 156 (1841).
**Harrisii*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 86, pl. 3, f. 66-70 (1886).
93. *C. chrysostigma*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 1, p. 409 (1758) (Europe centr. et mér. Sibérie).
**chrysostigma*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 405 (1865).
94. *C. affinis*, Fabricius, Syst. Ent. Vol. 4, App. p. 450 (1794) (Europe centrale, Algérie, Egypte).
chrysostigma || Herbst, Füssl. Arch. Vol. 5, p. 117, pl. 28, f. 6B (1784).
congener, Paykhull, Faun. Suec. Vol. 2, p. 222 (1789).
assimulans, Sturm, Cat. 1843, p. 61.
**affinis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 406 (1865).
95. *C. Solieri*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 10, pl. 2, f. 14 (1838) (Europe mér. Algérie).
pini, Klingenh, Stett. Ent. Zeit. 1845, p. 347.
**Solieri*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 407 (1865).
96. **C. violacea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 199 (1892) (Haute Birmanie).
97. *C. succedanea*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 512 (1873) (Japon).
98. **C. infima*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 250 (1893) (Delagoa-Bay).
99. *C. australasiae*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 216 (1846) (Australie).
100. ***C. Frenchi**, nov. sp. (1) (Australie).

(1) Long. 12; larg. 4 mm. — Front cuivré obscur à villosité blanche et floconneuse; pronotum noir verdâtre; élytres noirs avec trois fossettes dorées. Dessous vert clair au milieu, bronzé rosé sur les côtés, les bords des segments abdominaux et le dernier de ceux-ci bleus; une fossette externe villose et blanche sur les côtés de chacun des segments abdominaux et une seconde fossette interne de même. — Vertex plus étroit que celui de l'*australasiae* Hope, sans sillon médian, pronotum plus court, plus atténué en avant, non marqué sur les côtés et avec deux fossettes discales bien

101. **C. simplicifrons*, nov. sp. (1) (Nouvelles Galles du Sud).
 102. **C. costata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 213 (1895) (Iles Mariannes).
 103. *C. auricornis*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 112 (1864) (Iles Arou).
 104. **C. ignipicta*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 73 (1900) (Ile Kei-Tooal).
 105. *C. chrysonota*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 110 (1864) (Nouvelle-Guinée).
 106. *C. philippinensis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 317 (1874), (Philippines).
 107. *C. delenifica*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 109 (1864) (Malacca).
 108. *C. indica*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 12, pl. 3, f. 17 (1838) (Iles Andaman).
 109. *C. aruensis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 111 (1864) (Iles Arou).
 110. *C. tristis*, H. Deyrolle, idem, p. 108 (Java).
 111. **C. vicina*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 74 (1900) (Woodlark).
 112. **C. talautana*, Kerremans, idem, p. 72 (Ile Talaut).
 113. *C. auro-punctata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 110 (1864) (Nouv. Guinée, Australie).
 114. **C. purpureicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 74 (1900) (Woodlark).
 115. **C. deliana*, Kerremans, idem, p. 72 (Sumatra : Deli).
 116. *C. nigripennis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 107 (1864) (Sumatra).
 117. *C. sexnotata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl., Vol. 4, p. 159, pl. 27, f. 154 (1841) (Java).
 118. *C. gratioiosa*, Gory, idem, p. 165, pl. 28, f. 160 (Java, Sumatra).
 119. *C. cupriceps*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 100 (1864) (Ile Kina Balu).
 120. *C. superba*, H. Deyrolle, idem, p. 91 (Sumatra).
 121. **C. andamana*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 162 (1891) (Iles Andaman).
 122. **C. umbrosa*, nov. sp. (2) (Halmaheira).
 123. *C. cavifrons*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 92 (1864) (Waigiou).
 124. *C. militaris*, H. Deyrolle, idem, p. 93 (Malacca, Sumatra, Bornéo).
 125. *C. confusa*, H. Deyrolle, ibidem, p. 105 (Bornéo).
 126. *C. nigroviolacea*, H. Deyrolle, ibidem, p. 106 (Pérak).
 127. *C. cupricollis*, H. Deyrolle, ibidem, p. 105 (Amboine).
 128. *C. Wallacei*, Saunders, Cat. Bupr. p. 100, n. 159 (1871) (Sumatra, Bornéo).
 basalis || H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 103 (1864).
 129. *C. discendens*, Gemminger & Harold, Cat. Col. Vol. 5, p. 1425 (1869) (Java).
 dissimilis || H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 99 (1864).
 130. **C. Weyersi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 11 (1900) (Sumatra).
 131. *C. elliptica*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 94 (1864) (Bornéo).
 132. **C. iridea*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 76 (1900) (Woodlark).
 133. *C. gabonica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 305 (1900) (Gabon; Congo).
 * *parallela* || Kerremans, idem, Vol. 37, p. 248 (1893).
 134. **C. coelestis*, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 267 (1899) (Abyssinie).
 135. **C. Kraatzi*, Kerremans, ibidem, p. 268 (Cameroon).
 136. *C. auripes*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pl. 2, f. 12 (1838) (Sénégal).
 * *auripes*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 252 (1893).

marquées; élytres plus finement pointillés, avec les côtes moins nettes, la présuturale interrompue à hauteur de la fossette discale, la dentelure marginale des élytres plus largement espacée; la coloration du dessous plus franchement verte et plus brillante, enfin, la seconde rangée de fossettes abdominales ne paraît pas exister chez le précédent. Le caractère sexuel ♂ du dernier segment abdominal est plus accusé, les dents étant plus allongées et plus aigües. — Australie.

(1) Long. 11,5; larg. 4 mm. — Oblong ovale, noir brillant, légèrement verdâtre sur la tête et le pronotum, un peu irisé sur les élytres, ceux-ci ayant chacun trois fossettes vert clair auréolées de rouge. Dessous plus verdâtre que le dessus et un peu plus clair. Plus verdâtre que le *C. Frenchi* Kerremans, les fossettes élytrales beaucoup moins nettes, moins profondes et moins larges. — Front rugueux, inégal, ridé et impressionné; pronotum à rides transversales, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, non déprimé de chaque côté de la ligne médiane; élytres plus finement ponctués, la dentelure du bord postérieur moins prononcée, les côtes un peu plus minces et moins nettes. Dessous plus obscur; fossettes abdominales nulles ou très vagues. — Nouvelles Galles du Sud.

(2) Long. 20; larg. 8,5 mm. — Ovalaire élargi, robuste, assez convexe, bronzé obscur et brillant en dessus, les élytres avec trois fossettes à fond cuivreux rosé et une tache allongée de même sur le calus huméral. Dessous vert doré à reflets cuivreux, l'extrémité du dernier segment abdominal bleu d'acier; antennes, tibias et tarses obscurs. — Voisin pour le faciès et la taille du *C. andamana* Kerremans, distinct par la coloration et la présence de taches claires sur les fossettes élytrales. — Tête inclinée; front déprimé, couvert de rides concentriques; carène frontale cintrée en arrière. Pronotum couvert de rides transversales plus accentuées sur les côtés que sur le disque, les bords extérieurs sinueux, les côtés avec deux vagues fossettes. Ecusson assez grand, impressionné au milieu. Elytres sans côtes, dentelés sur les bords de l'épaule au sommet, avec trois fossettes arrondies. Dessous brillant, finement ponctué; dent fémorale petite, étroite à la base; deux dents plus petites entre celle-ci et le côté interne du fémur; dernier segment abdominal ♀ caréné, son extrémité étroitement échancrée au milieu. — Halmaheira.

137. *C. empyrea*, Gerstaecker, Arch. Naturg. Vol. 37, p. 53 (1871) (Zanguebar).
 * *empyrea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 251 (1893).
138. *C. cyanicollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pl. 1, f. 5 (1838) (Madagascar).
 * *cyanicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 255 (1893).
 * *howas*, Kerremans, idem, p. 255.
139. *C. guttata*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 69, pl. 6, f. 58 (1790) (Sénégal).
picticollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pl. 1, f. 4 (1838).
iridicolor, Thomson, Typ. Bupr. p. 79 (1878).
 * *guttata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 255 (1893).
140. **C. cincta*, Kerremans, idem, p. 257 (Gabon).
141. **C. indigacea*, Kerremans, ibidem, p. 258 (Gabon).
142. **C. curta*, Kerremans, ibidem, p. 258 (Zanguebar).
143. **C. picipes*, Kerremans, ibidem, p. 259 (Congo).
144. **C. auricollis*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 304 (1898) (Congo).
145. **C. nigrita*, Kerremans, ibidem, Vol. 37, p. 259 (1893) (Cameroon).
146. *C. dorsata*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 179 (1787) (toute l'Afrique).
serrata, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 2, p. 200 (1794).
spinipes, Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol. 9, p. 42 (1827).
chalcophana, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 38, pl. 3, f. 12 (1829).
boschismani, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pl. 1, f. 6 (1838).
Sparmanni, Castelnau & Gory, idem, p. 6, pl. 2, f. 8.
caffra, Castelnau & Gory, ibidem, p. 8, pl. 2, f. 10.
Deyrollei, Thomson, Arch. Ent. Vol. 2, p. 73 (1858).
 * *chalcophana*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 410 (1865).
spuria, Marseul, idem, p. 411.
roseiventris, Thomson, Typ. Bupr. p. 79 (1878).
impressifrons, Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 145 (1884).
 * *laeviscutata* Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 60, p. 243 (1891).
 * *dorsata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 260 (1893).
147. **C. abyssinica*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 60, p. 243 (1891) (Abyssinie).
148. *C. fatalis*, Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. Vol. 2, p. 105 (1878) (Afrique orientale).
-
149. *C. aeneicollis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 101 (1864) (Bornéo).
150. *C. aeneifrons*, Fairmaire, Miss. Revoil, Col. p. 53 (1882) (Somalis).
151. *C. aeneola*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 239 (1860) (Kansas).
purpurata, Blanders, Proc. Amer. Philos. Soc. p. 66 (1864).
152. *C. aequalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 184 (1889) (Mexique).
153. *C. aeraria*, Harold, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 217 (1878) (Zanzibar).
154. *C. aerea*, Chevrolat, Col. Mex. Fasc. 3, p. 49 (1835) (Mexique).
155. *C. amberbakiana*, Thomson, Typ. Bupr. Appl. 1a, p. 46 (1879) (Nouvelle-Guinée).
156. *C. amplicollis*, Thomson, idem, p. 47 (Australie).
157. *C. analis*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 238 (1860) (Etats-Unis d'Amérique).
Austini, Thomson, Typ. Bupr. p. 78 (1878).
158. *C. armata*, Dugès, La Naturelleza (2), Vol. 3, p. 19, pl. 2, f. 29 (1891) (Mexique).
159. *C. Astarte*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 10 (1895) (Algérie).
160. *C. astuta*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 37, pl. 3, f. 5 (1887) (Mexique).
161. *C. atrifasciata*, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 332 (1873) (Etats-Unis d'Amérique).
nigrofasciata || Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 240 (1860).
162. *C. aurocincta*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 282 (1872) (Tucuman).
163. *C. aurifera*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. p. 177 (1866) (Bogota).
164. *C. auroimpressa*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 168, pl. 28, f. 163 (1841) (Colombie).
165. *C. axillaris*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 75, pl. 2, f. 20-24 (1886) (Arizona).
166. *C. bellata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 44 (1879) (Brésil).
167. *C. Belti*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 35, pl. 3, f. 4 (1887) (Nicaragua).
168. *C. bicolor*, Horn, Calif. Acad. (2), Vol. 4, p. 366 (1894) (Californie).
169. *C. bicornis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 14, pl. 3, f. 21 (1838) (Brésil).
170. *C. bistripunctata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 111 (1864) (Timor).

171. *C. Blanchardi*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 93, pl. 4, f. 115-119 (1886) (Etats-Unis).
172. *C. capensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 252 (1893) (Cap de Bonne-Espérance).
173. *C. carbonaria*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 57, pl. 10, f. 78 (1838) (Loc.?).
174. *C. carinata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 197 (1892) (Bengale).
175. *C. carneola*, Voet, Cat. Col. Vol. 1, p. 104, pl. 51, f. 21 (1801) (Loc.?).
176. *C. catascopa*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 45 (1879) (Cayenne).
177. *C. caurina*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 92, pl. 4, f. 105-109 (1886) (Etats-Unis d'Amér.).
178. *C. chalcophoroides*, Horn, idem, p. 110, pl. 6, f. 203-206 (Arizona).
179. *C. chalybea*, Castelnau & Gory, Vol. 2, p. 25, pl. 5, f. 36b (1838) (Java).
180. *C. chlorosticta*, Thomson, Typ. Bupr. p. 78 (1878) (St-Domingue).
181. *C. circuloimpressa*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 104 (1864) (Bornéo).
182. *C. congener*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Colobogaster*, p. 12, pl. 2, f. 81 (1838) (Cayenne).
183. *C. consimilis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 152, pl. 26, f. 148 (1841) (Cayenne).
184. *C. convexiuscula*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 38, pl. 3, f. 7 (1887) (Nicaragua).
185. *C. cordovens*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 55, pl. 10, f. 75 (1838) (Brésil).
186. *C. cribrifrons*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 42 (1879) (Cayenne).
187. *C. cupreipes*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 262 (1864) (Mendoza).
188. *C. cuprina*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 39, pl. 3, f. 13 (1829) (Ambukhol).
189. *C. curvicolis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 306 (1900) (Gabon).
rotundicollis || Kerremans, idem, Vol. 37, p. 256 (1893).
190. *C. cyanescens*, H. Deyrolle, ibidem, Vol. 8, p. 97 (1864) (Singapour).
191. *C. cyanipennis*, H. Deyrolle, ibidem, p. 90 (Amboine).
192. *C. deflexicornis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 15, pl. 3, f. 22 (1838) (Brésil).
193. *C. Delarayi*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 31, p. 119 (1887) (Yuannan).
194. *C. deleta*, Le Conte, Trans. Amer. Ahil. Soc. Vol. 11, p. 255 (1860) (Californie).
subcylindrica, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 182, pl. 4, f. 17 (1859).
195. *C. densa*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 184 (1889) (Amérique centrale).
196. *C. deserta*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 100, pl. 5, f. 155-158 (1886) (Californie).
197. *C. Desmaresti*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Buprestis*, p. 34, pl. 8, f. 39 (1836) (Santiago).
Lacordairei, Thomson, Typ. Bupr. p. 30 (1878).
maxima, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 378 (1872).
198. *C. discicollis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 515 (1867) (Penang).
199. *C. disparicollis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 41 (1879) (Cayenne).
200. *C. dolata*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 87, pl. 3, f. 71-74 (1886) (Californie).
201. *C. duplicata*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 73 (1839) (Bahia).
202. *C. dyopatra*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 161, pl. 27, f. 157 (1841) (Colombie).
diogena, Gory, idem, p. 169, pl. 38, f. 164.
203. *C. Edwaasi*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 74, pl. 2, f. 11-14 (1886) (Arizona).
204. *C. elongata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 94 (1864) (Bornéo).
205. *C. emarginaticollis*, Blanchard, Voy. d'Orb. p. 148, pl. 9, f. 5 (1847) (Bolivie).
206. *C. errans*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 172, pl. 29, f. 167 (1841) (Etats-Unis).
207. *C. erythrogona*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. p. 176 (1866) (Bogota).
208. *C. Fabricii*, Saunders, Cat. Bupr. p. 95, n° 18 (1871) (Surinam).
impressa || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Colobogaster*, p. 14, pl. 3, f. 14 (1838).
209. *C. fastidiosa*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 180, pl. 30, f. 176 (1841) (Brésil).
210. *C. fossifrons*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 213 (1893) (Brésil).
cavifrons || Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 43 (1879).
211. *C. foveata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, pl. 41 (1887) (Mexique).
212. *C. foveiceps*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 516 (1867) (Penang).
213. *C. fronticornis*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 74 (1839) (Brésil).
214. *C. fruta*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 167, pl. 28, f. 162 (1841) (Cayenne).
215. *C. gemmata*, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 67 (1858) (Sonora).
216. *C. generosa*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 28, pl. 6, f. 40 (1838) (Brésil).
217. *C. globicollis*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 130 (1895) (Hérat).
218. *C. Gounellei*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 33 (1897) (Amazones).

219. *C. guatimalensis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 80 (1878) (Guatémala).
220. *C. guyanensis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 44 (1879) (Guyane).
221. *C. heliophilus*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 352 (1893) (Algérie).
222. *C. hexastigma*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 78 (1837) (Turcomanie).
223. *C. holochalcea*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 380 (1872) (Buenos-Ayres).
224. *C. humilis*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 102, pl. 6, f. 169-172 (1886) (Arizona).
225. *C. igniventris*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 129 (1895) (Hérat).
226. *C. ignota*, Dugès, La Naturelleza (2), Vol. 2, p. 20, pl. 2, f. 30 (1891) (Mexique).
227. *C. inaequalicollis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 77 (1878) (Colombie).
228. *C. inaequalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 42, pl. 3, f. 13 (1887) (Mexique).
229. *C. incana*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2), Vol. 3, p. 1230 (1888) (Dét. de King).
230. *C. insidiosa*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 43, pl. 3, f. 15 (1887) (Panama).
231. *C. insolata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 102 (1864) (Singapour).
232. *C. interioris*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. p. 46 (1895) (Australie).
233. *C. jakowleffi*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 340 (1890) (Transcaspienne).
234. *C. javana*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 46 (1879) (Java).
235. *C. juncta*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 33, pl. 3, f. 8 (1887) (Mexique).
236. *C. Kerremansi*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 130 (1894) (Transbaïkal).
quadraticollis || Abeille, idem, p. 352 (1893).
237. *C. Keyensis*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Vol. 9, p. 356 (1877) (Iles Key).
238. *C. Lancei*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, p. 18, pl. 4, f. 26 (1838) (Surinam).
239. *C. laticollis*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 379 (1873) (Buenos-Ayres).
240. *C. latifrons*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 98 (1864) (Bornéo).
241. *C. libonoti*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 108, pl. 6, f. 193-197 (1886) (Arizona).
242. *C. longula*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 375 (1867) (Penang).
243. *C. lucana*, Horn, Calif. Acad. (2), Vol. 4, p. 367 (1894) (Californie).
244. *C. ludificata*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 88, pl. 3, f. 80-84 (1886) (Californie).
245. *C. maculata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 42, pl. 8, f. 58 (1838) (Cayenne).
246. *C. maculicollis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 76 (1878) (Brésil).
247. *C. Mastersi*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, p. 247 (1872) (Gayndah).
248. *C. megacephala*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 13, pl. 3, f. 18 (1837) (Antilles).
octosignata, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 38 (1887).
249. *C. Merkeli*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 106, pl. 6, f. 183-187 (1886) (Texas).
250. *C. microstigma*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 356 (1877) (Nouvelle-Guinée).
251. *C. modesta*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 46 (1887) (Mexique).
252. *C. Montrouzieri*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 216 (1893) (Woodlark).
sexpunctata || Montrouzier, Ann. Soc. Linn. Lyon (2), Vol. 1, p. 11 (1855).
253. *C. myia*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 166, pl. 28, f. 161 (1841) (Bolivie).
254. *C. nana*, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 152 (1892) (Turkestan).
255. *C. Nausicaa*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 45 (1879) (Mexique).
256. *C. nixa*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 98, pl. 5, f. 145-149 (1886) (Névéda).
257. *C. occipitalis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 95 (1864) (Bornéo).
258. *C. octofoveata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 41 (1879) (Bahia).
259. *C. octonotata*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 317 (1874) (Philippines).
260. *C. pampas*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 48 (1879) (Brésil).
261. *C. pantochlora*, Guérin, Voy. Lefebvre, p. 276, pl. 2, f. 2 (1847) (Abyssinie).
262. *C. parallela*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 109 (1864) (Makian).
263. *C. perplexa*, H. Deyrolle, idem, p. 103 (Bornéo).
264. *C. Perroni*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 11, pl. 2, f. 15 (1838) (Australie).
265. *C. Phoebe*, Thomson, Typ. Bupr. p. 77 (1878) (Mexique).
266. *C. pictiventris*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 316 (1874) (Philippines).
267. *C. pilifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 254 (1893) (Gabon).
268. *C. Pluto*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 174, pl. 29, f. 169 (1841) (Brésil).
269. *C. polyspilota*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 282 (1872) (Panama).

270. *C. prasina*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 118, pl. 7, f. 244-247 (1886) (Californie).
271. *C. puella*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 175, pl. 29, f. 170 (1841) (Amérique méridionale).
272. *C. pulcherrima*, Vollenhoven, Tijdschr. Ent. Vol. 7, p. 164 (1864) (Sumatra).
273. *C. pulchra*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 18, pl. 4, f. 27 (1838) (Brésil).
274. *C. pulchripes*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 322 (1887) (Chine).
275. *C. punctata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 5, p. 32 (1897) (Bahia).
276. *C. pygmaea*, Kerremans, idem, p. 35 (Pernambuco).
277. *C. quadraticollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 198 (1892) (Bengale).
278. *C. quadrilineata*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 233 (1860) (Nouveau Mexique).
279. *C. quadrimaculata*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 236 (1787) (Bengale).
280. *C. quadriplagiata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 43, pl. 3, f. 16 (1887) (Mexique).
281. *C. regradata*, Wallengren, Ent. Tidskr. Vol. 2, p. 16 (1881) (Transvaal).
282. *C. Reitteri*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 304 (1900) (Hérat).
inaequalis || Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1895, p. 128.
283. *C. Ritsemae*, Gestro, Ann. Mus. Stov. Nat. Genova, Vol. 9, p. 652 (1877) (Bornéo).
284. *C. rotundicollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 51, pl. 9, f. 69 (1838) (Saint-Domingue).
285. *C. rubromaculata*, Castelnau & Gory, idem, *Colobogaster*, p. 10, pl. 2, f. 9 (Brésil).
286. *C. rubripes*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 71 (1839) (Bahia).
287. *C. rugifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 256 (1893) (Bagamoyo).
288. *C. rugipes*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 4, f. 29 (1838) (Cayenne).
289. *C. rutilicuspis*, Heller, Not. Leyd. Mus. Vol. 15, p. 177 (1893) (Loc. ?).
290. *C. salebrosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 253 (1893) (Niam-Niam).
291. *C. sapphirina*, Schoenherr, Syn. Ins. App. p. 121 (1817) (Indes orientales).
292. *C. Saundersi*, Mac-Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 246 (1872) (Gayndah).
293. *C. sericeifrons*, Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 66, p. 366 (1897) (Cayenne).
294. *C. sextistigmata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pl. 5, f. 37 (1838) (Cayenne).
295. *C. similis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 517 (1867) (Penang).
296. *C. sinensis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 31, p. 119 (1889) (Yunnan).
297. *C. sobrina*, Dugès, La Natureza, Vol. 2, p. 19 (1891) (Mexique).
298. *C. socialis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 39, pl. 3, f. 10 (1887) (Mexique).
299. *C. soror*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 12, pl. 3, f. 16 (1837) (Cayenne).
300. *C. speculifer*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 13, p. 83, pl. 3, f. 56-60 (1886) (Amérique septentr.).
301. *C. stellifera*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 44, pl. 3, f. 18 (1887) (Mexique).
302. *C. Stephensi*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 17, pl. 4, f. 25 (1838) (Amérique méridionale).
303. *C. subsimilis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 47 (1879) (Australie).
304. *C. suturalis*, Walker, Ann. Nat. Hist. (3), Vol. 2, p. 280 (1858) (Ceylan).
305. *C. tetragramma*, Ménétries, Cat. p. 149 (1832) (Caucase).
306. *C. thoracica*, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 138 (1798) (Antilles).
amabilis, Herbst, Col. Vol. 9, p. 144, pl. 157, f. 5 (1801).
307. *C. tricolor*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 196 (1892) (Bengale).
308. *C. trifasciata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pl. 6, f. 41 (Java).
309. *C. trisignata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 39, pl. 3, f. 9 (1887) (Mexique).
310. *C. trochilus*, Waterhouse, idem, p. 40, pl. 3, f. 11 (Panama).
311. *C. Tschitscherini*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. p. 652 (1898) (Transcaucasie).
312. *C. tumida*, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 585 (1867) (Cuba).
313. *C. Ulkei*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 240 (1860) (Texas).
314. *C. unica*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 96 (1864) (Malacca).
315. *C. ventralis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 318 (1874) (Philippines).
316. *C. venustula*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pl. 5, f. 38 (1838) (Cayenne).
317. *C. viridinotata*, Castelnau & Gory, idem, *Colobogaster*, p. 16, pl. 3, f. 17 (Java).
318. *C. viridipunctata*, Blanch. Voy. Pôle Sud, Vol. 4, p. 94, pl. 6, f. 15 (1854) (Moluques).
319. *C. viridis*, Mac-Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 247 (1872) (Gayndah).

GROUPE 2. ACTENODITES, KERREMANS

Actenodites. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 112 (1893).

Caractères. — Troisième article des tarses profondément échancré et terminé par deux longues épines.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. — <i>Armature du troisième article des tarses divergente.</i> | 2. |
| — — — <i>parallèle</i> | 1. CHALCANGIUM. |
| 2. — <i>Fémurs antérieurs inermes</i> (1) | 3. |
| — <i>dentés</i> (2) | 2. ACTENODES. |
| 3. — <i>Premier article des tarses postérieurs jamais plus long que les trois suivants réunis.</i> | 4. |
| — — <i>plus long que les trois suivants réunis.</i> | 3. PSEUDACTENODES. |
| 4. <i>Ecusson médiocre, en triangle équilatéral</i> | 4. MEGACTENODES. |
| — <i>très allongé et très acuminié en arrière</i> | 5. BELIONOTA. |

1. GENUS CHALCANGIUM, WATERHOUSE

Chalcangium. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 32 (1882).

Caractères. — « Faciès et caractères généraux des *Chrysobothris*. Yeux très séparés en dessous. »
 » Cavités antennaires médiocres, peu profondes et arrondies. Extrémité du prosternum faiblement anguleuse seulement sur les côtés et immédiatement entre les hanches antérieures. Le métasternum non échancré en avant. Fémurs antérieurs simples, non dentés. Tarses très étroits; les angles apicaux du troisième article avancés suivant deux longues épines, comme chez les *Actenodes*, mais à un degré moins accentué et non divergentes, le quatrième article très court (sans lamelle en dessous), presque recouvert par le troisième. Une carène médiane allant du deuxième au cinquième segment abdominal. Pronotum plus étroit que les élytres, ses angles postérieurs juxtaposés contre ceux-ci. Ecusson petit, en triangle allongé.

» L'espèce pour laquelle je propose ce genre a un peu le faciès du *Chrysobothris costifrons*, mais elle est plus allongée et n'a pas d'impressions élytrales. La forme de l'appendice prosternal, les fémurs antérieurs inermes et la structure particulière des tarses nécessitent la création du genre dans lequel elle vient se placer. »

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre, dont je traduis la description d'après son créateur, habite le Mexique.

1. *C. longipenne*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 33, pl. 3, f. 1, 1a (1882) (Mexique).

2. GENUS ACTENODES, LACORDAIRE

Actenodes. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 72 (1857); Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 11 (1880); Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 134 (1890).

Caractères. — Tête verticale; front inégal ou aplani; épistome court et large, plus ou moins échancré en arc; cavités antennaires assez grandes. — Antennes médiocres, variables, dentées à partir

(1) A l'exception du *Pseudactenodes vitticollis* Harold, qui a les fémurs antérieurs faiblement dentés.

(2) A l'exception des *Actenodes parvicollis* Kerremans et *Hilarii* Gory, qui ont les fémurs antérieurs simples, mais qu'on ne saurait séparer des autres *Actenodes*, bien qu'ils présentent tous deux une fine carène médiane le long de l'abdomen, caractère qui ne se remarque que chez ces deux seules espèces.

du 4^e article, celui-ci et les suivants munis le plus souvent d'une fossette porifère inférieure. — Yeux très grands, allongés, ovalaires, rapprochés en arrière sur le vertex. — Pronotum court, séparé des élytres par un vide huméral anguleux, le lobe médian large, court et arrondi. — Ecusson petit, triangulaire. — Elytres variables, chagrinés ou finement ponctués, avec ou sans côtes, rarement denticulés en arrière sur les côtés. — Prosternum plan en avant et tridenté en arrière. — Mésosternum divisé, ses branches allongées, arquées en dehors à angle droit. — Mésternum faiblement échancré en avant. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs plus ou moins renflés, presque toujours dentés et canaliculés sur leur bord inférieur; tibias normaux; les antérieurs souvent arqués chez le ♂; tarsi peu allongés, le premier article des postérieurs peu allongé, mais plus long que le suivant, le troisième profondément échancré, divisé en deux branches prolongées suivant deux épines divergentes, le quatrième enfoui entre ces branches. Extrémité du dernier segment abdominal ♂ plus ou moins échancrée, ♀ variable, le plus souvent lobée au milieu.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend une quarantaine d'espèces provenant du Mexique, des Antilles, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique intertropicale et de Madagascar. Il paraît ne pas avoir de représentants en Europe, en Asie, en Malaisie et en Australie et ses espèces sont plus nombreuses en Amérique que dans les autres régions. Leur faciès varie dans chacune de celles-ci, tout en conservant son caractère propre, intermédiaire entre les *Chrysobothris* et les genres qui suivent; les fémurs antérieurs le plus souvent dentés les rapprochent des premiers, tandis que l'allure du troisième article des tarsi les rapproche des seconds.

1. *A. curvipes*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 179, pl. 30, f. 174 (1841) (Madagascar).
* *curvipes*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 243 (1893).
2. *A. scabriuscula*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 18, pl. 1, f. 10 (1886) (Quango, Congo).
* *scabriuscula*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 242 (1893).
* *intermedia*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 267 (1899).
3. *A. acornis*, Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. 159 (1836) (Etats-Unis d'Amérique).
rugulosa, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 177, pl. 30, f. 172 (1841).
punctata, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 147 (1846).
4. *A. acuminipennis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 184, pl. 31, f. 181 (1841) (Madagascar).
* *acuminipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 244 (1893).
5. **A. ornatcollis*, Kerremans, idem, p. 243 (Madagascar).
6. *A. circumdata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 183, pl. 31, f. 180 (1841) (Madagascar).
* *circumdata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 245 (1893).
7. *A. gabonica*, Thomson, Arch. Ent. Vol. 2, p. 74 (1858) (Gabon).
* *gabonica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 245 (1893).
8. **A. congolana*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 303 (1898) (Congo).
9. *A. aenea*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 185, pl. 31, f. 182 (1841) (Madagascar).
* *aenea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 245 (1893).
10. *A. obscuripennis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 39, pl. 7, f. 54 (Guyane, Brésil).
cunosta, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 164, pl. 28, f. 159 (1841).
11. **A. amazonica*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 22 (1897) (Amazonie).
12. *A. bellula*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 79 (1837) (Antilles).
auronotata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 20, pl. 4, f. 30.
bella, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 240 (1860).
13. *A. Reichei*, Thomson, Typ. Bupr. p. 74 (1878) (Mexique).
* *Reichei*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 32, pl. 2, f. 18 (1882).
14. *A. nobilis*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 1, p. 410 (1758) (Mexique, Guatémala, Brésil, Pérou).
nobilis, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 2, p. 210 (1794).
regalis, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 187 (1801).
flexuosa, Sturm, Cat. p. 105 (1826).
aurulnata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 32, pl. 6, f. 47 (1838).
* *fulginea*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 29, pl. 2, f. 15 (1882).
15. *A. Goryi*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 81 (1837) (Mexique).
16. *A. versicolor*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 36, pl. 7, f. 90 (1838) (Guyane).
17. *A. intermedia*, Castelnau & Gory, idem, p. 37, pl. 7, f. 51 (Brésil).
18. **A. parvicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 21 (1897) (Brésil).

19. *A. Hoffneri*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 170, pl. 29, f. 165 (1841) (Mexique).
20. *A. undulata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 31, p. 2, f. 20 (1882) (Yucatan).
21. **A. calcarata*, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 5, n° 103 (1835) (Mexique, Brésil).
fulgurata, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 8, p. 80 (1837).
Lebasi, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 30, pl. 6, f. 43 (1841).
22. *A. fulminata*, Schönherr, Syn. Ins. Vol. 1, App. p. 121 (1817) (Goyaz).
cyanura, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 72 (1839).
23. *A. signata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 38, pl. 5, f. 53 (1838) (Panama, Guyane).
24. *A. insignis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 171, pl. 29, f. 166 (1841) (Brésil).
25. *A. Hilarii*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 31, pl. 6, f. 44 (Goyaz).
26. *A. costipennis*, Castelnau & Gory, idem, p. 3, pl. 1, f. 3 (Bahia).
27. **A. chalybeitarsis*, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 1, n° 10 (1835) (Mexique, Vénézuéla).
curvicolis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 158, pl. 27, f. 153 (1841).
28. **A. viridicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 20 (1897) (Mexique).

-
29. *A. Adonis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 35, pl. 7, f. 49 (1838) (Brésil).
 30. *A. Alluaudi*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 347 (1894) (Madagascar).
 31. *A. bifasciata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 30, pl. 2, f. 16 (1882) (Mexique).
 32. *A. Buqueti*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 163, pl. 27, f. 158 (1841) (Colombie).
 33. *A. dilatata*, Gory, idem, p. 157, pl. 26, f. 152 (Colombie).
 34. *A. humeralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 31 et 182, pl. 2, f. 19 (1882) (Nicar.).
 35. *A. levifrons*, Waterhouse, idem, p. 30, pl. 2, f. 17 (Nicaragua).
 36. *A. marmorata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 31, pl. 6, f. 45 (1838) (Cayenne).
 37. *A. mendax*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 46 (1891) (Texas).
 38. *A. metallica*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 181 (1839) (Guatémala).
 39. *A. Sallei*, Thomson, Typ. Bupr. p. 73 (1878) (Mexique).
 40. *A. suavis*, Brancsik, Jahrb. Ver. Trencsen, Vol. 19, p. 119, pl. 4, f. 8 (1897) (Madagascar).

3. GENUS PSEUDACTENODES, KERREMANS

Pseudactenodes. Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 137 (1893); Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 236 (1893).

Caractères. — Tête plane; front rugueux; épistome bisinué avec une petite dent médiane obtuse, son bord relevé; cavités antennaires petites, arrondies. — Antennes dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} allongé, en massue épaisse; 2 court, obconique; 3 deux fois plus long; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, ovalaires, obliques et rapprochés sur le vertex. — Pronotum tronqué en avant, arqué et subanguleusement avancé sur les côtés; la base bisinué avec un large lobe médian arqué; les angles postérieurs abaissés, aigus et juxtaposés à la base des élytres. — Ecusson petit, triangulaire et très acuminé au sommet. — Elytres lobés à la base, arrondis à l'épaule, graduellement atténués en arc de la base au sommet, non dentelés sur les bords avec, y comprises la suture et la marge latérale, neuf côtes, les paires entières, les impaires un peu moins saillantes et plus courtes. — Prosternum assez convexe, large, tronqué à la base, le sommet trifide. — Mésosternum divisé; ses branches latérales obliques. — Mésternum échancré à son sommet. — Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure presque droite, subsinueuse; la postérieure oblique, échancrée et ensuite lobée au côté interne. — Pattes assez longues et grêles; fémurs antérieurs inermes ou dentés; tibias allongés; tarses très longs, le premier article des postérieurs aussi long que les suivants réunis. — Premier segment abdominal faiblement sillonné au milieu; extrémité du dernier segment ♂ échancrée, l'échancrure limitée de part et d'autre par deux épines superposées, ♀ lobée et sinueuse entre deux courtes dents.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que trois espèces de ce beau genre; toutes les trois appartiennent à la faune intertropicale africaine.

1. *A. Schmidtii*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 35, p. 135 (1890) (Tabora).
* *Iris*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 137 (1890).
2. *A. chrysotis*, Illiger, Wiedem. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 121 (1800) (Tabora).
longitarsis, Thomson, Typ. Bupr. p. 73 (1878).
3. *A. vitticollis*, Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. Vol. 2, p. 105 (1878) (Guinée).

4. GENUS MEGACTENODES, KERREMANS

Megactenodes. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 111 et 237 (1893).

Caractères. — Tête inégale, variable suivant l'espèce ou le sexe; épistome échancré ou bisinué, souvent avec une petite dent médiane; vertex sillonné; cavités antennaires assez grandes, triangulaires. — Antennes assez courtes; article 1 en massue allongée et légèrement arqué; 2 très court, globulaire; 3 aussi long que 1, cylindrique ou subtriangulaire, dans ce cas légèrement aplani; 4 le plus large de tous, triangulaire; les suivants semblables au 4^e, mais diminuant graduellement en largeur; pores antennaires concentrés dans une fossette allongée en forme de sillon et occupant la face inférieure des articles. — Pronotum transversal, sinueux ou arrondi sur les côtés et bisinué à la base. — Ecusson médiocre, triangulaire et très acuminé en arrière. — Elytres allongés, déprimés, cunéiformes, obliquement tronqués le long de l'écusson, avancés en un lobe arrondi dans le sinus du pronotum, arrondis à l'épaule avec le calus huméral saillant, les côtés atténués suivant une courbe régulière, le sommet arrondi, inerme ou denté à la suture; ils présentent de part et d'autre six côtes lisses plus ou moins sinueuses. — Prosternum plan; son sommet lancéolé. — Mésosternum divisé; ses branches un peu obliques. — Métasternum échancré au sommet. — Fémurs antérieurs inermes, les postérieurs variables; tibias normaux; articles des tarses subégaux entre eux, les épines de l'échancrure du 3^e article très longues, dépassant toujours le 4^e; une lamelle membraneuse au 3^e et au 4^e article. — Abdomen variable suivant les espèces quant à la forme de la dépression médiane de chacun des quatre derniers segments; le premier de ceux-ci très allongé et longitudinalement sillonné au milieu; les 3 suivants subégaux entre eux, le 5^e allongé, légèrement courbe sur les côtés, ceux-ci terminés en angle très aigu, le sommet échancré ♂ ou bisinué ♀.

Distribution géographique des espèces. — Les huit espèces qui viennent se ranger dans ce genre habitent l'Afrique intertropicale; elles présentent toutes un dimorphisme sexuel variant d'une espèce à l'autre, mais seulement chez le ♂.

1. *M. reticulata*, Klug, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 646 (1855) (Congo, Zambèse).
nervosa, Klug, idem, p. 647.
* *reticulata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 238 (1893).
2. **M. rudis*, Kerremans, idem, p. 509 (Gabon).
3. *M. tenuicostata*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 20 (1886) (Haut-Ogowé).
* *tenuicostata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 241 (1893).
4. *M. punctata*, Silberman, Rev. Ent. Vol. 5, p. 108 (1838) (Sénégal, Guinée, Gabon, Congo).
levior, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 19 (1886).
* *punctata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 239 (1893).
5. *M. Westermanni*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Belionota*, p. 5, pl. 1, f. 3 (1838) (Guinée, Congo, Mozambique, Natal).
femorata, Guérin, Rev. Zool. p. 107 (1840).
Bohemani, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 326 (1851).
aenea, Thomson, Typ. Bupr. p. 74 (1878).
Thomsoni, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 136 (1890).
* *Westermanni*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 239 (1893).
6. *M. chrysifrons*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 16, pl. 1, f. 8, 8a (1886) (Cameroon, Congo).
* *chrysifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 241 (1893).

7. *M. unicolor*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Chrysobothris*, p. 3, pl. 1, f. 2 (1838) ♀ (Cameroon, Haut-Ogowé, Congo).
laticornis, Castelnau & Gory, idem, p. 58, pl. 10, f. 80. ♂
 * *laticornis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 241 (1893).
8. *M. ebenina*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 17, pl. 1, f. 9 (1886) (Gabon, Congo).
 * *ebenina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 240 (1893).
 * *v. viridicollis*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 303 (1898).

5. GENUS BELIONOTA, ESCHSCHOLTZ

Belionota. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 9 (1829); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 306, pl. 12 f. 27 (1832); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1, f. A (1838); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 71 (1857); Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 30, p. 11 (1886); Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 134 (1890).

Caractères. — Tête plane, sillonnée longitudinalement en arrière; épistome large, subsinueux, faiblement échancré, parfois muni d'une petite dent médiane; cavités antennaires très grandes et arrondies. — Antennes du groupe; les articles dentés munis d'une fossette porifère subterminale et situé sur la tranche interne des articles. — Yeux très grands, ovalaires, très obliques et très rapprochés sur le vertex. — Pronotum court, rétréci en avant, bisinué à la base avec les angles postérieurs aigus et le lobe médian large, court et tronqué; un vide anguleux de chaque côté entre lui et les épaules. — Ecusson très allongé, en triangle très aigu au sommet et au moins de la longueur du quart des élytres. — Ceux-ci allongés, déprimés, cunéiformes, anguleux à leur base interne, inermes ou dentelés sur les côtés en arrière, épineux à l'angle sutural. — Prosternum très large, renflé en avant, plan et élargi en arrière, tridenté au sommet, les dents égales. — Mésosternum divisé, ses branches latérales courtes, transversales et arrondies en avant. — Méta sternum formant presque à lui seul la cavité sternale, profondément et anguleusement échancré en avant. — Pattes grêles; fémurs antérieurs non dentés; tibias normaux; tarsi médiocres, le premier article des postérieurs non comprimé et peu allongé, le 3^e profondément divisé en deux lobes grêles, le 4^e enfoui entre ces lobes et très court, largement lamellé en dessous. — Abdomen largement canaliculé dans toute sa longueur, les côtés des segments anguleusement abaissés en arrière. — Corps oblong ovale, allongé et déprimé; différences sexuelles extérieures nulles dans la majeure partie des cas.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre appartient en majeure partie à la faune Indo-Malaise ou même à la Malaisie proprement dite. Une espèce (*prasina*, Thunberg) possède un habitat très étendu, puisqu'elle se retrouve en Afrique, à Madagascar, aux îles Andaman, dans l'Hindoustan et dans tout l'archipel Malais; une autre est commune à l'Afrique et à Madagascar (*canaliculata*, Fabricius). Il n'en existe que trois espèces africaines pures dont une (*sphenopteroides*, Péringuey) douteuse.

1. **B. colossa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 234 (1893) (Afrique orientale allemande).
2. *B. canaliculata*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 181 (1787) (Afrique centrale, Madagascar).
Championi, Murray, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 23, p. 451, pl. 47, f. 5 (1862)
 * *canaliculata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37 (1893).
3. *B. gigantea*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 83 (1864) (Sumatra).
ignicollis, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 374 (1891).
 * *var. minor*, nov. var., plus petit que le type, le pronotum non sillonné au milieu.
4. **B. mindorensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 132 (1898) (Mindoro).
5. *B. prasina*, Thunberg, Nov. Spec. Ins. Vol. 5, p. 90 (1789) (Sénégal, Zanzibar, Maurice, La Réunion, Bengale, Ceylan, Java, Sumatra, etc.).
pyrotis, Illiger, Wiedem. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 119, pl. 1, f. 3 (1800).
scutellaris, Weber, Obs. Ent. p. 72 (1801).
 * *prasina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 235 (1893).
6. *B. aenea*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 82 (1864) (Ceram, Ternate, Nouvelle-Guinée).

7. *B. fulgidicollis*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 356 (1877) (Nouvelle-Guinée).
8. **B. sagittaria*, Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 8, pl. 4, f. 5 (1829) (Philippines).
9. **B. nicobarica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 212 (1895) (Iles Nicobares).
10. *B. fallaciosa*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 84 (1864) (Malaisie).
v. *intermedia*, Lansberge, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 22, p. 148 (1879).
11. *B. metastictica*, Illiger, Wiedem. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 121 (1800) (Malacca, Java, Sumatra).
stigma, Weber, Obs. Ent. p. 73 (1801).
12. *B. Mnischei*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 81 (1864) (Moluques, Ternate).
Hilae, Lansberge, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 22, p. 148 (1879).
13. *B. sumptuosa*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pl. 1, f. 4 (1838) (Sumatra, Célèb., Moluq., etc.).
14. *B. auricolor*, Gestro, Ann. Mus. Stov. Nat. Genova, Vol. 10, p. 652 (1877) (Célèbes).
15. *B. Bonneuili*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 83 (1864) (Sumatra, Moluques, Bornéo).
16. *B. Bonvouloiri*, H. Deyrolle, idem, p. 85 (Batchian, Halmaheira).
17. *B. Vuillifroyi*, H. Deyrolle, ibidem, p. 86 (Bornéo).
* *nigrocingulata*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 135 (1890).

18. *B. cribricollis*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 355 (1877) (Malacca).
19. *B. Deyrollei*, Gestro, idem, p. 355 (Bornéo).
20. *B. Hubneri*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 27, p. 16 (1883) (Nouvelle-Bretagne).
21. *B. humeralis*, Gestro, Ann. Mus. Stov. Nat. Genova, Vol. 9, p. 355 (1877) (Malacca).
22. *B. Lacordairei*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 87 (1864) (Bornéo).
23. *B. lineatopennis*, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 308 (1833) (Sénégal).
24. *B. omissa*, Schaufuss, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 19, p. 199 (1885) (Makassar).
25. *B. Saundersi*, Waterhouse, Ann. Nat. Hist. (6) Vol. 13 (1894) (Ile Damma).
26. *B. sphenopteroides*, Péringuey, Trans. S. Afr. Philos. Soc. p. 45 (1892) (Afrique australe).

TRIBU X. STIGMODERINI, LACORDAIRE

Stigmoderides. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 52 (1857).

Stigmoderini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 114 (1893).

Caractères. — Epistome avancé en museau saillant; front non rétréci à l'insertion des antennes; cavités antennaires petites et situées près des yeux; fossettes porifères des antennes variables, internes, inférieures ou terminales; yeux subparallèles ou faiblement rapprochés en dessous; écusson variable, le plus souvent petit; cavité sternale formée presque en entier par le métasternum, les branches latérales du mésosternum très courtes.

1. Antennes dentées à partir du quatrième article 2.
— — — du cinquième article 6.
2. Fossettes porifères des antennes inférieures ou terminales 3.
— — — internes 3. CALODEMA.
3. Prosternum bombé, saillant à sa partie antérieure 4.
— plan ou très légèrement convexe 5.
4. Sallie prosternale arrondie 1. CONOGNATHA.
— — conique 4. METAXYMORPHA.
5. Antennes normales 2. PITHISCUS.
— plus larges au milieu qu'aux extrémités, le dernier article sensiblement plus petit que les précédents 5. STIGMODERA.
6. Elytres brusquement lobés à la base des épipleures 6. DACTYLOZODES.
Non 7. HYPERANTHA.

I. GENUS CONOGNATHA, ESCHSCHOLTZ

Conognatha. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 9 (1829); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 294, pl. 11, f. 20; Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 50 (1838).

Caractères. — Tête petite et étroite, prolongée en museau en avant; épistome allongé; cavités antennaires petites et situées contre le bord interne des yeux. — Antennes courtes, leurs articles médians un peu plus larges que les extrêmes; 1 en massue peu renflée; 2 très court, obconique; 3 presque aussi long que le premier, les suivants dilatés au côté interne, subtriangulaires et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux médiocres, subovales et subparallèles, à peine rapprochés sur le vertex. — Pronotum large, subconvexe, déclive en avant, non caréné sur les bords avec un calus saillant et oblique dans l'angle postérieur; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian anguleux, la postérieure fortement bisinuée avec le lobe médian assez large et subtronqué. — Ecusson variable, mais généralement tronqué en avant et arrondi en arrière suivant un demi cercle. — Elytres larges, peu convexes, largement arrondis en arrière, striés, les côtés postérieurs dentelés, les dents remontant plus ou moins le long du bord. — Prosternum avancé entre les hanches antérieures et formant une saillie anguleuse en avant; son sommet arrondi. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes, transversales et sinueuses. — Mésternum profondément échancré en arc en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures subcontiguës, médiocrement dilatées au côté interne; leur marge antérieure onduleuse, la postérieure oblique. — Pattes médiocres; fémurs et tibias normaux, tarses assez robustes, les articles 1 et 2 plus longs que 3 et 4, tous bilobés et lamellés en dessous. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ largement échancrée en arc, ♀ faiblement échancrée. — Corps assez grand, oblong, plus étroit en avant qu'en arrière; coloration très brillante.

Distribution géographique des espèces. — Toutes les espèces de ce genre représentent, avec celles du genre qui suit, les *Stigmodera* sur le nouveau continent. Elles appartiennent à la faune intertropicale américaine, à l'exclusion des Antilles, ou la tribu des *Stigmoderini* paraît ne pas être représentée.

1. *C. bifasciata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 19, pl. 2, f. 8 (1882) (Mexique, Brésil).
 2. *C. amoena*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 381 (1818) (Brésil).
princeps, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 136, pl. 23, f. 133 (1841).
 3. *C. gracilis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 52, pl. 12, f. 61 (1838) (Brésil).
 4. *C. Buqueti*, Castelnau & Gory, idem, f. 52 (Brésil).
 5. *C. biocularis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 47 (1878) (Goyaz).
 6. *C. funo*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 53, pl. 12, f. 63 (1838) (Brésil).
 7. *C. haemorrhoidalis*, Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32, p. 38, pl. 10, f. 109 (1790) (Brésil).
equestris, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 196 (1794).
jucunda, Kirby, Trans. Linn. Soc. Vol. 12, p. 331 (1818).
paradisea, Thomson, Typ. Bupr. p. 48 (1878).
 8. **C. pretiosissima*, Chevrolat, Silb. Rev. Entom. Vol. 5, p. 57 (1838) (Rio Grande).
imperator, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 136, pl. 23, f. 134.
 9. *C. magnifica*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 57, pl. 13, f. 59 (1838) (Goyaz).
comes, Castelnau & Gory, idem, p. 58, p. 13, f. 70.
 10. *C. Iris*, Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32, p. 33, pl. 5, f. 39 (1790) (Guyanes).
 11. *C. Vargasi*, Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 261, pl. 13, f. 2 (1855) (Vénézuéla).
-
12. *C. acuminata*, Thomson, Typ. Bupr. p. 50 (1878) (1) (Loc. ?)
 13. *C. azurea*, Philippi, An. Univ. Chile, p. 662 (1859) (Chili).

(1) Cette espèce et celles qui suivent ne font partie de ce genre que pour autant qu'elles aient la marge antérieure du prosternum saillante et anguleuse, caractère que beaucoup d'auteurs ont négligé de signaler.

14. *C. Batesi*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 337 (1869) (Brésil).
comitessa, Thomson, Typ. Bupr. p. 49 (1878).
15. *C. Chabrilacei*, Thomson, idem, p. 49 (Brésil).
16. *C. chrysochlora*, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 314 (1864) (Chili).
17. *C. clara*, Erichson, Schomb. Reise, Vol. 3, p. 556 (1848) (Guyane).
Fryi, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 338, pl. 10, f. 15 (1869).
18. *C. eximia*, Saunders, idem, p. 337, pl. 10, f. 12 (Brésil).
19. *C. humeralis*, Philippi, An. Univ. Chile, p. 663 (1859) (Chili).
20. *C. impressipennis*, Saunders, Cat. Bupr. p. 63, n° 30 (1871) (Rio).
brevicollis || Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 337, pl. 10, f. 13 (1869).
21. *C. interrupta*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 52 (1882) (Bogota).
22. *C. Kerremansi*, Nonfried, Deutsch. Ent. Zeit. p. 272 (1891) (Amazones).
23. *C. laticollis*, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 313 (1864) (Chili).
24. *C. magellanica*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 491 (1884) (Magellan).
25. *C. minor*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 338, pl. 10, f. 16 (1869) (Espirito Santo).
26. *C. olivacea*, Saunders, idem, p. 336, pl. 10, f. 11 (Colombie).
27. *C. patricia*, Klug, Ent. Bras. p. 5, pl. 40, f. 2 (1827) (Brésil).
trizonata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 60, pl. 14, f. 74 (1838).
28. *C. posticalis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 339, pl. 10, f. 17 (1869) (Brésil).
29. *C. Proserpina*, Thomson, Typ. Bupr. p. 49 (1878) (Brésil).
30. *C. quadrizonata*, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 300 (1895) (Brésil).
31. *C. trifasciata*, Fabricius, Ent. Syst. p. 198 (1794) (Amérique méridionale).
fasciolata, Saunders, Cat. Bupr. p. 65, n° 62 (1871).
32. *C. Ulei*, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 300 (1895) (Brésil).

2. GENUS PITHISCUS, SOLIER

Pithiscus. Solier, Gay. Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 491 (1851).

Caractères. — Tête petite et étroite, prolongée en museau en avant; épistome allongé, échancré en arc au sommet; cavités antennaires petites et situées contre le bord interne des yeux. — Antennes courtes, leurs articles médians un peu plus larges que les extrêmes; 1 en massue un peu renflée; 2 très court, obconique; 3 presque aussi long que 1; les suivants dilatés au côté interne, subtriangulaires et munis d'une fossette porifère inférieure. — Yeux médiocres, subovales et subparallèles, à peine rapprochés sur le vertex. — Pronotum large, plus ou moins convexe, déclive en avant, non caréné sur les bords avec un calus saillant et oblique dans l'angle postérieur; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian anguleux, la postérieure fortement bisinuée avec le lobe médian assez large et tronqué. — Ecusson variable, généralement semicirculaire. — Elytres larges, peu convexes, arrondis en arrière; les côtés postérieurs plus ou moins dentelés. — Prosternum plus ou moins convexe entre les hanches antérieures, sans saillie anguleuse au milieu du bord antérieur; son sommet arrondi. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes, transversales et sinueuses. — Métasternum profondément échancré en arc en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures subcontiguës, médiocrement dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la postérieure oblique. — Pattes médiocres; fémurs et tibias normaux; tarses assez robustes, leurs articles 1 et 2 plus longs que 3 et 4, tous les quatre bilobés et lamellés en dessous. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ largement et peu profondément échancré en arc, ♀ tronquée ou faiblement échancrée. — Corps assez robuste; taille grande ou moyenne; coloration très brillante, métallique et bigarrée de jaune sur les élytres.

Lacordaire n'a pas cru devoir maintenir ce genre, qui présente les principaux caractères des *Conognatha*, mais avec la marge antérieure du prosternum simple et tronquée, sans saillie anguleuse.

J'estime qu'il mérite d'être maintenu en raison de ce caractère et à cause des faciès multiples que présentent les espèces, faciès toujours différents des vrais *Conognatha*.

Distribution géographique des espèces. — Toutes les espèces de ce genre proviennent de l'Amérique du Sud, où elles représentent, avec celles du genre précédent, les *Stigmodera* de l'Australie.

1. *P. hamatifer*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 140, pl. 24, f. 138 (1841) (Brésil).
2. *P. Mac Leayi*, Donovan, Nat. Repos. Misc. Vol. 3, pl. 85, f. 1 (1825) (Brésil).
U-aurantiacus, Perty, Delic. Anim. p. 16, pl. 4, f. 1 (1830).
3. *P. vulneratus*, Perty, idem, f. 2 (Brésil).
carinatus, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 33 (1837).
granulatus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 139, pl. 24, f. 137 (1841).
4. *P. Lebasi*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 35 (1837) (Colombie).
5. *P. Souverbi*, Germain, An. Univ. Chile, p. 392 (1855) (Chili).
* *Souverbi*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 73, pl. 15, f. 3 (1858).
6. *P. parallelogrammus*, Perty, Delic. Anim. p. 16, pl. 4, f. 3 (1830) (Brésil).
7. *P. brevicollis*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. p. 175 (1866) (Bogota).
8. **P. flavipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 338 (1899) (Brésil).
9. *P. principalis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 64, pl. 15, f. 80 (1838) (Brésil).
punctifer, Castelnau & Gory, idem, p. 65, pl. 15, f. 81.
superbus, Castelnau & Gory, ibidem, p. 66, pl. 15, f. 82.
Klugi, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 137, pl. 24, f. 13 (1841).
10. *P. sanguinipennis*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 37 (1837) (Brésil).
Nero, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 63, pl. 14, f. 48 (1838).
11. *P. Sellovi*, Klug, Ent. Bras. p. 4 (1827) (Brésil).
* *Thoreyi*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 107 (1838).
fasciatus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 60, pl. 14, f. 73 (1838).
Curtisi, Castelnau & Gory, idem, p. 61, pl. 14, f. 75.
miles, Castelnau & Gory, ibidem, p. 62 (text. nec fig.).
12. **P. nigrocœruleus*, nov. sp. (1) (Montévidéo).
13. *P. militaris*, Saunders, Cat. Bupr. p. 64, n° 42 (1871) (Rio-Grande).
miles || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, pl. 44, f. 77 (1838) (fig. nec text.).
14. *P. propinquus*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 376 (1872) (Cordova).
15. **P. elongatus*, nov. sp. (2) (São Paulo).
16. **P. fascipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 339 (1899) (Paraguay).
17. *P. insignis*, Perty, Delic. Anim. p. 17, pl. 4, f. 6 (1830) (Minas-Geraes).
scmistriatus, Spix & Martius, Revis. Vol. 1, p. 407 (1832).
vetustus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 59, pl. 13, f. 72 (1838).
18. *P. subdilatatus*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 339, pl. 10, f. 18 (1869) (Brésil).
19. *P. parallelus*, Saunders, idem, p. 340, pl. 10, f. 19 (Brésil).
20. *P. comptus*, Perty, Del. Anim. p. 17, pl. 4, f. 7 (São Paulo).
nobilitatus, Perty, idem, table.
21. **P. Gounellei*, nov. sp. (3) (République Argentine).
22. **P. sagittarius*, Fairmaire, Rev. Zool. p. 484 (1856) (Chili).
* *hastarius*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 72, pl. 15, f. 21 (1858).

(1) Long. 24; larg. 9 mm. — Oblong, robuste, allongé, atténué en avant et arrondi en arrière; tête, pronotum, écusson, trois bandes élytrales et l'apex noirs. Dessous noir-bleuâtre, élytres brun-rouge. — Très voisin du *P. Sellovi* Klug, mais les côtés du pronotum plus obliquement atténués en ligne droite vers le sommet et l'impression médiane de la base mieux accusée, les stries élytrales un peu plus profondes et les interstries plus saillants, le corps relativement plus large. — Montévidéo.

(2) Long. 21; larg. 7 mm. — Oblong, allongé, atténué en avant et arrondi en arrière; tête et pronotum verts, le second avec une large tache discale bleu d'acier; écusson vert; élytres noir-bleuâtre avec la base jaune et une bande transversale prémédiane et une bande oblique préapicale de même nuance. Dessous bleu-verdâtre brillant. — Voisin du *P. propinquus* Burmeister, mais encore plus étroit, l'écusson plus allongé, les stries élytrales plus nettes et plus profondes, les interstries plus saillants, surtout en arrière, le dessin élytral différent; élytres bleu obscur avec trois étroites bandes jaunes, la première contre la base, n'atteignant pas les épaules et très déchiquetée sur le bord postérieur, la deuxième prémédiane, transversale, subsinueuse et touchant les bords et la troisième sinuose et située vers le quart postérieur. — Brésil: São Paulo.

(3) Long. 13; larg. 4, 5 mm. — Assez large, plus atténué en avant qu'en arrière, peu convexe, tête, pronotum et écusson noir verdâtre un peu glauque, élytres jaunes en avant et noirs en arrière avec une bande médiane sinuose jaune et une bande apicale de même, interrompues à la suture; le bord huméral et une étroite ligne circumscutellaire obscurs. Dessous bleu verdâtre brillant avec les trois derniers segments abdominaux bruns. — Faciès du *P. comptus*, Perty; différent de celui-ci, outre le dessin élytral et la coloration, par la dentelure marginale des élytres beaucoup plus accentuée et remontant jusqu'au delà du tiers postérieur. — Etat de Buenos Ayres: Itatiaya (2,400 m.)

23. **P. Bruchi*, nov. sp. (1) (République Argentine).
 24. *P. costipennis*, Germain, An. Univ. Chile, p. 392 (1855) (Chili).
 * *splendidicollis*, Fairmaire, Rev. Mag. Zool. p. 484 (1856).
 25. *P. Percheroni*, Guérin, Mag. Zool. Vol. 1, p. 10 (1831) (Brésil).
 26. *P. auricollis*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 34 (1837) (Brésil).
 27. *P. Edwardsi*, Lucas, Voy. Casteln. p. 64, pl. 3, f. 8 (Brésil).
 28. *P. rufipes*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 340, pl. 10, f. 20 (1869) (Brésil).
 29. **P. erratus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 627 (1867) (Chili).
 chiliensis || Fairmaire & Germain, idem, p. 733, pl. 15, f. 13 (1858).
 30. **P. consobrinus*, Fairmaire, Rev. Zool. p. 284 (1864) (Chili).
 31. **P. cyanicollis*, Fairmaire, idem, p. 283 (Chili).
 32. *P. excellens*, Klug, Ent. Bras. p. 3, pl. 40, f. 1 (Brésil).
 consimilis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 55, pl. 12, f. 66 (1838).
-
33. *P. Azarae*, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 246 (1860) Chili).
 monozona, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 115, pl. 6, f. 2 (1867).
 34. *P. Badeni*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 350, pl. 6, f. 1 (1872) (Nouveau-Fribourg).
 35. *P. chalybeiventris*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 73, pl. 15, f. 14 (1858) (Chili).
 36. *P. chiliensis*, Guérin, Voy. Duper. Vol. 2, p. 66 (1830) (Chili).
 viridiventris, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 492, pl. 12, f. 5 (1851).
 37. *P. octoguttata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 19, pl. 2, f. 3 (1882) (Mexique).
 38. *P. panamensis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 251, pl. 6, f. 3 (1872) (Panama).
 39. *P. Rogersi*, Saunders, idem, p. 250, pl. 5, f. 9 (Brésil).
 40. *P. Staudingeri*, Nonfried, Ent. Nachtr. p. 22 (1894) (Brésil).

3. GENUS CALODEMA, CASTELNAU & GORY

Calodema. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 70 (1838); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 60 (1857).

Caractères. — Tête petite et étroite, prolongée en museau en avant; épistome allongé et bilobé avec une faible échancrure médiane; cavités antennaires, petites, arrondies, situées contre le bord interne des yeux et surmontées d'une fossette à fond lisse. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; les articles dentés plus longs que larges, diminuant graduellement en longueur et en largeur du 4^e au dernier et munis d'une fossette porifère située sur la tranche interne. — Yeux grands, ovalaires, un peu obliques et sensiblement rapprochés sur le vertex. — Pronotum large, convexe sur le disque, légèrement creusé sur les côtés, les bords un peu relevés, bisinués en avant et en arrière. — Ecusson allongé, médiocre, subpentagonal, acuminé en arrière. — Elytres oblongo-elliptiques, convexes. — Prosternum avancé en avant en saillie aiguë; plan et trilobé en arrière. — Mésosternum divisé, ses branches latérales courtes, transversales et sinueuses. — Méta sternum échancré en arc au milieu pour l'insertion du lobe médian du sommet du prosternum. — Hanches postérieures contiguës, très obliques; leur marge antérieure onduleuse, la postérieure très oblique. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux; tarses postérieurs plus allongés que les autres; article 1 comprimé, du double plus long que 2; celui-ci comprimé; 3 plus court que 2 et échancré; 4 court, fortement bilobé, 5 très long, déprimé. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ profondément et largement échancré en arc, ♀ normale.

(1) Long. 17; larg. 6 mm. — *Facies et caractères du P. sagittarius*, Fairmaire, mais le dessin élytral différent et se rapprochant de celui du *P. costipennis*, Germain. Oblong ovale allongé, assez convexe, les côtés parallèles; tête, pronotum écusson et dessous vert émeraude obscur et brillant; élytres jaunes avec trois taches obscures et conjointes, au tiers antérieur, les deux externes triangulaires, la médiane en losange et commune aux deux élytres, une bande sinuée obscure au tiers antérieur et une tache préapicale large, cordiforme et commune aux deux élytres. — Tête rugueuse et densément ponctuée; pronotum assez large, convexe, arrondi en avant et droit sur les côtés en arrière avec trois impressions le long de la base, la ponctuation plus dense et plus irrégulière sur les côtés que sur le disque; élytres à stries ponctuées et régulières, très légèrement déprimées le long de la suture et au milieu, le sommet à peine dentelé. Dessous à ponctuation assez forte, mais peu dense sur l'abdomen. — République Argentine (Ch. Bruch).

Distribution géographique des espèces. — On connaît quatre espèces de ce superbe genre, dont une seule est relativement commune en Australie; l'autre, beaucoup plus rare, provient de la même île; une autre est propre aux îles Arou et la quatrième se trouve en nouvelle Guinée. Ces deux dernières ne sont représentées que par quelques exemplaires.

1. *C. regalis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 71, p. 16, f. 88 (1838) (Australie).
Kirbyi, Hope, Col. Man. Vol. 3, p. 173, pl. 1 (1840).

2. *C. plebeja*, Jordan, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 15, p. 220 (1895) (Queensland).
3. *C. Ribbei*, van de Poll, Notes Leyd. Mus. Vol. 7, p. 31, pl. 3, f. 5 (1885) (Iles Arou).
4. *C. Wallacci*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 78, pl. 2, f. 9 (1864) (Nouvelle-Guinée).
Johannae, Vollenhoven, Tijdschr. Ent. Vol. 8, pl. 1, f. 1-2 (1865).

4. GENUS METAXYMORPHA, PARRY

Metaxymorpha. Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 82 (1848).

Semnopharus. van de Poll, Notes Leyd. Mus. Vol. 8, p. 239 (1886).

Caractères. — Tête petite et étroite, prolongée en museau en avant; épistome allongé et bilobé avec une échancrure médiane; cavités antennaires petites, arrondies, situées près du bord interne des yeux et surmontées d'une fossette à fond lisse. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; les articles dentés presque aussi longs que larges, diminuant graduellement en longueur et en largeur et munis d'une fossette porifère située sur la tranche interne. — Yeux grands, saillants, ovalaires, obliques et sensiblement rapprochés sur le vertex. — Pronotum large, convexe, plus étroit en avant, obliquement arqué sur les côtés, la marge antérieure et la base bisinuées. — Écusson large, semi-elliptique, tronqué en avant et arrondi en arrière. — Elytres oblong-ovales, profondément striés; tridentés au sommet. — Prosternum avancé en avant en saillie aiguë; plan, trilobé et élargi en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales un peu convexes et arquées, la suture métasternale un peu oblique. — Métasternum échancré en arc au milieu pour l'insertion du lobe médian du prosternum. — Hanches postérieures dilatées au côté interne, les marges subparallèles au côté externe. — Pattes peu robustes; tibias et fémurs normaux; tarses postérieurs plus longs que les antérieurs et les médians, le premier article comprimé, plus long que les deux suivants réunis; 2 semblable à 1, mais plus court; les deux suivants bilobés. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ largement et peu profondément échancrée en arc.

Distribution géographique des espèces. — On connaît trois espèces de ce genre, dont deux australiennes et une des îles Arou.

1. **M. gloriosa*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 207 (1894) (Queensland).

2. *M. Grayi*, Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 82, pl. 11, f. 7 (1848) (Australie).
3. *M. apicalis*, van de Poll, Notes Leyd. Mus. Vol. 8, p. 240 (1886) (Iles Arou).

5. GENUS STIGMODERA, ESCHSCHOLTZ

Stigmodera. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1, p. 9 (1829); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 293, pl. 11, f. 19 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1 (1838); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 57 (1857).

Themognatha. Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 291, pl. 11, f. 18 (1833).

Castiarina. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Stigmodera*, p. 22 (1838).

Hypostigmodera. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 215 (1892).

Caractères. — Après avoir distrait les espèces des genres précédents d'une série de *Stigmoderines*, ayant les antennes dentées à partir du 4^{me} article, il reste une longue suite d'espèces australiennes très polymorphes mais offrant, avec peu de modifications, les caractères fondamentaux des genres précités et qui peuvent se résumer de la manière suivante :

Tête étroite, prolongée en museau en avant; épistome allongé; cavités antennaires petites, arrondies, situées près du bord interne des yeux et souvent surmontées d'une fossette à fond lisse. — Antennes variables, dentées à partir du 4^e article, le 3^e rarement égal au 2^e, en général plus long; les articles diminuant graduellement en largeur et en longueur à partir des médians et munis d'une fossette porifère inférieure. — Pronotum variable, le lobe médian de la base arrondi ou anguleux, jamais tronqué. — Ecusson variable, toujours petit. — Marge antérieure du prosternum tronquée et droite; prosternum plan ou très légèrement convexe, élargi en arrière; son sommet anguleux sur les côtés et largement arrondi au milieu. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes; les sutures métasternales droites ou un peu obliques. — Métasternum profondément échancré en arc pour l'insertion du lobe médian du sommet du prosternum. — Hanches postérieures un peu obliques et faiblement dilatées au côté interne. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias généralement normaux; premier article des tarses postérieurs plus long que le deuxième, mais jamais du double; le 2^e et le 3^e subégaux, le 4^e variable. — Extrémité du dernier segment abdominal ♂ souvent échancrée suivant un arc peu tendu.

Solier a donné le nom de *Themognatha* aux *Stigmodera* ayant un faciès robuste et le prolongement de l'épistome plus accusé que chez les vrais *Stigmodera*. Ceux-ci ont, en général, les élytres criblés de gros points enfoncés ou même d'excavations. Les espèces de ces deux sections ont les crochets des tarses fortement lobés ou même dentés à la base. Les *Castiarina* de Castelnau & Gory ont ces crochets simples et normaux. Quant au genre *Hypostigmodera* créé par M. Blackburn, il a été fondé pour une espèce (*variegata* Blackburn) ayant les antennes anormales chez le ♂, c'est-à-dire dentées des deux côtés. Ce caractère constitue une anomalie assez rare, et constatée seulement chez une espèce du genre *Megactenodes* (*unicolor* Castelnau et Gory), où il m'a paru insuffisant pour le séparer de ses congénères.

Distribution géographique des espèces. — On connaît plus de trois cent soixante espèces de ce genre à coloration généralement claire et variée, à élytres jaunes, orangées ou rouges à bandes ou à taches obscures, exclusivement propres à l'Australie et à quelques îles voisines. Il pourrait être subdivisé de la manière suivante :

1. — *Tibias normaux* 2.
— dilatés et tranchants sur le bord externe, la dilatation échancrée vers le milieu. a. *S. Duponti*.
2. — *Elytres striés ou à côtes longitudinales plus ou moins nettes* 3.
— criblés de gros points enfoncés ou d'excavations b. *STIGMODERA*.
3. — *Crochets des tarses lobés ou dentés à la base, souvent arqués dès leur naissance* . . . c. *THEMOGNATHA*.
— — — — — simples et normaux d. *CASTIARINA*.

A.

1. *S. Duponti*, Boisduval, Voy. Astrolabe, Col. Vol. 2, p. 60 (1835) (Australie).
Stevensi, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 8, pl. 1, f. 2 (1835).
tibialis, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 540 (1874).

B. STIGMODERA. ESCHSCHOLTZ

2. *S. Goryi*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pl. 1, f. 3 (1838) (Australie).
Curtisi, Hope, Bupr. p. 2 (1846).
3. *S. macularia*, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pl. 8, f. 2 (1805) (Australie).
cicatricosa, Dalman, Anal. Ent. p. 53 (1823).

4. *S. jacquinoti*, Boisduval, Voy. Astrol. Vol. 2, p. 67, pl. 7, f. 2 (1835) (Australie).
5. *S. cancellata*, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. p. 7, f. 2 (1805) (Australie).
Dejeania, Boisduval, Voy. Astrol. Col. p. 63 (1835).
Dejeani, Hope, Austral. Bupr. p. 7 (1836).
6. *S. Roei*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 24, pl. 2, f. 2 (1868) (Australie).
cancellata || Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 62 (1835).
Vescoi, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 6, pl. 2, f. 1 (1855).
7. *S. sanguinosa*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 210 (1846) (Swan River).
8. **S. gratiosa*, Chevrolat, Rev. Zool. p. 201 (1844) (Australie).
snaragdinea, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 283 (1846).

C. THEMOGNATHA, SOLIER

9. *S. obscuripennis*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 32 (1837) (Australie).
rugosipennis, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 11 (1857).
10. *S. Mniszechi*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 460, pl. 9, f. 1 (1868) (Swan River).
11. **S. apicerubra*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 314 (1900) (Australie).
12. *S. grandis*, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pl. 2, f. 1 (1805) (Australie).
13. *S. flavocincta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 6, pl. 1, f. 2 (1838) (Australie).
14. *S. pubicollis*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 539 (1874) (Australie occidentale).
lateritia, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 30 (1879).
15. *S. Parryi*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 210 (1846) (Australie).
fusca, Saunders, Cat. Bupr. p. 66, n° 12 (1871).
16. *S. parvicollis*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 1, pl. 1, f. 1 (1869) (Australie).
major, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 539 (1874).
* *picca*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 40 (1890).
17. *S. heros*, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 7, pl. 1, f. 3 (1855) (Swan Riv.).
18. *S. Reichi*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 13, pl. 3, f. 10 (1838) (Australie).
fuverea, White, Ann. Nat. Hist. Vol. 12, p. 344 (1843).
19. *S. Bonvouloiri*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Vol. 9, p. 460, pl. 9, f. 2 (1868) (Australie).
20. *S. chalcodera*, Thomson, Typ. Bupr. p. 52 (1878) (Australie).
21. *S. Mitchelli*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 209 (1846) (Australie).
Stricklandi, Hope, idem, p. 220.
Daphnis, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 112 (1857).
* *tasmanica*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 42 (1890).
22. *S. Brucki*, Thomson, Typ. Bupr. p. 53 (1878) (Australie).
23. *S. Murrayi*, Gemminger & Harold, Cat. Coleopt. Vol. 5, p. 1401 (1869) (Kings Strait).
trifasciata || Murray, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 254, pl. 4, f. 2 (1852).
imperatrix, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 14 (1879).
24. *S. Chevrolati*, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 10, pl. 1, f. 1 (1855) (Australie).
imperatrix, White, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 290 (1859).
imperator, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 14 (1879).
25. *S. haematica*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 210 (1846) (Australie).
26. *S. variabilis*, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pl. 7, f. 1 (1805) (Australie).
Kingi, Mac Leay, King's Surv. Vol. 2, p. 411 (1827).
nigripennis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 15, pl. 3, f. 12 (1838).
unifasciata, Castelnau & Gory, idem, p. 20, pl. 4, f. 19.
27. *S. sanguinipennis*, Castelnau & Gory, ibidem, p. 16, pl. 3, f. 13 (Australie).
28. *S. sanguiniventris*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 465, pl. 9, f. 12 (1868) (Australie).
29. **S. pictiventris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 314 (1900) (Australie).
30. *S. limbata*, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pl. 8, f. 4 (1805) (Australie).
31. **S. cincticollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 134 (1898) (Australie).
32. *S. sanguineocincta*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 461, pl. 9, f. 3 (1868) (Australie).
33. **S. sincera*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 136 (1898) (Australie).
34. **S. cyaniventris*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 315 (1900) (Australie).
35. *S. sanguinea*, Saunders, Ins. Saundersiana, Vol. 3, p. 4, pl. 1, f. 5 (1869) (Australie).
36. **S. aestimata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 135 (1898) (Australie).

37. *S. thoracica*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 464, pl. 9, f. 11 (1868) (Australie).
atalanta, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5). Vol. 9, p. 79 (1879).
38. **S. clara*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 313 (1900) (Australie).
39. *S. Westwoodi*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 464, pl. 9, f. 10 (1868) (Austr. sept.).
40. *S. vitticollis*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 30 (1863) (Port Denison).
41. *S. Fortnumi*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 102 (1846) (Adelaïde).
42. *S. conspicillata*, White, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 12, p. 344 (1843) (Swan River).
signaticollis, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 290 (1846).
cyanura, Hope, idem, p. 211.
43. *S. delia*, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 124 (1879) (Port Denison).
* *fallaciosa*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 41 (1890).
44. *S. Mac Farlani*, Waterhouse, Ann. Nat. Hist. (5), Vol. 7, p. 463 (1881) (Déroit de Torres).
45. *S. Duboulayi*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 253, pl. 6, f. 5 (Nicol. Bay).
46. *S. Spencei*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 13, pl. 3, f. 9 (1838) (Australie).
egregia, Boheman, Eug. Res. Ent. p. 60 (1858).
sternoceroides, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 13 (1879).
47. *S. similis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 463, pl. 9, f. 7 (1868) (Queensland).
48. *S. suturalis*, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pl. 8, f. 5 (1805) (Australie).
vertebralis, Boisdual, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 66 (1835).
49. *S. carpentariae*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 53 (1892) (Queensland).
50. *S. affinis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 461, pl. 9, f. 4 (1868) (Nouv.-Galles du Sud).
limbata || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 36, pl. 3, f. 14 (1838).
adelpha, Thomson, Typ. Bupr. p. 52, (1878).
51. *S. Donovanii*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. p. 17, pl. 4, f. 15 (Australie).
52. *S. viridicincta*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 540 (1874) (Australie occidentale).
53. *S. pictipes*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 140 (1894) (Australie occidentale).
54. *S. Wimmerae*, Blackburn, idem, p. 151 (1890) (Victoria).
55. **S. Caroli*, Blackburn, ibidem, p. 141 (1894) (Australie occidentale).
capucina || Blackburn, idem, p. 216 (1892).
56. *S. oleata*, Blackburn, ibidem, p. 142 (1894) (Australie occidentale).
57. *S. maculiventris*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 32 (1863) (Rockhampton).
58. *S. rubricauda*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 252 (1872) (Queensland).
59. *S. Yarelli*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 14, pl. 3, f. 11 (1838) (Queensland).
flavipennis, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 11, pl. 2, f. 3 (1855).
elegans, Gehin, idem, p. 12, pl. 1, fol. 4.
60. **S. praececellens*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 140 (1890) (Victoria).
Freuchi, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 150 (1890).
61. *S. flavomarginata*, Gemminger & Harold, Cat. Col. Vol. 5, p. 1400 (1869) (Australie).
cruentata || Murray, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 253, pl. 4, f. 1 (1852).
62. *S. Saundersi*, Waterhouse, Ann. Nat. Hist. (4), Vol. 17, p. 70 (1876) (Nouvelles Galles du Sud).
obesissima, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 32 (1879).
63. *S. bifasciata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 463, pl. 9, f. 8 (1868) (Swan River).

D. CASTIARINA, CASTELNAU & GORY

α

64. *S. flavicollis*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 3, pl. 1, f. 4 (1869) (Australie).
65. *S. uncinata*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 252 pl. 6, f. 7 (1872) (Australie occidentale).
66. *S. Castelnaudi*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 9, pl. 1, f. 13 (1869) (Australie).
Thomsoniana Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 12.
Laforesti, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 42 (1890).
67. *S. marginicollis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Vol. 9, p. 469, pl. 10, f. 21 (1868) (Australie).
68. *S. erythromelas*, Boisdual, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 75, pl. 6, f. 7 (1835) (Australie).
69. *S. cyanipes*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 468, pl. 9, f. 20 (1868) (Australie).
70. **S. fascigera*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 42 (1890) (Australie).
71. *S. gibbicollis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 470, pl. 10, f. 22 (1868) (Adelaïde).
grata, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 11, pl. 1, f. 15 (1869).

72. *S. subgrata*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 157 (1899) (Australie).
* *campestris* || Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 139 (1898).
73. *S. terrae reginae*, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. p. 295 (1893) (Queensland).
* *triangulosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 147 (1898).
74. *S. guttaticollis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 158 (1890) (Queensland).
minor, Blackburn, idem, p. 158.
* *consularis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 149 (1900).
75. *S. Pertyi*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 23, pl. 5, f. 22 (1868) (Australie).
v. mima, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. p. 9, f. 479, pl. 10, f. 42 (1868).
76. **S. cupida*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 138 (1894) (Nouvelles Galles du Sud).
77. *S. costipennis*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 13, pl. 2, f. 18 (1869) (Australie).
78. **S. humeralis*, nov. sp. (1) (Nouvelles Galles du Sud).
79. *S. octospilota*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 28, pl. 6, f. 19 (1838) (Australie).
femorata, Castelnau & Gory, idem, p. 37, pl. 8, f. 42,
adelaidae, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 212 (1846).
rufipes, Mac Lay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 23 (1863).
80. *S. cincta*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 157 (1890) (Australie).
* *rubrocincta* || Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 46 (1890).
81. *S. decemmaculata*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 456, pl. 23, f. 3 (1818) (Australie).
82. *S. tricolor*, Kirby, idem, p. 455 (Australie).
curta, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 467, pl. 9, f. 16 (1868).
83. **S. opima*, nov. sp. (2) (Australie).
84. *S. pallidiventris*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 42, pl. 9, f. 50 (1838) (Australie).
85. **S. diversa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 317 (1900) (Australie).
86. **S. laetabilis*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 153 (1898) (Australie).
87. **S. rustica*, Kerremans, ibidem, p. 154 (Australie).
88. **S. inaequalis*, nov. sp. (3) (Nouvelles Galles du Sud).
89. *S. picta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 46, pl. 10, f. 55 (1838) (Australie).
purpurea, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 213 (1856).
90. *S. flava*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 17, pl. 2, f. 25 (1869) (Australie).
flavidula, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 47 (1890).
91. *S. testacea*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 14, pl. 2, f. 20 (1869) (Victoria).
92. *S. mustelamajor*, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 115 (1857) (Australie).
gibbosa, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 26 (1863).

β

93. **S. speciosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 136 (1898) (Australie).
94. *S. elongata*, Saunders, Jour. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 480, pl. 10, f. 46 (Swan River).
95. **S. observans*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 139 (1898) (Australie).
96. *S. semicincta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 4, f. 17 (1838) (Australie).
97. *S. variopicta*, Thomson, Typ. Bupr. p. 54 (1878) (Australie).
98. **S. cognata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 136 (1898) (Australie).
99. *S. robusta*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 6, pl. 1, f. 8 (1869) (Australie méridionale).

(1) Long. 10.2-12; larg. 3.2-3.5 mm. — Allongé, peu convexe, arrondi en avant et subacuminé en arrière, bronzé obscur très brillant en dessous et sur la tête et le pronotum, ce dernier bordé de jaune, la nuance jaune s'étendant en dessous sur tout l'épisternum prothoracique; élytres jaunes avec la suture largement et inégalement bordée de noir; une ligne sinuée noire et allongée allant de la base au tiers antérieur près du bord interne du calus huméral et contre celui-ci; une tache transversale au tiers supérieur plus ou moins réunie à la bande suturale; la région apicale noire avec une petite tache jaune. — Tête creusée et finement pointillée; pronotum convexe en avant, légèrement dilaté au milieu sur les côtés; élytres striés de points, les stries plus profondes en arrière, le sommet avec une très petite échancrure oblique et suturale, villosité du dessous grise, courte et dense. — Nouvelle Galles du Sud.

(2) Long. 11 larg.; 4 mm. — Très voisin du *S. tricolor* Kirby, qui précède; peut-être une variété de celui-ci; tête et pronotum bronze vert d'être brillant, à ponctuation un peu plus épaisse et plus dense; dessin élytral semblable mais moins onduleux et plus raide, les interstries plus rugueux et plus grossièrement ponctués. Dessous vert clair et garni d'une villosité grise assez dense; épisternum prothoracique jaune, la nuance jaune s'étendant en dessus le long du bord du pronotum; coloration élytrale à reflets plus violets. — Australie.

(3) Long. 9-10; larg. 2.7-3.2 mm. — Allongé, peu convexe, arrondi en avant et subacuminé en arrière, tête et pronotum pourpre violacé brillant, la première avec une tache frontale jaune, le second avec une bordure de même; élytres noir bleuâtre avec une tache arrondie à la base, une tache épipleurale, une tache transversale prémédiane; une tache arquée au tiers postérieur et une petite tache préapicale, le tout jaune. Dessous jaune avec quelques lignes et taches obscures, bleu d'acier à reflets pourpres, comme les pattes. — Assez voisin du *S. picta* Castelnau & Gory, qui suit, et dont il a le faciès, la coloration du dessus différente, sans reflets pourpres sur les élytres, la forme des taches différente, celles-ci moins développées. — Tête à peine creusée; pronotum finement ou densément ponctué, striés élytrales plus profondes en arrière qu'en avant, les interstries à ponctuation excessivement fine, à peine sensible. — Nouvelles Galles du Sud.

100. *S. binotata*, Saunders, Cat. Bupr. p. 72, n° 139 (1871) (Australie).
bimaculata, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 7, pl. 1, f. 9 (1869).
101. *S. Bremei*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 102 (1845) (Australie).
102. *S. Julia*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 31 (1879) (Australie).
103. *S. carminea*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 474, pl. 10, f. 32 (1868) (N.G. du Sud).
104. *S. Thomsoni*, Saunders, idem, p. 477, pl. 10, f. 38 (Australie).
105. **S. Fairmairei*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 140 (1898) (Australie).
106. *S. dulcis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 215 (1892) (Australie).
* *colorata* || Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 141 (1898).
107. *S. Klugi*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 27, pl. 6, f. 28 (1838) (Australie).
108. *S. cupricollis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 470, pl. 10, f. 23 (1868) (Australie).
109. *S. alterzona*, Thomson, Typ. Bupr. p. 54 (1878) (Australie).
110. *S. cruenta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pl. 6, f. 30 (1838) (Australie).
111. *S. Hoffmannseggii*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 211 (1846) (Swan River).
112. *S. Kirbyi*, Guérin, Voy. Coquille, p. 65 (1836) (Australie).
vivida, Hope, Austral. Bupr. p. 5 (1836).
113. *S. australasiae*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 32, pl. 7, f. 35 (1838) (Swan River).
simulata, Hope, Austral. Bupr. p. 3 (1836).
114. *S. inconspicua*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 476, pl. 10, f. 37 (1868) (Australie).
115. **S. affabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 141 (1898) (Australie).
116. *S. cara*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 216 (1892) (Queensland).
* *placens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 139 (1898).
117. *S. cupreoflava*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 10, pl. 1, f. 14 (1869) (Australie méridionale).
118. *S. trifasciata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 38, pl. 8, f. 43 (1838) (Australie).
asphicalis, Castelnau & Gory, idem, p. 43, pl. 9, f. 51.
119. *S. rectifasciata*, Saunders, Jour. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 472, pl. 10, f. 26 (1868) (Australie).
120. **S. maculifer*, nov. sp. (1) (Nouvelles Galles du Sud).
121. *S. delectabilis*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 284 (1846) (Australie).
122. **S. vigilans*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 146 (1898) (Australie).
123. *S. bicincta*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. p. 89 (1835) (Australie).
bicingulata, Castelnau et Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 30, pl. 6, f. 32 (1838).
Dejeani, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, errata (1841).
* *trispinosa*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 43 (1890).
124. *S. vicina*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 43, pl. 3, f. 15 (1868) (Nouvelles Galles du Sud).
bicincta, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 31, pl. 6, f. 33 (1838).
125. **S. obsepta*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 44 (1890) (Queensland).
126. **S. baliola*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 144 (1898) (Australie).
127. **S. cordifer*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 44 (1890) (Australie occidentale).
128. **S. deleta*, nov. sp. (2) (Australie).
129. *S. uniformis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 145 (1898) (Australie).
130. **S. verax*, Kerremans, idem, p. 146 (Australie).
131. **S. inermis*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 45 (1890) (Australie).
132. **S. nova*, nov. sp. (3) (Australie).

(1) Long. 13,5; larg. 5 mm. — *Faciès* du *S. affabilis*, Kerremans, tête et pronotum vert doré un peu obscur; élytres bleu foncé brillant avec une tache allongée et oblique à la base, cette tache rejoignant, sur le bord, une bande transversale et médiane, interrompue à la suture; une troisième tache arquée et préapicale, le tout jaune. Dessous vert doré un peu obscur, de la nuance de la tête et du pronotum; abdomen jaune sauve. — Tête ponctuée, longitudinalement sillonnée; pronotum plus grossièrement ponctué que la tête, avec une fossette préscutellaire; élytres striés, les stries plus profondes en arrière qu'en avant, les interstries à peine visiblement ponctués, le sommet arrondi avec une très petite échancrure suturale et oblique. Dessous couvert d'une courte villosité gris blanchâtre. — Nouvelles Galles du Sud.

(2) Long. 10; larg. 3,5 mm. — *Étroit, allongé, atténué en avant et en arrière; tête, pronotum et écusson vert brillant obscur à légers reflets irisés; élytres jaune sauve clair avec la suture et le sommet noirs; une tache de même au tiers postérieur, un peu oblique, touchant le bord externe et n'atteignant pas la suture. Dessous bleu verdâtre brillant et clair, couvert d'une courte villosité grise. — Tête creusée longitudinalement; pronotum assez convexe, ses côtés arrondis et ses angles postérieurs abaissés et aigus; écusson assez grand, triangulaire; élytres à stries nettes, les interstries finement pointillés, le sommet tronqué entre deux dents, la dent externe plus longue et plus aiguë que la suturale. Dessous finement et densément ponctué; villosité assez longue et dense. — Australie.*

(3) Long. 13; larg. 5 mm. — *Elliptique, atténué en avant et en arrière, tête, pronotum et écusson noir verdâtre brillant, élytres jaunes jusqu'après le milieu, ensuite noir verdâtre avec une large tache préapicale, arquée et jaune, interrompue à la suture. Dessous noir verdâtre brillant à villosité grise. — Faciès* des espèces du groupe *Andersoni*, Castelnau & Gory; tête sillonnée; pronotum avec une vague ligne médiane lisse; élytres à stries fines et assez rapprochées, le sommet obliquement échancré vers la suture, la dent suturale courte et obtuse, l'externe acuminée. Dessous finement et densément ponctué et couvert d'une villosité assez dense, d'un gris blanchâtre. — Nouvelles Galles du Sud.

133. *S. Mastersi*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 245 (1882) (Gayndah).
 134. **S. scutellaris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 316 (1900) (Australie).
 135. *S. Andersoni*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 25, pl. 5, f. 25 (1838) (Moreton Bay).
 136. **S. terminalis*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 45 (1890) (Australie).
 137. **S. deliciosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 145, (1898) (Australie).
 138. **S. subcostata*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 316 (1900) (Australie).
 139. *S. Skusei*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 46 (1892) (Nouvelles-Galles du Sud).
 * *laudabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 153 (1898).
 140. ****S. libens***, nov. sp. (1) (Australie).
 141. *S. recta*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 23, pl. 2, f. 35 (1869) (Adelaïde).
 142. *S. bella*, Saunders, Cat. Bupr. p. 71, n° 123 (1871) (Australie).
 cruentata || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pl. 6, f. 31 (1838).
 143. *S. crenata*, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pl. 7, f. 7 (1805) (Australie).
 flacida, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 33 (1879).
 144. ****S. variata***, nov. sp. (2) (Australie).
 145. **S. gentilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 316 (1900) (Australie).
 146. **S. litigiosa*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 45 (1890) (Australie).
 147. ****S. deceptor***, nov. sp. (3) (Australie).
 148. **S. producta*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 482, pl. 10, f. 50 (1868) (Australie).
 acutipennis, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 38 (1879).
 149. *S. spectabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 315 (1900) (Australie).
 150. ****S. delicatula***, nov. sp. (4) (Nouvelles-Galles du Sud, Australie).
 151. **S. caudata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 316 (1900) (Australie).
 152. ****S. obliqua***, nov. sp. (5) (Nouvelles-Galles du Sud).
 153. ****S. sulcicollis***, nov. sp. (6) (Nouvelles-Galles du Sud).
 154. **S. acuminata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 142 (1898) (Australie).
- ~
155. *S. simulata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pl. 5, f. 27 (1838) (Australie).
 Helenat, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 215 (1846).
 distinguenda, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 34 (1879).
 Laïs, Thomson, idem, p. 33.
 Phryne, Thomson, idem, p. 33.
 fraterna, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 30, p. 46 (1890).
 156. *S. crux*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 473, pl. 10, f. 29 (1868) (Australie).
 157. *S. Burchelli*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 33, pl. 7, f. 2 (1838) (Australie).
 perplexa, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 211 (1846).
 lanuginosa, Hope, idem, p. 215.
 158. *S. Fekeli*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 462, pl. 9, f. 6 (1868) (Australie).

(1) Long. 11-12; larg. 3,7-4 mm. — *Ovale, légèrement élargi au tiers supérieur, tête et pronotum noir verdâtre brillant; élytres bleu foncé verdâtre avec une tache arrondie discale, une bande arquée oblique et subhumérale, interrompue à la suture, une petite tache arquée, le tout jaune, la dernière rougeâtre extérieurement, l'apex rouge vif, l'extrémité bleu foncé verdâtre. Dessous bronzé doré verdâtre clair; pattes bleues ou bleu verdâtre. — Stries élytrales profondes, les interstries saillants en arrière. — Nouvelles-Galles du Sud.*

(2) Long. 9; larg. 3 mm. — *Voisin du S. crenata, Donovan, mais plus brillant, moins mat en dessus, moins robuste mais un peu plus élargi au tiers postérieur, la coloration du dessus et le dessin à peu près semblables, la bande noire antérieure divisée suivant trois taches et non continues; le dessous d'un vert clair plus franc. — Nouvelles-Galles du Sud.*

(3) Long. 12; larg. 4 mm. — *Diffère du S. producta, Saunders, avec lequel il a beaucoup d'affinités, par la forme plus parallèle; moins acuminée au sommet, les côtés du pronotum moins arrondis, droits en arrière, le sillon médian réduit à une mince ligne antéscutellaire, la tache jaune de la base non réunie à la médiane, l'apicale plus étroite, les interstries plus étroites. — Australie.*

(4) Long. 12; larg. 4 mm. — *Egalement voisin du S. producta, Saunders et du S. deceptor qui précèdent; tête et pronotum noir verdâtre très brillant; élytres noir bleuâtre avec trois taches jaunes, la première arrondie, au milieu de la base, la deuxième, un peu plus grande et prémédiane, elliptique, la troisième préapicale, arquée, rouge au côté externe. Dessous vert brillant; pattes bleues. — Front sillonné longitudinalement; pronotum uni, convexe, finement pointillé, sans sillon médian ni impressions latérales; taches élytrales nettes, bien séparées; sommet des élytres très acuminé. — Nouvelles-Galles du Sud.*

(5) Long. 7-9; larg. 2-2,5 mm. — *Plus petit et moins robuste que les précédents, le dessin élytral entièrement différent; tête et pronotum vert brillant; élytres bleu avec une tache basilaire, une tache prémédiane, discale et oblique, une troisième tache linéaire et oblique, au tiers postérieur, ces trois taches jaunes et deux taches rouge vif, l'une dans le repli épipleural, l'autre vers le sommet, contre le bord. Dessous vert brillant; pattes bleues. Pronotum non sillonné au milieu, avec trois fossettes à la base, une médiane et deux latérales. — Nouvelles-Galles du Sud.*

(6) Long. 11; larg. 3,8 mm. — *Voisin du S. producta, Saunders, par le faciès, mais relativement moins acuminé en arrière, le sillon médian du pronotum semblable, les côtés de ce dernier moins arqués en arrière, plus droits, la tache discale jaune des élytres plus large, la préapicale plus amincie et plus arquée. — Tête, pronotum écusson et dessous vert brillant; élytres noir verdâtre avec les épaules nuancées de rouge vif, une grande tache discale jaune, couvrant le disque depuis la base jusqu'au milieu, et une tache préapicale arquée rouge contre le bord externe et jaune vers la suture, qu'elle n'atteint pas. — Nouvelles-Galles du Sud.*

159. *S. indistincta*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 11, pl. 2, f. 16 (1869) (Nouvelles-Galles du Sud).
 160. *S. octomaculata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 472, pl. 10, f. 27 (1868) (Adelaïde).
 161. *S. abdominalis*, Saunders, idem, p. 467, pl. 9, f. 17 (Australie).
 162. *S. fulviventris*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 22 (1863) (Port Denison).
 163. **S. unica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 150 (1898) (Australie).
 164. *S. undulata*, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pl. 7, f. 5 (1805) (Adelaïde).
 Laportei, Boheman, Res. Eugen. Ent. p. 61 (1858).
 165. *S. anchoralis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pl. 5, f. 26 (1838) (Australie).
 166. *S. costata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 470, pl. 19, f. 24 (1868) (Nouv. Gall. du S.).
 167. *S. jospilota*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 35, pl. 7, f. 39 (1838) (Australie).
 168. *S. Wilsoni*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 476, pl. 10, f. 36 (1868) (Australie).
 169. *S. flavopicta*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 92 (1835) (Australie).
 bicolor, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 39, pl. 8, f. 45 (1838).
 colorata, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 283 (1846).
 170. **S. agrestis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 140 (1898) (Australie).
 171. *S. scalaris*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 89 (1835) (Australie).
 crucigera, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 40, pl. 9, f. 47 (1838).
 * *prudens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 152 (1898).
 172. **S. puerilis*, Kerremans, idem, p. 147 (Australie).
 173. **S. victoriensis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 42, p. 152 (1890) (Australie).
 * *sensitiva*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 148 (1898).
 174. **S. sigma*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 43 (1890) (Australie).
 175. *S. versicolor*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 2, p. 42, pl. 9, f. 49 (1838) (Australie).
 decemguttata, Gory, Mon. Bupr. Vol. 4, p. 132, pl. 23, f. 131 (1841).
 176. ***S. signata**, nov. sp. (1) (Nouvelles-Galles du Sud).
 177. ***S. simplex**, nov. sp. (2) (Nouvelles-Galles du Sud).
 178. **S. timida*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 147 (1898) (Australie).
 179. **S. violacea*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 23 (1863) (Port-Denison).
 180. *S. spilota*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 24, pl. 5, f. 24 (1838) (Australie).
 septemmaculata, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 98 (1838).
 181. *S. atricollis*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 22, pl. 2, f. 33 (1869) (Australie méridionale).
 182. *S. piliventris*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 471, pl. 10, f. 25 (1868) (Queensland).
 183. ***S. suavis**, nov. sp. (3) (Australie).
 184. *S. cyanicollis*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 91 (1835) (Australie).
 subirifasciata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 41, pl. 9, f. 48 (1838).
 media, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 284 (1846).
 185. *S. rubrocincta*, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 13, pl. 1, f. 5 (1855) (Australie).
 186. *S. plagiata*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 152, p. 23, f. 130 (Australie).
 crenata || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 39, pl. 9, f. 46 (1838).
 sexplagiata, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, *in. tab.* (1841).
 bicruciat, Hope, Syn. Austr. Bupr. p. 3 (1836).
 Hopei, Boheman, Eugen. Res. Ent. p. 61 (1858).
 similata, Boheman, idem, p. 62.
 187. *S. vegeta*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 283 (1846) (Australie).
 188. *S. Hopei*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 39, pl. 3, f. 7 (1868) (Swan River).
 Burchelli || Hope, Bupr. p. 3 (1836).
 189. **S. tacita*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 153 (1898) (Australie).

(1) Long. 11; larg. 3,5 mm. — Oblong, allongé, atténué en avant et en arrière; tête verte; pronotum pourpre cuivreux étroitement bordé de jaune de chaque côté; écusson vert; élytres vert obscur avec une large tache basilaire arquée en arrière et prolongée sur les côtés le long de l'épiplèvre, une bande médiane interrompue à la suture et un peu abaissée sur les côtés et une bande au tiers postérieur, arquée et interrompue à la suture, prolongée sur les côtés jusque vers le sommet. Sternum jaune, abdomen vert clair varié de jaune; pattes vertes. — Nouvelle-Galles du Sud.

(2) Long. 11 larg. 4 mm. — Tête et pronotum bronzé verdâtre obscur; élytres bleus avec trois bandes jaunes interrompues à la suture. Dessous bleu foncé brillant. — Tête impressionnée longitudinalement; pronotum convexe, grossièrement et densément ponctué, avec une fossette précutellaire; élytres striés et ponctués avec les interstries convexes et finement pointillés, le sommet bidenté de part et d'autre avec une étroite échancrure arquée. Dessous pointillé et couvert d'une très courte villosité grise, peu dense. — Nouvelles-Galles du Sud.

(3) Long. 10,5; larg. 4 mm. — Tête et pronotum noir bleuâtre avec un léger reflet cuivreux; élytres jaunes avec trois taches sur la partie antérieure, dont la médiane commune aux deux élytres, une bande sinuée au tiers postérieur et une tache arrondie, commune aux deux élytres en avant et étalée contre le bord en arrière à l'apex, le tout bleu. Dessous bleu brillant. — Voisin du *S. atricollis*, Saunders et du *S. piliventris*, du même auteur, le corps plus large que celui du premier, la coloration différente, la disposition du dessin élytral à peu près semblable, mais les stries élytrales plus saillantes, le sommet des élytres plus largement échancré. — Australie.

190. *S. cylindracea*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 476, pl. 10, f. 35 (1868) (N. Galles du S.).
191. *S. amphichroa*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. p. 20 (1835) (Australie).
sexspilota, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 35, pl. 8, f. 40 (1838).
Sieboldi, Castelnau & Gory, idem, p. 38, pl. 8, f. 44.
192. **S. bucolica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 152 (1898) (Australie).
193. **S. felix*, Kerremans, idem, p. 142 (Australie).
194. **S. colligens*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 44 (1890) (Queensland).
195. **S. disjecta*, Kerremans, idem, p. 48 (Australie).
196. **S. generosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 150 (1898) (Australie).
197. *S. punctatosulcata*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 24, pl. 2, f. 37 (1869) (Australie).
198. *S. alternecostata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 35 (1879) (Australie).
 * *alacris*, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 47 (1890).
199. *S. rotundata*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 19, pl. 2, f. 28 (1869) (Australie septentrionale).
200. **S. atrocærulea*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 47 (1890) (Australie).
201. **S. electa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 154 (1898) (Australie).
202. **S. tripartita*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 317 (1900) (Australie).
203. *S. hilaris*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 213 (1846) (Port Philippe).
204. *S. sexguttata*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 29 (1863) (Port Denison).
puella, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 25, pl. 2, f. 38 (1869).
205. *S. crocicolor*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 44, pl. 10, f. 53 (1838) (Australie).
206. *S. cruentata*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 455, pl. 23, f. 1 (1818) (Australie).
neologa, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 35 (1879).
207. *S. coerulea*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 146 (1892) (Queensland).
 * *coelestis* || Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 48 (1890).
208. *S. Kerremansi*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 147 (1890) (Australie).
 * *apicalis* || Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 45 (1890).
- 208a. *S. ocelligera*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 133, pl. 23, f. 132 (1841) (Australie).
209. *S. quinquepunctata*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 541 (1874) (Australie occidentale).
210. *S. sanguinolenta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 45, pl. 10, f. 54 (Australie).
211. *S. punctatissima*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 24, pl. 2, f. 36 (1869) (Australie).
212. *S. lilliputana*, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 114 (1857) (Australie).
 * *ocularis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 155 (1898).
213. **S. confinis*, Kerremans, idem, p. 151 (Australie).
214. **S. mansueta*, Kerremans, ibidem, p. 155 (Australie).
215. *S. parva*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 26, pl. 2, f. 40 (1869) (Australie méridionale).
216. *S. xanthospilota*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 283 (1846) (Adelaïde).
splendida, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 14, pl. 2, f. 5 (1855).
parallela, White, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 119, p. 59, f. 3.
217. *S. elongatula*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 246 (1872) (Gayndah).
218. *S. vittata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 478, pl. 10, f. 40 (1868) (Adelaïde).
219. *S. auricollis*, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 114 (1857) (Australie).
ochreicentris, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 8, pl. 1, f. 11 (1869).
220. *S. straminea*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 25 (1863) (Port Denison).
221. *S. binotata*, Saunders, Cat. Bupr. p. 72, n° 139 (1871) (Australie).
bimaculata || Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 7, pl. 1, f. 9 (1869).
222. *S. luteipennis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 130, pl. 22, f. 128 (1841) (Australie).
223. *S. pallidipennis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 154 (1890) (Australie),
 * *addenda*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 142 (1892).
224. *S. amplipennis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 480, pl. 10, f. 44 (1868) (Australie).
225. *S. rufipennis*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 456 (1818) (Australie).
crocipennis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 21, pl. 4, f. 20 (1838).
226. *S. parallela*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 16, pl. 2, f. 24 (1869) (Australie).
crocipennis, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 292 (1846).
227. *S. erythroptera*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 88 (1835) (Australie).
228. *S. balteata*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 16, pl. 2, f. 23 (1869) (Australie).
postica, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 37 (1879).

229. *S. impressicollis*, Mac Leay, Trans. Linn. N. S. Wales, Vol. 1, p. 32 (1863) (Australie).
 230. **S. nanula*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 48 (1890) (Australie).
 231. *S. Spinolae*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 129, pl. 22, f. 127 (1841) (Australie).
 232. *S. nasuta*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 15, pl. 2, f. 22 (Australie).
- 6
233. *S. decipiens*, Westwood, Mag. Zool. Bot. Vol. 1, p. 253, pl. 7, f. 2 (Australie).
 capucina, Thomson, Rev. Mag. Zool. p. 116, pl. 6, f. 3 (1856).
 tricarinata, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 29 (1863).
-
234. *S. acuticeps*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 19, pl. 2, f. 29 (1869) (Swan River).
 235. *S. addenda*, Thomson, Typ. Bupr. p. 52 (1878) (Australie).
 236. *S. aeneicornis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 472, pl. 19, f. 28 (1868) (N. Galles du S.).
 237. *S. Alcyone*, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 77 (1879) (Australie).
 238. *S. alternata*, Lumholtz, Am. Cannib. p. 197 et 220 (1889) (Queensland).
 239. *S. amabilis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 4, f. 18 (1838) (Australie).
 240. *S. analis*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 7, pl. 1, f. 10 (1869) (Moreton Bay).
 241. *S. arborifera*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 51 (1899) (Australie).
 242. *S. armata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 31 (1879) (Sidney).
 243. *S. assimilis*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 212 (1846) (Port Philippe).
 244. *S. atronotata*, Waterhouse, idem, p. 542 (1874) (Australie occidentale).
 245. *S. audax*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 5, pl. 1, f. 7 (1869) (Australie).
 246. *S. avuncularis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 30 (1879) (Australie).
 247. *S. biguttata*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 24 (1863) (Australie).
 248. *S. bimaculata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 481, pl. 10, f. 48 (1868) (Australie).
 249. *S. brutella*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 37 (1879) (Australie).
 250. *S. campestris*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 21, p. 31 (1897) (Queensland).
 251. *S. canaliculata*, Blackburn, idem, p. 51 (1892) (Queensland).
 252. *S. carinata*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 26 (1863) (Australie).
 253. *S. Chobauti*, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 328 (1895) (Australie).
 254. *S. cinnamomea*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 25 (1863) (Port Denison).
 255. *S. coccinata*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 102 (1846) (Adelaïde).
 256. *S. coelestis*, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 113 (1857) (Adelaïde).
 257. *S. coeruleipes*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 13, pl. 2, f. 19 (1869) (Adelaïde).
 258. *S. coeruleiventris*, Saunders, idem, p. 20, pl. 2, f. 39 (Australie).
 259. *S. confusa*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 541 (1874) (Australie).
 260. *S. congener*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 1, pl. 1, f. 2 (1869) (Australie).
 261. *S. costalis*, Saunders, idem, p. 14, pl. 2, f. 21 (Nouv. Galles du Sud).
 262. *S. cupricauda*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 475, pl. 10, f. 34 (1868) (N. Galles du S.).
 263. *S. Dawsonensis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 155 (1890) (Queensland).
 264. *S. Deyrollei*, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 125 (1879) (Australie).
 265. *S. dispar*, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. p. 155 (1890) (Queensland).
 266. *S. distincta*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Vol. 9, p. 473, pl. 10, f. 30 (1868) (Australie).
 267. *S. distinguenda*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 2, p. 9, pl. 1, f. 12 (1869) (Australie).
 268. *S. Ederi*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 16, p. 36 (1893) (Victoria).
 269. *S. elegantula*, White, Stocke Journ. Vol. 1, p. 507 (Australie).
 270. *S. equina*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 15, p. 48 (1892) (Australie méridionale).
 271. *S. eremita*, Blackburn, idem, Vol. 13, p. 153 (1890) (Australie occidentale).
 272. *S. excisicollis*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 31 (1863) (Australie).
 273. *S. filiformis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 15, p. 217 (1892) (Australie occidentale).
 274. *S. flavescens*, Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 12 (1885) (Adelaïde).
 275. *S. flavosignata*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 3 (1863) (Port Denison).
 276. *S. flavovaria*, Saunders, Cat. Bupr. p. 74, n° 109 (1871) (Adelaïde).
 flavoficta || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 44, pl. 10, f. 52 (1838).

277. *S. graphisura*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 37 (1879) (Australie).
 278. *S. gravis*, Harold, Col. Heft. Vol. 5 (1869) (Swan River).
obscuripennis || Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 475, pl. 10, f. 33 (1868).
 279. *S. guttata*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 158 (1890) (Australie méridionale).
var. minor, Blackburn, idem.
 280. *S. Haroldi*, Saunders, Cat. Bupr. p. 74, n° 168 (1871) (Australie).
viridiventris || Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 20, pl. 2, f. 31 (1869).
 281. *S. hostilis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 46 (1892) (Australie occidentale).
 282. *S. ignea*, Blackburn, idem, p. 219 (Australie méridionale).
 283. *S. ignota*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 12, pl. 2, f. 17 (1869) (Melbourne).
 284. *S. insignicollis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 24, p. 45 (1900) (Australie occidentale).
 285. *S. insignis*, Blackburn, idem, p. 217 (1892) (Victoria).
 286. *S. insularis*, Blackburn, ibidem, Vol. 21, p. 30 (1897) (Tasmanie).
 287. *S. Jansoni*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 462, pl. 9, f. 6 (1868) (Australie).
 288. *S. jubata*, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. p. 150 (1890) (Tasmanie).
 289. *S. jucunda*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 481, pl. 10, f. 47 (1868) (Australie).
 290. *S. Karattae*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 149 (1890) (Ile des Kangourous).
 291. *S. Kreffti*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 245 (1872) (Gayndah).
 292. *S. laena*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 36 (1879) (Queensland).
stillata, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 148 (1890).
 293. *S. laevicollis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 466, pl. 9, f. 14 (1868) (Australie).
 294. *S. latithorax*, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 112 (1857) (Australie).
 295. *S. Lessoni*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 127, pl. 22, f. 125 (1841) (Swan River).
acutithorax, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 113 (1857).
 296. *S. lobicollis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 462, pl. 9, f. 5 (1868) (Australie).
 297. *S. longicollis*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 21, pl. 2, f. 32 (1869) (Australie septentrionale).
 298. *S. longula*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 54 (1892) (Victoria).
 299. *S. Loriae*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 358 (1896) (Nouv. Guinée).
 300. *S. luteocincta*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 478, pl. 10, f. 41 (1868) (Australie).
 301. *S. Mac Leayi*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 48 (1892) (Queensland).
 302. *S. maculipennis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 480, pl. 10, f. 45 (1868) (N. G. du S.).
 303. *S. magnifica*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 35 (1896) (Queensland).
 304. *S. marcida*, Blackburn, idem, p. 52 (1892) (Australie occidentale).
 305. *S. marginicervex*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 31 (1879) (Australie).
 306. *S. marmorea*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 148 (1890) (Australie méridionale).
 307. *S. Martini*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 2, pl. 1, f. 3 (1869) (Australie septentrionale).
 308. *S. melbournensis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 34 (1879) (Melbourne).
 309. *S. Menalcas*, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 14 (1879) (Australie).
 310. *S. minuta*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 44 (1892) (Queensland).
 311. *S. moribunda*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 18, pl. 2, f. 27 (1869) (Australie).
 312. *S. nigriiventris*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 27 (1863) (Australie).
 313. *S. ornata*, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. p. 53 (1892) (Victoria).
 314. *S. ostentatrix*, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 93 (1879) (Australie).
 315. *S. Pascoei*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 463 (1868) (Australie).
 316. *S. phaeorrhoea*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 456 (1818) (Australie).
 317. *S. pictipennis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 471, pl. 10, f. 25 (1868) (Swan River).
 318. *S. princeps*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 14, p. 137 (1891) (Australie occidentale).
 319. *S. pulchra*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 22, pl. 2, f. 34 (1869) (Australie).
rostrata, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 36 (1879).
 320. *S. pulchripes*, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. Vol. 21, p. 31 (1897) (Victoria).
 321. *S. punctatostriata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 466, pl. 9, f. 15 (1868) (Swan River).
delta, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 38 (1879).
 322. *S. punctiventris*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 17, pl. 2, f. 26 (1869) (Australie).
 323. *S. quadrifasciata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 477, pl. 10, f. 39 (1868) (Australie).
 324. *S. quadriguttata*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 28 (1863) (Australie).

325. *S. quadrinotata*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 49 (1892) (Victoria).
326. *S. quadrispilota*, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 5, pl. 1, f. 6 (1869) (Australie septentrionale).
327. *S. regia*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 218 (1892) (Queensland).
328. *S. rubriventris*, Blackburn, idem, Vol. 24, p. 46 (1900) (Australie occidentale).
329. *S. sagittaria*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 31, pl. 7, f. 34 (1838) (Swan River).
330. *S. secularis*, Thomson, Arch. Ent. Vol. 1, p. 111 (1857) (Australie).
331. *S. semisuturalis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 468, pl. 10, f. 19 (1868) (Australie).
332. *S. septemguttata*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 540 (1874) (Australie occidentale).
333. *S. septemmaculata*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 45 (1892) (Australie méridionale).
334. *S. sexmaculata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 465, pl. 9, f. 13 (1868) (Australie).
335. *S. sternalis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 47 (1892) (Australie méridionale).
336. *S. strigata*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 27 (1863) (Port Denison).
337. *S. subbifasciata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 479, pl. 10, f. 43 (1868) (Australie).
338. *S. transversepicta*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 35 (1879) (Swan River).
339. *S. tricolorata*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 545 (1874) (Australie occidentale).
340. *S. triguttata*, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales Vol. 1, p. 28 (1863) (Australie).
341. *S. trimaculata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 482, pl. 10, f. 49 (1768) (Australie).
342. *S. trivamosa*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 32 (1879) (Adelaïde).
343. *S. virginea*, Erichson, Wieg. Arch. Vol. 1, p. 135 (1842) (Tasmanie).
344. *S. viridis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 46, pl. 10, f. 56 (1838) (Ile King).
345. *S. viridiventris*, Mac. Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 27 (1863) (Port Denison).

6. GENUS DACTYLOZODES, CHEVROLAT

Dactylozodes. Chevrolat, Silberm. Rev. Ent. Vol. 5, p. 79 (1838); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 56 (1857).

Zemina. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 55 (1857).

Caractères. — Tête plane; épistome étroit, faiblement et largement échancré; cavités antennaires petites, subarrondies, étroitement closes en avant. — Antennes courtes, insérées contre les yeux; article 1 médiocre, assez épais; 2 et 3 courts, subégaux; 4 un peu plus allongé, obconique; les suivants subégaux, obtusément dentés et munis d'une fossette porifère terminale. — Pronotum transversal, de la largeur des élytres et faiblement lobé à la base, bisinué en avant, rebordé sur les côtés, souvent déprimé sur le disque. — Ecusson subpentagonal, assez large, tronqué à la base. — Elytres tronqués à la base, fortement lobés à l'épipleure, sinués sur les côtés avant le milieu, médiocrement rétrécis en arrière; souvent pluridentés au sommet. — Marge antérieure du prosternum largement et faiblement échancrée en arc; prosternum atténué en arrière. — Mésosternum divisé, séparé par le prolongement du prosternum; ses branches latérales transversales; la suture métasternale oblique. — Métasternum largement et peu profondément échancré en arc. — Hanches postérieures subparallèles, médiocrement dilatées au côté interne. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes; tibias légèrement arqués en dehors; tarses à peine comprimés, leurs articles subégaux entre eux. — Corps allongé, peu robuste, souvent recouvert d'une longue villosité molle et lâche ou dressée.

Je ne partage pas l'opinion de Lacordaire, qui sépare les *Zemina* des *Dactylozodes*; chez les uns comme chez les autres, les articles des tarses me paraissent peu varier et parmi les espèces que je possède, je n'en vois aucune ayant le premier article aussi long que les deux suivants réunis.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement propre à l'Amérique du Sud, où il représente les *Stigmodera*; ses espèces sont plus nombreuses vers la région occidentale que vers l'orientale.

1. *D. cupricollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Zemina*, p. 2, pl. 1, f. 1 (1839) (Chili).
Montagnei, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 488 (1851).

2. *D. depressa*, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, p. 487 (1851) (Chili).
3. *D. Rousseli*, Solier, idem, p. 489 (Chili).
4. *D. picta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 1, *Zemina*, p. 3, pl. 1, f. 3 (1839) (Chili).
rubronotata, Solier, Gay Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 486 (1851).
cribellata, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 263 (1864).
5. *D. Rouleti*, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 487 (1851) (Chili).
6. *D. quadrifasciata*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 9, p. 62 (1837) (Brésil, Rép. Arg., Chili).
tetrazona, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 80 (1838).
Orbignyi, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Zemina*, p. 3, pl. 1, f. 2 (1839).
quadrizonota, Blanchard, Voy. d'Orbign. Col. p. 150 (1846).
7. *D. Brullei*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Zemina*, p. 4, pl. 2, f. 5 (1839) (Chili).
8. **D. semivittata*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 727, pl. 15, f. 5 (1858) (Chili).
9. **D. Bruchi*, nov. sp. (1) (République Argentine).
10. **D. Chevrolati*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 47 (1897) (Buenos-Ayres).
11. **D. Oberthuri*, Kerremans, idem, p. 49 (1897) (Equateur).
12. **D. ocularis*, nov. sp. (2) (Brésil).
13. *D. hirsuta*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Zemina*, p. 4, pl. 1, f. 4 (1839) (Brésil, Chili).
14. **D. Fairmairei*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 46 (1897) (Montévidéo).
15. **D. apicalis*, nov. sp. (3) (Paraguay).
16. **D. dispar*, nov. sp. (4) (République Argentine).
17. **D. amplicolis*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 722, pl. 15, f. 4 (1858) (Chili).
18. **D. confusa*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 273 (1858) (Patagonie).
conjuncta || Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 197, pl. 33 f. 189bis (1841).
19. *D. maculiventris*, Reed, An. Univ. Chile, Vol. 38, p. 417 (1873) (Chili).
20. **D. conjuncta*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 52 (1838) (Patagonie, Chili).
vittata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Zemina*, p. 5, pl. 2, f. 6 (1839).
bivittata, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 483 (1851).
21. **D. tricolor*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 264 (1864) (Chili).
22. *D. bivittata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Bemina*, p. 6, pl. 2, f. 8 (1839) (Chili).
23. *D. jucundissima*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 198, pl. 33, f. 190 (1841) (Montévidéo).
cribricollis, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 722, pl. 15, f. 8 (1858).
24. *D. minor*, Solier, Gay Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 484 (1851) (Chili).
25. *D. alternans*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 80 (1838) (Patagonie).
pubibunda, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Zemina*, p. 6, pl. 2, f. 9 (1839).
26. *D. carinata*, Germain, An. Univ. Chile, p. 328 (1854) (Chili).
27. *D. humeralis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 199, pl. 33, f. 191 (1841) (Patagonie).
28. *D. Leyboldi*, Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. Vol. 15, p. 565 (1872) (Mendoza).
29. *D. morosa*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Zemina*, p. 5, pl. 2, f. 7 (1839) (Patagonie).
30. *D. Okea*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 195, pl. 32, f. 187 (1841) (Bolivie).

(1) Long. 15; larg. 5 mm. — Oblong ovale, allongé, atténué en arrière; tête et pronotum noir légèrement bleuâtre, peu brillants; élytres rouge vif avec, le long de la suture, une bande obscure commune aux deux élytres et un peu dilatée vers le tiers postérieur. — Dessous bleu verdâtre obscur et brillant. — Tête ponctué, vaguement impressionnée au milieu; pronotum assez grand, convexe, densément ponctué, déprimé au milieu et sur les côtés à la base; élytres avec des côtes saillantes entre des séries longitudinales et gemellées de gros points enfoncés, les côtés postérieurs peu visiblement dentelés vers le sommet, celui-ci avec une très petite échancrure subsuturale et oblique. Dessous couvert d'une villosité grise. — République Argentine : Neuquen (C. Bruch).

(2) Long. 14,5; larg. 4 mm. — Oblong ovale, allongé, légèrement atténué en arrière; tête et pronotum noirs, couverts d'une longue villosité dressée et brunâtre, le second bord latéralement de jaune; élytres jaunes avec une étroite ligne suturale, un peu élargie en avant, une tache allongée sur le calus huméral, une tache médiane arrondie contre chacun des bords, une bande préapicale et transversale et l'apex noirs. Dessous noir brillant et couvert d'une longue villosité grise. — Tête subconvexe; pronotum très grand, convexe, ses côtés arrondis en avant et droits en arrière, sans impression médiane; élytres à stries fines et régulièrement ponctuées, les interstries à peine saillants en arrière. — Brésil.

(3) Long. 12 larg. 3,6 mm. — Oblong ovale, légèrement atténué en arrière; tête et pronotum noirs et couverts d'une longue villosité jaune fauve terne; élytres jaunes avec une étroite bande marginale antérieure, une petite tache sur le calus huméral, deux petites taches au tiers postérieur et placées obliquement l'une au-dessus de l'autre ainsi que l'apex, le tout noir. Dessous noir brillant, un peu bronzé et couvert d'une longue villosité grise. — Tête et pronotum densément ponctués; écusson grand, semicirculaire; élytres à côtes, les espaces intercostaux avec des séries longitudinales et geminées de points, le sommet séparément arrondi et grossièrement dentelé. — Paraguay.

(4) Long. 14; larg. 3,8 mm. — Oblong, allongé, un peu atténué en arrière; tête et pronotum bronzés et couverts d'une longue villosité gris jaunâtre terne; élytres bleu verdâtre ornés de part et d'autre de deux bandes longitudinales, l'une marginale, l'autre présuturale, allant de la base au tiers postérieur et de deux bandes préapicales et transversales superposées, le tout jaune clair. Dessous bronzé clair et très brillant, couvert d'une longue villosité grise. — Tête et pronotum densément ponctués; écusson grand, semicirculaire; élytres costulés entre des séries longitudinales et geminées de points. — République Argentine : Tucuman (C. Bruch).

31. *D. poecilogaster*, Reed, An. Univ. Chile, Vol. 38, p. 417 (1873) (Chili).
32. *D. praeclara*, Perroud, Ann. Soc. Lyon, p. 339 (1853) (Brésil?).
hirticollis, Lucas, Voy. Casteln. p. 63, pl. 4, f. 3 (1858).
33. *D. plosimoides*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 29 (1879) (Brésil).
34. *D. stenoloma*, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 315 (1864) (Chili).
35. *D. vigintiguttata*, Perty, Del. Anim. p. 29, pl. 4, f. 77 (1830) (Chili).
36. *D. Deyrollei*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 619 (1867) (Chili).
vittata, Fairmaire, idem, p. 619 (1867).

7. GENUS HYPERANTHA, MANNERHEIM

Pocilonota || Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 298 (1833); Castelnau & Gory. Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1 (1839).

Hyperantha. Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 99 (1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 54 (1857); Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 6, p. 44 (1897).

Caractères. — Tête médiocre, plus ou moins déprimée; épistome largement et faiblement échancré; cavités antennaires petites, subarrondies, assez largement closes en avant. — Antennes courtes et peu robustes; article 1 gros, médiocrement allongé; 2 et 3 courts, subégaux; les suivants transversaux, obtusément dentés et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez gros, elliptiques et parallèles. — Pronotum grand, transversal, de la largeur des élytres ou plus large que ceux-ci à la base, rétréci et bisinué en avant, non rebordé, largement lobé à la base avec les angles postérieurs aigus et abaissés sur les épaules. — Ecusson grand, aplani, cordiforme ou subpentagonal, souvent acuminé en arrière. — Elytres allongés, à peine lobés à l'épipleure, leurs côtés atténués en ligne droite, le sommet multidenté. — Marge antérieure du prosternum variable, parfois avancée suivant un lobe médian anguleux; prosternum plan ou convexe, son sommet trifide et élargi. — Mésosternum refoulé sur les côtés. — Métasternum largement échancré en avant, formant presque à lui seul la cavité pour l'insertion du prosternum. — Hanches postérieures à peine dilatées au côté interne. — Pattes peu robustes; fémurs peu renflés; tibias minces et normaux; tarses assez robustes, comprimés, leurs articles triangulaires, le premier un peu plus long que les suivants, 2-4 égaux. — Extrémité du dernier segment abdominal variable suivant l'espèce et le sexe, le plus souvent échancrée ♂ et largement tronquée ♀, la troncature sinueuse. — Corps allongé, élargi à l'épaule; coloration jaune, rouge ou, rarement, noire, non métallique.

Distribution géographique des espèces. — On connaît une vingtaine d'espèces de ce genre, toutes propres à l'Amérique du Sud et pour la plupart d'une taille assez robuste; sauf deux espèces, plus petites, de la République Argentine, les autres habitent le Brésil, la Colombie et le Vénézuéla.

1. *H. terminalis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Pocilonota*, p. 2, pl. 1, f. 2 (1839) (Brésil).
2. *H. stigmaticollis*, Desmarests, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 19, pl. 1, f. 2 (Colombie).
3. **H. judex*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 6, p. 45 (1897) (Goyaz).
4. **H. haemorrhoea*, Fairmaire, Rev. Zool. p. 348 (1851) (Vénézuéla).
5. *H. testacea*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 196 (1801) (Brésil).
laticollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Pocilonota*, p. 2, pl. 1, f. 1 (1839).
6. **H. pilifrons*, nov. sp. (1) (Brésil).
7. **H. pictiventris*, nov. sp. (2) (Brésil).

(1) Long. 22; larg. 7,5 mm. — Tête noire, couverte d'une villosité rousse; pronotum jaune avec une tache discale noire, transversale et un peu arquée; écusson jaune; élytres rouges. Dessous jaune fauve; segments abdominaux largement bordés de noir, surtout sur les côtés; pattes noires. — La tache noire du pronotum, un peu moins grande que celle du *cardinalis*, Donovan et le dessous jaune varié de noir distinguent le *pilifrons* de cette espèce ainsi que de l'*H. Langsdorffi*, Klug. — Brésil : Goyaz.

(2) Long. 22; larg. 7,5 mm. — Tête noire, glabre; pronotum étroitement bordé de jaune fauve et noir sur le disque; élytres brun rouge; sternum jaune fauve; segments abdominaux noirs avec une large tache médiane, triangulaire et d'un jaune fauve; pattes noires. — Distinct du précédent par la coloration plus terne, les élytres plus bruns, le pronotum d'un jaune moins clair, la tache noire de ce dernier plus grande et presque identique à celle du *Langsdorffi*, Klug, l'extrémité des élytres plus rouge que le reste; la forme générale plus parallèle, moins atténuée en arrière; le dessous se rapprochant de celui du *pilifrons*, qui précède, mais le noir dominant sur l'abdomen. — Brésil : Goyaz.

8. **H. Oberthuri*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 6, p. 45 (1897) (Brésil).
 9. *H. cardinalis*, Donovan, Nat. Rep. Vol. 3, pl. 35, f. f. (1825) (Brésil).
speculigera, Perty, Delic. Anim. p. 17, pl. 4, f. 4 (1830).
 10. *H. Langsdorffi*, Klug, Ent. Bras. p. 5, pl. 10, f. 3 (Brésil).
speculifera, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Pocilonota*, p. 3, pl. 1, f. 3 (1839).
rufipennis, Guérin, Icon, Règ. Anim. p. 34, pl. 11, f. 3 (1832).
 11. *H. sanguinosa*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 101 (1837) (Brésil).
 12. *H. Sallei*, Rojas, Rev. Zool. p. 160 (1855) (Vénézuéla).
 13. *H. ornatcollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Pocilonota*, p. 4, pl. 1, f. 5 (1839) (Guyanes).
scita, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 191, pl. 32, f. 185 (1841).
aulica, var. Erichson, Wieg. Arch. Naturg. Vol. 2, p. 163 (1841).
 14. *H. Menetriesi*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 99 (1837) (Brésil).
* *trigonalis*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 81 (1838).
* *trinotata*, Chevrolat, idem, p. 81 (1838).
aulica, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Pocilonota*, p. 4, pl. 1, f. 4 (1839).
 15. *H. interrogationis*, Klug, Ent. Bras. p. 6, pl. 40, f. 4 (1827) (Brésil).
var. consobrina, Lucas, Voy. Casteln. p. 62, pl. 4, f. 2 (1858).
 16. **P. Stempelmanni*, Berg, An. Univ. Buen. Ayr. Vol. 6, p. 154 (1889) (Cordova).
 17. **H. pygmaea*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 6, p. 46 (1897) (Buenos Ayres).
-
18. *H. bella*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 6, pl. 1, f. 8 (1869) (Brésil).
 19. *H. decora*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 192, pl. 32, f. 186 (1841) (Brésil).
cardinalis, var. Erichson, Wieg. Arch. Naturg. Vol. 2, p. 163 (1841).
Chabrilacei, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 327, pl. 8, f. 3 (1856).
 20. *H. vittaticollis*, Desmarests, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 19, pl. 1, f. 1 (Tucuman).

TRIBU XI. AGRILINI, CASTELNAU & GORY

Agrilites. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2 (1839).

Agrilides. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 76 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 412 (1865).

Agrilini. Le Conte & Horn, Smiths. Inst. (1883); Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 114 (1893).

Caractères. — Fossettes porifères terminales; cavités antennaires grandes et situées à une notable distance des yeux; front rétréci à l'insertion des antennes; base du pronotum sinueuse sur les côtés et lobée au milieu; cavité sternale formée presque en entier par le métasternum, les branches latérales du mésosternum très courtes et refoulées sur les côtés (1); crochets des tarses dentés ou appendiculés (2).

1. — *Hanches médianes, non écartées; marge antérieure des branches postérieures très concave, leurs branches latérales remontant entre les côtés du métasternum et le prolongement latéral de l'abdomen; tarses plus ou moins allongés* 1. AGRILITES.
2. — *Hanches médianes sensiblement plus écartées l'une de l'autre que les hanches antérieures; marge antérieure des hanches postérieures peu concave; tarses très courts* 2. TRACHYTES.

GROUPE I. AGRILITES, LACORDAIRE

Agrilides. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 76 (1857).

Agrilites. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 113 (1864); Le Conte & Horn, Smithson. Inst. (1883).

(1) A l'exception des genres *Synechocera* H. Deyrolle, et *Alcinous* H. Deyrolle.

(2) Exceptés les genres *Discoderes* Chevrolat, et *Coraebastus* Fairmaire.

Caractères. — Hanches médianes non ou à peine écartées; marge antérieure des hanches postérieures très concave, leurs branches latérales remontant sur les côtés; tarses variables.

1. — *Cavité sternale formée dans son fond par le méta- et latéralement par le mésosternum* 2.
- Cavité sternale formée par le métasternum seul* 3.
2. — *Elytres unis* 1. SYNECHOCERA.
- *bossués ou inégaux* 2. ALCINOUS.
3. — *Crochets des tarses simples* 4.
- — *dentés, appendiculés ou bifides* 5.
4. — *Tête inégale, tuberculée; front faiblement sillonné* 3. DISCODERES.
- Tête largement et profondément excavée* 4. CORAEBASTUS.
5. — *Yeux grands, touchant le pronotum* 6.
- Yeux petits, situés à une certaine distance du pronotum* 62.
6. — *Antennes libres au repos* 7.
- *insérées au repos dans une rainure épisterno- ou margino-thoracique* 58.
7. — *Premier article des tarses postérieurs court, rarement aussi long que les deux suivants réunis* 8.
- Premier article des tarses postérieurs aussi long ou plus long que les trois suivants réunis* 48.
8. — *Hanches postérieures non ou faiblement dilatées au côté externe* 9.
- — *très dilatées en avant au côté externe* 13.
9. — *Tibias antérieurs et médians normaux et droits* 10.
- — *recourbés et cylindriques* 5. STRIGULIA.
10. — *Ecusson grand, plus large que long.* 11.
- *petit, plus long que large* 33. NASTELLA, nov. gen.
11. — *Front plus ou moins déprimé.* 12.
- Front nettement et profondément sillonné* 8. ETHON.
12. — *Antennes entièrement libres au repos* 9. CISSEIS.
- Antennes insérées, au repos, dans une rainure longeant les yeux sans dépasser la tête* 40. CISSEOIDES.
13. — *Antennes dentées à partir du 4^e article* 14.
- — *5^e ou du 6^e article* 28.
14. — *Yeux parallèles ou écartés en arrière sur le vertex* 15.
- Yeux rapprochés en arrière sur le vertex* 11. CHLORICALLA.
15. — *Yeux parallèles* 16.
- Yeux obliques et écartés en arrière sur le vertex* 23.
16. — *Antennes courtes et peu élargies.* 17.
- *longues, à articles larges et dilatés* 28. EUPRISTOCERUS.
17. — *Marge latérale du pronotum crénelée* 18.
- — *lisse* 14. MELIBAEUS.
18. — *Mentonnière du prosternum absente.* 19.
- — *courte et plus ou moins lobée sur les côtés* 22.
19. — *Premier article des tarses postérieurs semblable au suivant* 20.
- — — *plus long que le suivant* 12. CORAEBUS.

20. — Disque du pronotum convexe, mais uni	21.
— — inégal et bossué	36. MUNDARIA.
21. — Ecusson large et cordiforme	38. BELGAUMIA, nov. gen.
— très petit et triangulaire	13. BRACHYCORAEBUS, nov. gen.
22. — Disque du pronotum convexe, mais uni	39. CISSEICORAEBUS, nov. gen.
— — inégal et bossué	41. AMORPHOSOMA.
23. — Fémurs postérieurs normaux	24.
— — grands, épais et renflés, souvent rouges, sinon, dorés.	21. PSEUDAGRILUS.
24. — Disque du pronotum plus ou moins convexe, mais uni	25.
— — inégal et bossué	27.
25. — Une courte mentonnière au prosternum	26.
Non	30. DIADORA.
26. — Tibias postérieurs aplanis et élargis au sommet	29. POLYONYCHUS.
— — grêles et cylindriques	26. EVIMANTIUS.
27. — Angles postérieurs du pronotum tronqués et obtus	37. ASYMADES.
— — — aigus	43. HYPOCISSEIS.
28. — Yeux parallèles ou obliques et écartés en arrière	29.
Yeux obliques et sensiblement rapprochés en arrière	23. SAMBOIDES.
29. — Yeux parallèles	30.
Yeux obliques et écartés en arrière	32.
30. — Fémurs normaux	31.
— épais et robustes, unidentés au côté interne.	22. SAMBUS.
31. — Marge latérale du pronotum lisse	6. CORYDON.
— — — finement crénelée	10. NEOCORAEBUS, nov. gen.
32. — Front uni, sillonné ou creusé en avant	33.
— inégal et bossué, tuberculé ou fasciculé, surtout en arrière	38.
33. — Tibias normaux	34.
— robustes et arqués	20. MELIBAEOPSIS, nov. gen.
34. — Epistome non séparé du front par une carène	35.
— séparé du front par une carène	7. ENTOMOGASTER.
35. — Dessus très convexe	36.
— plan ou à peine arqué	16. PAREUMERUS.
36. — Fémurs dentés en scie sur la tranche interne	37.
— inermes	17. EUAMYIA (1).
37. — Armature fémorale constituée par une seule série de dents	18. AMYIA.
— — — deux séries de dents	19. CALLIPYNDAX.
38. — Métasternum situé sur le même plan que le prosternum	39.
— saillant	42. AMORPHOSTERNUS.
39. — Tibias non dilatés	40.
— dilatés pour l'insertion du tarse au repos	24. CRYPTODACTYLUS.
40. — Tous les tibias droits ou à peine recourbés	41.
— très recourbés et laissant un vide entre eux et les fémurs.	25. TOXOSCELUS.
41. — Base du pronotum non échancrée sur les côtés	42.
— échancrée de chaque côté	45.

(1) *Eumerus*, Castelnau & Gory, *nom. preoc.*

42. — *Cavités antennaires rapprochées et presque contiguës* 43.
 — *écartées* 27. ALYSSODERUS.
43. — *Milieu des côtés du pronotum arrondi* 44.
 — — — *droit* 34. PLANIDIA.
44. — *Pas de côte sur les élytres* 15. METASAMBUS, nov. gen.
 Une côte médiane sur chaque élytre 31. PARADORA.
45. — *Une mentonnière au prosternum* 46.
 Non 47.
46. — *Pas de fascicules arrière frontaux* 32. EPIMACHA.
 Deux fascicules arrière frontaux 35. DEMOSTIS.
47. — *Tubercules du pronotum glabres* 44. PHLOCTEIS.
 — — — *velus* 45. ANADORA.
48. — *Des lamelles au 4^e article des tarses seul* 49.
 — *aux trois articles intermédiaires* 50.
49. — *Deuxième et troisième article des tarses fasciculés* 46. CYPHOTHORAX.
 Non 47. STENOGASTER.
50. — *Fémurs finement dentés en scie sur la tranche interne* 51.
 Non 57.
51. — *Cavités antennaires rapprochées et subcontiguës* 52.
 — — — *plus écartées* 50. AUTARCHONTES.
52. — *Pronotum sillonné ou inégal* 53.
 — *uni* 49. MYCHOMMATUS.
53. — *Elytres atténués et arrondis au sommet* 54.
 — *élargis, déclives et spatulés au sommet* 51. OMOCHYSEUS.
54. — *Région supérieure de l'abdomen peu dilatée et à peine ou non visible en dessus* 55.
 Région supérieure de l'abdomen dilatée et visible en dessus 54. AGRILOIDES, nov. gen.
55. — *Premier article des tarses postérieurs allongé* 56.
 — — — *relativement court* 48. TRYPANTIUS.
56. — *Cavités antennaires arrondies* 52. ENGYAULUS.
 Non 53. PARADOMORPHUS.
57. — *Milieu du premier segment abdominal sillonné longitudinalement* 55. DIPLOLOPHOTUS.
 Non 56. AGRILUS.
58. — *Tous les tibias droits ou, tout au plus, les postérieurs faiblement arqués* 59.
 — — — *arqués* 57. RHAEBOSCELIS.
59. — *Extrémité du dernier segment abdominal inerme* 60.
 — — — *bidentée* 58. GERALIUS.
60. — *Tibias postérieurs droits* 61.
 — — — *arqués* 59. PARAGRILUS.
61. — *Epistome étroitement et anguleusement échancré* 60. VELUTIA.
 — *largement échancré en arc* 61. KAMOSIA.
62. — *Tête étroite, peu convexe* 63.
 Tête large et très convexe 64.
63. — *Hanches postérieures fortement dilatées en avant au côté externe* 62. BERGIDORA, nov. gen.
 Non 63. PARACEPHALA.

64. — *Yeux parallèles* 64. CLEMA.
Yeux distants en arrière, sur le vertex 65. CYLINDROMORPHUS.
 65. — *Gen. incert. Sed* 66. CORAEGRILUS.

I. GENUS SYNECHOCERA, H. DEYROLLE

Synechocera. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 115 (1864).

Caractères. — « Pas de mentonnière au prosternum. — Prothorax plus ou moins sinueux à la base, mais jamais coupé droit. — Antennes dentées à partir du 5^e article. — Tibias de forme normale. — Cavité sternale formée seulement, au moins latéralement par le mésosternum. — Prosternum séparé du métasternum par les branches du mésosternum qui se rejoignent en arrière; corps très allongé. »

Ce genre a été fondé par H. Deyrolle pour une espèce d'Amboine décrite par Fabricius et figurée par Castelnau et Gory qui la rangeaient parmi leurs *Agrilites*. La structure du sternum, entièrement anormale pour la tribu, me fait placer ce genre en tête du groupe, avec le genre suivant qui présente le même caractère, mais à un degré moins accentué, les branches du mésosternum n'étant pas contiguës.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue lorsque H. Deyrolle a fondé ce genre, se trouve à Amboine. M. J. Thomson en a décrit depuis une seconde espèce de l'Australie. Toutes deux me sont inconnues en nature et leurs descriptions sont trop courtes pour pouvoir les discuter en connaissance de cause.

1. *S. deplanata*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 212 (1801) (Amboine).

2. *S. elongata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 56 (1870) (Australie).

2. GENUS ALCINOUS, H. DEYROLLE

Alcinous. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 115 (1864); Kerremans, idem, Vol. 48, p. 174 (1898).

Caractères. — Tête profondément sillonnée; front séparé de l'épistome par une carène droite; épistome à bord relevé et bilobé; joues armées d'une courte dent obtuse, celle-ci séparée des yeux par une rainure destinée à loger la base des antennes; cavités antennaires très grandes, presque contiguës au côté interne. — Antennes courtes, dentées à partir du 6^e article; 1 et 2 en massue épaissie au bout, subégaux entre eux; 3 et 4 moins épais, obconiques, un peu moins longs que les précédents et subégaux entre eux; 5 égal à 4, mais un peu plus triangulaire; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez gros, elliptiques et parallèles. — Pronotum inégal, bossué; le disque convexe et sillonné au milieu; les côtés arqués et munis d'une carène sinueuse, située à une certaine distance du bord et parallèle à celui-ci; la marge antérieure et la base bisinuées avec un lobe médian arrondi. — Ecusson assez grand, en triangle un peu plus large que long. — Elytres inégaux, bossués et rugueux, sinueux à la base, lobés aux épipleures, sinueux à hauteur des hanches postérieures, séparément arrondis et dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum anguleux au sommet, celui-ci inséré latéralement entre les branches du mésosternum et reposant, au milieu, sur le mésosternum. — Mésosternum divisé, ses branches latérales obliques et arqués. — Mésosternum largement tronqué en avant. — Hanches postérieures courtes, leur marge antérieure cintrée, la postérieure droite, les côtés médiocrement dilatés. — Pattes peu robustes, fémurs et tibias normaux; tibias postérieurs légèrement renflés au milieu sur leur tranche externe, ciliés le long de ce bord; tarses

courts, le premier article des postérieurs un peu moins long que les deux suivants réunis; crochets bifides, la dent interne plus courte que l'externe. — Corps allongé, convexe, inégal et bossué en dessus, peu robuste, droit sur les côtés, atténué en avant et en arrière.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que deux espèces de ce genre, toutes deux du continent australien.

1. **A. nodosus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 175 (1898) (Australie).
2. **A. minor*, Kerremans, idem, p. 176 (Nouvelles-Galles du Sud).

3. GENUS DISCODERES, CHEVROLAT

Discoderes. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 83 (1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 80 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 114 (1864).

Caractères. — Tête médiocrement convexe, sillonnée au milieu; épistome court, bisinué en avant avec une faible échancrure médiane anguleuse; joues inermes; cavités antennaires grandes, sub-contiguës et surmontées d'un sillon un peu arqué. — Antennes dentées à partir du 5^e article; le 1^{er} assez épais, plus robuste que 2; celui-ci court, obconique, 3 et 4 plus longs, obconiques et subégaux entre eux; les suivants transversaux, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques, un peu plus écartés en arrière sur le vertex qu'en avant. — Pronotum grand, subplan, largement arrondi sur les côtés; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé et subanguleux; la base bisinuée avec un lobe médian tronquée. — Ecusson triangulaire, assez grand et plus long que large. — Elytres peu convexes, sinueux en avant avec un calus huméral bien marqué, lobés aux épipleures, sinueux à hauteur des hanches postérieures et séparément arrondis ou subacuminés au sommet; celui-ci dentelé. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large, plan, un peu déclive en avant, anguleux au sommet. — Mésosternum divisé, ses branches très courtes et arquées. — Métasternum faiblement échancré en arc en avant. — Hanches postérieures faiblement dilatées au côté externe, la marge antérieure et la postérieure subparallèles et sinueuses. — Pattes peu robustes; fémur subfusiformes et normaux; tibias légèrement arqués; tarses variables, le plus souvent courts, leurs articles subégaux entre eux; les crochets lobés à la base. — Le premier et le deuxième segment abdominal soudés, la soudure à peine distincte sur les côtés. — Corps oblong, allongé, peu convexe, souvent couvert en dessus de mouchetures pulvérulentes et claires.

Chevrolat, en décrivant ce genre, lui donne pour type l'*Agrilus Salzmanni*, Solier, sur lequel les caractères précités ont été examinés. Lacordaire, qui ne connaissait pas cette espèce, prend comme type du genre le *Bupr. exasperata*, Schönherr, et en conclut, avec raison, que les crochets des tarses sont dentés. Ils sont simples ou légèrement lobés à la base chez les vrais *Discoderes*, qui présentent en outre des différences de caractères et de faciès très accentuées avec les *Amorphosoma* et les *Phlocteis*, comme on le verra par la suite. Ils sont aussi entièrement distincts des *Polyonychus*, avec lesquels ils avaient été mis en synonymie.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement propre à l'Afrique centrale et méridionale et à Madagascar. Je ne connais pas plus l'espèce citée comme provenant de l'Inde, ni celle de l'Australie, que je ne connais la majeure partie de ses espèces, placées par leurs créateurs parmi les *Discoderes*. Seules les trois espèces qui suivent me sont connues :

1. *D. Salzmanni*, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 303 (1833) (Sénégal).
Buqueti, Klug, Erm. Reis. p. 30 (1835).

2. **D. capensis*, nov. sp. (1) (Cap de Bonne-Espérance).
 3. *D. gabonica*, nov. spec. (2) (Gabon).
-
4. *D. capucinus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 314 (1851) (Caffrerie).
 5. *D. chalcodes*, Wiedemann, Germ. Mag. Vol. 4, p. 122 (1821) (Cap de Bonne-Espérance).
carinatus, Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol. 9, p. 50 (1827).
 6. *D. comatus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 347 (1851) (Caffrerie).
 7. *D. corinthius*, Fairmaire, Rev. d'Ent. Caen, p. 162 (1901) (Madagascar).
 8. *D. deformis*, Fairmaire, idem, p. 163 (Madagascar).
 9. *D. denticollis*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 340 (1851) (Caffrerie).
 10. *D. derutus*, Fahreus, idem, p. 342 (Caffrerie).
 11. *D. egregius*, Boheman, Vet. Akad. Förh. p. 21 (1860) (Swacop).
 12. *D. fasciatus*, Guérin, Mag. Zool. p. 328 (1840) (Indes orientales).
 13. *D. Goudoti*, Thomson, Typ. Bupr. p. 82 (1878) (Madagascar).
 14. *D. immunitus*, Fahreus, Ins. Caff. Vol. 1, p. 345 (1851) (Caffrerie).
 15. *D. inaequalis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Amorphosoma*, p. 11, pl. 3, f. 14 (1839) (Madagascar).
 16. *D. mucoreus*, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 80 (1902) (Madagascar).
 17. *D. multiundatus*, Ancey, Il Natur. Sicil. Vol. 2, p. 116 (1883) (Zanzibar).
 18. *D. nigrovirens*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. 116 (1899) (Madagascar).
 19. *D. ochraceopictus*, Fairmaire, Le Naturaliste, Vol. 2, p. 56, f. 6 (1888) (Madagascar).
 20. *D. pavo*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 660 (1881) (Bogeos).
 21. *D. Pervieri*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 244 (1900) (Madagascar).
 22. *D. simplicifrons*, Fairmaire, Rev. d'Ent. Caen, p. 163 (1901) (Madagascar).
 23. *D. torridus*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 301 (1891) (Queensland).
 24. *D. viduus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 343 (1851) (Caffrerie).
 25. *D. Wiedemanni*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coræbus*, Vol. 2, p. 5, pl. 1, f. 6 (1839) (Cap de Bonne-Espérance).

4. GENUS CORÆBASTUS, FAIRMAIRE

Coræbastus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 456 (1896).

Caractères. — « Genre voisin des *Coræbus* et des *Cisseis*, distinct des seconds par le corselet » n'ayant pas deux carènes latérales, des premiers par l'écusson en triangle très aigu ; les élytres non » denticulées à l'extrémité, la tête largement et fortement excavée avec un sillon médian, le 3^e article » des antennes beaucoup plus court que le 2^e, le corselet ne formant pas un lobe au milieu de la base » qui est légèrement bisinuée, les côtés du corselet légèrement déprimés, le métasternum échancré en » angle aigu, les tarses assez grêles, s'élargissant un peu vers l'extrémité avec les crochets simples. — » Le corps est plus large que chez les *Coræbus* et ne présente pas de couleurs métalliques en dessus. »

Je range ce genre dans le voisinage des *Discoderes* parce que Fairmaire, son créateur, dit que les crochets de tarses sont simples, caractère anormal pour la tribu des *Agrilines*. Je ne connais pas l'espèce sur laquelle il a été fondé.

Distribution géographique de l'espèce. — On ne connaît qu'une seule espèce, de Mayotte.
1. *C. quinquepustulatus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 45 (1896) (Mayotte).

(1) Long. 6; larg. 1,8 mm. — Oblong, allongé bronzé pourpré plus clair et plus brillant en dessous qu'au-dessus ; les élytres ornés sur leur région postérieure, de bandes sinuées formées par un amas de poils gris. — Tête sillonnée, légèrement convexe en arrière ; pronotum bisinué en avant le disque convexe avec un sillon transversal situé le long de la marge antérieure et à une certaine distance de celle-ci, la carène latérale bisinuée et distante, dans son milieu, de la marge latérale ; élytres granuleux, à dessin vilieux peu net mais très anguleux, le sommet séparément arrondi. Dessous couvert d'une courte villosité gris jaunâtre. — Cap de Bonne-Espérance.

(2) Long. 6,5; larg. 2 mm. — Oblong, allongé, entièrement noir, couvert sur le pronotum, surtout sur les côtés, d'un reflet bronzé clair et brillant. — Diffère des précédents par le pronotum plus grand, plus arqué encore sur les côtés, et bossué, couvert de petites rides irrégulières, d'allure confuse. Elytres à rides transversales denses et parallèles, simulant des écailles à certains endroits ; le sommet plus clair et plus bronzé, d'une coloration semblable à celle des côtés du pronotum. Tibias plus arqués ; tarses relativement plus allongés, les articles plus étroits à leur base et plus élargis à leur sommet, le dessous bronzé obscur et brillant. — Gabon.

5. GENUS STRIGULIA, KERREMANS

Strigulia. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 117 (1893).

Caractères. — Tête plane, faiblement excavée et sillonnée; épistome peu profondément échancré en arc et relevé sur le bord; joues inermes; cavités antennaires grandes, arrondies et subcontiguës. — Antennes courtes, dentées à partir du 5^e article; article 1^{er} assez épais, 2 semblable à 1; 3 et 4 allongés, obconiques, les suivants dentés au côté interne, assez épais et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques, un peu obliques et plus séparés en arrière sur le vertex, qu'en avant. — Pronotum très grand, subcirculaire, plan, à peine bombé, la marge antérieure avancée sur le vertex, fortement bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés très arqués, leur plus grande largeur un peu avant le milieu; la base bisinuée avec un lobe médian tronqué. — Ecusson petit, en triangle allongé; le sommet très acuminé. — Elytres plans, lobés à la base, arrondis à l'épaule, légèrement sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, conjointement atténués au sommet avec un très petit vide anguleux sutural. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum peu convexe, étroit en arrière et anguleux au sommet. — Branches latérales du mésosternum très courtes. — Métasternum faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures peu dilatées au côté externe, les bords subparallèles. — Pattes assez robustes; fémurs antérieurs et médians arqués au sommet, les postérieurs moins; tibias antérieurs et médians subcylindriques et très arqués, les postérieurs presque droits; tarses courts, leurs articles subégaux entre eux; crochets bifides. — Corps allongé, aplani, plus large en avant qu'en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, dont on ne connaît que trois espèces, appartient à la faune intertropicale de l'Afrique.

1. **S. cyclodera*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 244 (1891) (Gabon, Congo).

* *lacerta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 117 (1893).

2. **S. pygmaea*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 273 (1899) (Cameroon).

3. ***S. coerulea** (1), nov. sp. (Abyssinie).

6. GENUS CORYDON, H. DEYROLLE

Corydon. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 144 (1864).

Caractères. — Tête faiblement sillonnée; épistome peu échancré en arc; joues dentées; cavités antennaires grandes, subcontiguës, séparées par un espace étroit et caréniforme, situées à une certaine distance des yeux. — Antennes courtes, dentées à partir du cinquième article; 1 et 2 subégaux entre eux, assez épais, obconiques; 3 plus grêle et plus court, subglobulaire; 4 triangulaire, les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux saillants, ovoïdes, légèrement atténués en arrière vers le vertex, parallèles et à peine plus écartés en avant qu'en arrière. — Pronotum grand, plus large que haut, uni, légèrement et également convexe; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés largement arqués; la base bisinuée avec un large lobe médian avancé et arqué, le milieu du lobe tronqué droit le long de l'écusson. — Ecusson assez grand, en triangle équilatéral. — Elytres subplans, largement lobés à la base, séparément arrondis au sommet. — Marge antérieure du prosternum droite, très légèrement rebordée; prosternum assez court, peu convexe, acuminé au sommet. — Mésosternum divisé, ses branches courtes et refoulées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum anguleusement échancré au sommet. — Hanches

(1) Long. 4,5; larg. 0,8 mm. — *Petit, oblong, arrondi en avant et en arrière, légèrement élargi au tiers supérieur, entièrement bleu foncé brillant avec le front rouge feu sombre.* — Tête finement granuleuse; front faiblement sillonné; pronotum uni garni de trois fines rayures onduleuses impressionné de part et d'autre à la base; élytres un peu plus rugueux que le pronotum et couvert de rugosités simulant de très petites écailles. — Abyssinie.

postérieures très courtes; leur marge antérieure plus sinueuse que la postérieure, dilatées et remontant sur les côtés. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, légèrement renflés au milieu; tibias simples et normaux, les quatre antérieurs à peine arqués, les postérieurs droits; tous les tarses courts, semblables; le premier article à peine plus long que les suivants; leurs crochets bifides. — Différences sexuelles extérieures nulles.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, peu nombreux en espèces, est répandu par toute l'Amérique du Sud.

1. *C. cupreoviridis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 55 (1879) (Brésil).
 2. *C. nitidicollis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coræbus*, p. 18, pl. 4, f. 28 (1839) (Goyaz).
 3. **C. rotundicollis*, nov. sp. (1) (Brésil).
 4. **C. niger*, nov. sp. (2) (Goyaz).
-
5. *C. striatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coræbus*, p. 16, pl. 4, f. 25 (1839) (Chili).

7. GENUS ENTOMOGASTER, FAIRMAIRE

Entomogaster (La Ferté mss) Saunders, Cat. Bupr. p. 102 (1871), non décrit; Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. 114 (1899).

Caractères. — Tête assez convexe, faiblement sillonnée; front séparé de l'épistome par un sillon transversal; épistome à peine sinueux au milieu, limité sur les côtés par le bord des cavités antennaires; joues dentées; cavités antennaires grandes, arrondies et situées près des yeux. — Antennes courtes, insérées à leur base dans une rainure longeant les joues et non prolongée sur l'épisternum prothoracique, dentées à partir du 5^e article; 1 et 2 assez épais, subégaux, 2 un peu moins robuste que 1; 3 et 4 obconiques, subégaux entre eux, les suivants transversaux, dentés au côté interne, triangulaires, munis d'une fossette porifère terminale et diminuant graduellement en longueur. — Yeux assez grands, subréniformes, un peu obliques, écartés en arrière sur le vertex et rapprochés en avant. — Pronotum grand, un peu plus large que haut; sa marge antérieure fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé; les côtés arqués et munis d'une carène sinueuse située à une certaine distance du bord; la base bisinuée avec un large lobe médian arqué. — Ecusson médiocre, en triangle équilatéral. — Elytres largement et fortement lobés à la base, laissant souvent à découvert une étroite portion latérale de la région supérieure des premiers segments abdominaux; le sommet séparément arrondi. — Marge antérieure du prosternum droite et faiblement rebordée; prosternum plan, acuminé à son sommet et très finement rebordé. — Branches latérales du mésosternum très courtes et refoulées sur les côtés. — Métasternum large et anguleusement échancré à son sommet. — Hanches postérieures non contiguës, courtes et subparallèles au côté interne, dilatées et remontant sur les bords. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux; tarses courts et subégaux entre eux, leurs crochets bifides. — Corps allongé, oblong et peu robuste.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement propre à Madagascar.

1. **E. Kerremansi*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. 115 (1899) (Madagascar).
2. **E. octoguttatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 353 (1894) (Madagascar).

(1) Long 4; larg. 1 mm. — Voisin, pour le faciès et la coloration, du *C. cupreoviridis* Thomson, mais plus petit, moins robuste, le pronotum plus large et plus dilaté sur les côtés, son disque plus convexe, ses angles postérieurs presque droits, par suite d'un rétrécissement sinueux des bords après leur milieu, les ridules simulant des petites écailles plus fines et moins rugueuses, les élytres plus finement rugueux. Coloration générale plus sombre, surtout sur les élytres, qui paraissent noirs. — Brésil (C. Bruch).

(2) Long. 4; larg. 1,3 mm. — Entièrement noir, sans aucun reflet bronzé ou métallique, mais brillant, plus trapu que les précédents et aussi plus convexe en dessus. Tête et pronotum ponctués, couverts de petites rides d'allure concentrique surtout sur le pronotum; celui-ci assez convexe, sa marge antérieure moins anguleusement avancée au milieu, les côtés arqués en avant et sinueux en arrière avec l'angle postérieur petit, aigu et légèrement saillant en dehors; élytres couverts de points en relief, comme chez les *Ethon* qui suivent, mais moins linéaires. — Brésil Goyaz (H. Donckier).

3. **E. modestus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. 115 (1899) (Madagascar).
4. **E. rufobasalis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 41, p. 380 (1897) (Madagascar).
5. *E. amplicollis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 41, p. 380 (1897) (Madagascar).
6. *E. bipustulatus*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 161 (1901) (Madagascar).
7. *E. cupriventris*, Fairmaire, idem, p. 162 (Madagascar).
8. *E. neocuris*, Fairmaire, ibidem, p. 161 (Madagascar).
9. *E. Perrieri*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 243 (1900) (Madagascar).
10. *E. sexpunctatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Anthaxia*, p. 36, pl. 8, f. 51 (Madagascar).

8. GENUS ETHON, CASTELNAU & GORY

Ethon. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 77 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 113 (1864).

Caractères. — Tête creusée, profondément sillonnée dans toute sa longueur; épistome échancré en arc au milieu et lobé sur les côtés, le lobe formé par les cavités antennaires; joues dentées; cavités antennaires grandes, arrondies et séparées l'une de l'autre par la partie supérieure de l'épistome. celle-ci concave. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article, tous les articles à peu près égaux entre eux en longueur, les articles dentés un peu plus triangulaires et dentés au côté interne, munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez gros, un peu plus rapprochés en avant qu'en arrière sur le vertex. — Pronotum convexe, plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé et arrondi; les côtés obliquement arqués et carénés; la base bisinuée avec un large lobe médian arrondi. — Ecusson triangulaire, un peu plus large que long. — Elytres subconvexes, régulièrement déclives en arrière, lobés à la base. séparément arrondis en arrière et couverts de stries longitudinales formées par des séries de traits interrompus. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large, aplani, à peine convexe, le sommet largement arrondi, à peine anguleux au milieu. — Mésosternum très court, refoulé entre les hanches antérieures et les médianes. — Mésternum échancré à son sommet. — Hanches postérieures légèrement dilatées au côté interne et au côté externe, celui-ci remontant médiocrement en avant. — Pattes peu robustes; fémurs et tibiaux normaux; tarses sensiblement moins écourtés que ceux des genres précédentes, le premier article des postérieurs plus allongé que le deuxième; crochets dentés. — Corps assez épais, ovoïde, écourté.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, qui présente beaucoup d'affinités avec les *Cisseis* qui suivent, mais qui s'en distingue par le front plus creusé, le faciès plus ovoïde et plus robuste et par la structure élytrale, paraît exclusivement propre à l'Australie.

1. *E. scabiosum*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Ent. Vol. 2, p. 96 (1835) (Australie).
scabiorum, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pl. 1, f. 6 (1839).
2. *E. Roei*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 54, pl. 4, f. 16 (1868) (Australie).
3. *E. subfasciatum*, Saunders, idem, p. 55, pl. 4, f. 17 (Australie).
4. *E. corpulentum*, Boheman, Eug. Res. Ent. p. 62 (1858) (Australie).
fissiceps || Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 96 (1835).
5. *E. affine*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pl. 1, f. 5 (1839) (Australie).
aurifluum, Hope, Austral. Bupr. p. 12 (1836).
purpurascens, Hope, idem, p. 12 (1836).
proximum, Boheman, Eug. Res. Ent. p. 63 (1858).
6. *E. fissiceps*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 458, pl. 23, f. 4 (1818) (Australie).
viride, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 6, pl. 1, f. 8 (1839).
Reichei, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 82 (1839).
7. **E. diversum*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 156 (1898) (Australie).
8. *E. maculatum*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 250 (1887) (Australie).

9. GENUS CISSEIS, CASTELNAU & GORY

Cisseis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 78 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 113 (1864).

Neospades. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 251 (1887).

Caractères. — Tête non ou à peine concave; front séparé de l'épistome par une carène transversale; épistome profondément échancré en arc au milieu entre deux lobes formant les bords des cavités antennaires; joues dentées; cavités antennaires grandes et subterminales. — Antennes dentées à partir du 4^e article; 1 et 2 subégaux, assez épais, renflés au bout; 3 plus faible, plus court; les suivants triangulaires, élargis et obtusément dentés au côté interne, munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques et subparallèles. — Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière; sa marge antérieure bisinuée avec un faible lobe médian peu avancé; les côtes plus ou moins arqués avec une carène marginale et une prémarginale; la base bisinuée avec un lobe médian tronqué. — Ecusson variable, plus large que long, acuminé au sommet. — Elytres lobés à la base, sinueux à hauteur des hanches postérieures, séparément arrondis et dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum plus ou moins rebordée, le bord formant une très courte mentonnière un peu lobée sur les côtés et échancrée au milieu; prosternum large et plan, son sommet subanguleux, plutôt arrondi. — Branches latérales du mésosternum courtes et arquées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum profondément et largement échancré en arc à son sommet. — Hanches postérieures non ou à peine dilatées au côté interne et à l'externe, plus dilatées au premier qu'au second. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias antérieurs et médians normaux, les postérieurs ciliés et plus ou moins sinueux dans leur moitié postérieure et sur le bord externe, la sinuosité formant deux lobes arqués; tarses assez allongés, surtout les postérieurs; le dernier article de ceux-ci plus long que le suivant; crochets dentés ou bifides. — Corps elliptique, assez convexe.

Le genre *Neospades* Blackburn ne me paraît pas suffisamment tranché pour le séparer de *Cisseis*. La longueur du premier article des tarses postérieurs, signalée par M. Blackburn, et la forme de ceux-ci sont très variables parmi les *Cisseis*. Le *Neospades lateralis* Blackburn, dont je possède un type, a les antennes dentées à partir du 4^e article. Peut-être est-il d'une forme un peu plus allongée et plus cylindrique que les autres espèces du genre *Cisseis*, mais, parmi celles-ci, il en est d'autres qui présentent le même faciès. Peut-être le *B. chrysopygia*, de Germar, présente-t-il des différences plus marquées, mais le *lateralis* Blackburn est pour moi un vrai *Cisseis*.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre est répandu en Australie et en Malaisie; mais tout en ayant une aire de dispersion assez étendue, il est plutôt australien que malais.

1. *C. acuducta*, Kirby, Fauna Bor. Amer. Vol. 4, p. 162 (1836) (Australie).
marmorata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Ethon*, p. 4, pl. 1, f. 5 (1839).
lata, Hope, Austral. Bupr. p. 11 (1836).
anea, Hope, idem, p. 12.
2. **C. cuprifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 157 (1898) (Australie).
3. *C. roseocuprea*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 119 (1845) (Australie).
4. **C. Fairmairei*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 169 (1898) (Australie).
5. **C. læta*, nov. sp. (1) (Australie).
6. **C. scabrosula*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 167 (1898) (Australie).
7. **C. undulata*, nov. sp. (2) (Nouvelles-Galles du Sud).

(1) Long., 7; larg. 2,7 mm. — Plus large et plus robuste que les deux précédents, d'un bronzé cuivreux rouge en dessus avec le front verdâtre, les côtés du pronotum plus obliques, celui-ci plus atténué en avant, la punctuation des élytres irrégulière, non disposée en stries, mais assez également espacée, le dessin villeux vague et confus. — Australie.

(2) Long. 5,7; larg. 2 mm. — Plus petit et plus écourté que les précédents; front cuivreux pourpré brillant; pronotum bronzé cuivreux clair; élytres bleu d'acier avec la base, le milieu du disque antérieur et les côtés bronzé clair, le sommet pourpré, et des bandes ou marbrures blanches et villeuses. Dessous bronzé rosé brillant. — Nouvelles-Galles du Sud.

8. *C. irrorata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pl. 1, f. 4 (1839) (Australie).
9. *C. nubeculosa*, Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 176 (1848) (Australie).
var. *chalcoptera*, Germar, idem, p. 177.
10. *C. atrovioacea*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 52 (1879) (Australie).
11. *C. opima*, Thomson, idem, p. 50 (Australie).
12. *C. maculata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Ethon*, p. 5, pl. 1, f. 7 (1839) (Australie).
13. **C. aenea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 199 (1898) (Australie).
14. *C. pustulata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 51 (1879) (Tasmanie).
15. *C. duodecimmaculata*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 191 (1801) (Australie).
duodecimguttata, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 93 (1835).
quatuordecimnotata, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 213 (1845).
xanthosticta, Hope, Austral. Bupr. p. 11 (1832).
16. *C. cupreicollis*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 219 (1845) (Australie).
aeneicollis, Hope, idem, p. 220.
17. *C. stigmata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr., Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 3 (1839) (Australie).
18. *C. bicolor*, Castelnau & Gory, idem, *Ethon*, p. 3, pl. 1, f. 2 (Australie).
19. *C. leucosticta*, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 382 (1818) (Australie).
stellatula, Dalman, Anal. Ent. p. 54 (1823).
20. *C. regalis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 50 (1879) (Australie).
21. *C. viridicollis*, Thomson, idem, p. 50 (Sidney).
22. **C. aurulenta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 159 (1898) (Australie).
23. **C. ignicollis*, Kerremans, idem, p. 164 (Australie).
24. **C. cupriventris*, Kerremans, ibidem, p. 161 (Australie).
25. *C. viridiaurea*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Gayndah).
26. **C. morosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 158 (1898) (Australie).
27. **C. viridicuprea*, Kerremans, idem, p. 160 (Australie).
28. **C. fulgidifrons*, Kerremans, ibidem, p. 161 (Australie).
29. *C. cruciata*, Fabricius, Syst. Ent. p. 222 (1774) (Australie).
30. **C. splendida*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 160 (1898) (Australie).
31. *C. cuprifera*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 51 (1879) (Sidney).
32. *C. dimidiata*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Gayndah).
33. *C. semirugosa*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 51 (1879) (Sidney).
34. **C. lateralis*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 860 (1888) (Australie).
35. **C. nitida*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 164 (1898) (Australie).
36. *C. albosparsa*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 2 (1839) (Australie).
37. **C. cuprea*, nov. sp. (1) (Nouvelles-Galles du Sud).
38. **C. nitidicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 162 (1898) (Australie).
39. **C. violacea*, nov. sp. (2) (Gayndah).
40. *C. cupripennis*, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 65 (1835) (Australie).
41. **C. vicina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 165 (1898) (Australie).
42. **C. purpurea*, nov. sp. (3) (Sidney).
43. **C. nigroaenea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 162 (1898) (Australie).
44. **C. cyanura*, Kerremans, idem, p. 163 (Australie).
45. **C. viridis*, Kerremans, ibidem, p. 163 (Australie).

(1) Long. 6,5; larg. 2,3 mm. — Tête verte; pronotum bronzé cuivreux clair; élytres cuivreux pourpré brillant avec une légère impression villose et blanche vers le sommet; dessous verdâtre clair. — Tête et pronotum couverts de petites rides concentriques; élytres assez rugueux, la rugosité simulant des petites écailles et formant, sur les côtés antérieurs, des petits plis transversaux. Dessous couvert d'une courte villosité gris argenté retenant une pulvéru-
lence blanche. — Nouvelles-Galles du Sud.

(2) Long. 5,1; larg. 2-2,3 mm. — Oblong ovale assez convexe, ♂ tête verte, ♀ tête bronzé pourpré; pronotum bronzé pourpré; élytres noirs, couverts de taches villose blanches et irrégulières, vaguement disposées en séries transversales et plus nombreuses sur la moitié postérieure que sur l'antérieure. Tête subconvexe, à peine creusée au-dessus de l'épistome; pronotum couvert de petites rides sinueuses et transversales, le disque convexe, les côtés déprimés en arrière, la carène prémarginale subparallèle à la marge externe; élytres très finement rugueux à ponctuation fine. — Gayndah.

(3) Long. 5,5; larg. 2 mm. — Un peu plus large et moins convexe que *C. violacea* qui précède, d'une coloration générale plus vive et plus claire en dessus; tête et pronotum bronzé clair, élytres pourprés à marbrures villoseuses, transversales et blanchâtres, le fond des marbrures moins rouge, plutôt verdâtre, comme la région scutellaire; dessous, bronzé. Tête plus nettement déprimée en avant, finement sillonnée en arrière; pronotum plus brillant, moins convexe sur le disque; élytres couverts de fines rugosités simulant de très petites écailles. Dessous ponctué, couvert d'une courte villosité argentée.
— Australie: Sydney.

46. **C. tasmanica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 165 (1898) (Australie).
 47. **C. viridana*, Kerremans, idem, p. 175 (Australie).
 48. **C. fossicollis*, nov. sp. (1) (Nouvelles-Galles du Sud).
 49. **C. coraeoides*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 166 (1898) (Australie).
 50. **C. cincta*, Kerremans, idem (Australie).
 51. **C. pauperula*, Kerremans, ibidem, p. 167 (Australie).
 52. **C. nigrita*, Kerremans, ibidem, p. 168 (Australie).
 53. **C. Theryi*, nov. sp. (2) (Victoria).
 54. **C. inops*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 168 (1898) (Australie).
 55. **C. collaris*, nov. sp. (3) (Gayndah).
 56. **C. viridiceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 168 (1898) (Australie).
 57. **C. ornata*, nov. sp. (4) (Nouvelles-Galles du Sud).
 58. **C. rubicunda*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 169 (1898) (Australie).
 59. **C. modesta*, Kerremans, idem, p. 170 (Australie).
 60. **C. oblonga*, nov. sp. (5) (Australie).
 61. **C. semiobscura*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 170 (1898) (Australie).
 62. **C. puella*, Kerremans, idem (Australie).
 63. **C. curta*, nov. sp. (6) (Peak Downs).
 64. **C. simplex*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 171 (1898) (Australie).
 65. **C. frontalis*, Kerremans, idem, p. 157 (Nouvelle-Guinée).
 66. **C. fraterna*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 80 (1900) (Nouvelle Guinée).
 67. **C. pretiosissima*, Kerremans, idem, p. 14 (Sumatra).
68. *C. Albertisi*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 357 (1876) (Cap York).
 69. *C. apicalis*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1232 (1888) (Détroit de King).
 70. *C. bella*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 298 (1891) (Victoria).
 71. *C. chrysopygia*, Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 178 (1848) (Australie).
 72. *C. constricta*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 254 (1887) (Australie).
 73. *C. dispar*, Blackburn, idem, p. 297 (1891) (Victoria).
 74. *C. elongatula*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 862 (1888) (Australie).
 75. *C. fulgidicollis*, Mac Leay, idem, p. 1231 (1888) (Détroit de King).
 76. *C. Gouldi*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 219 (1845) (Australie).
 77. *C. impressicollis*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Gayndah).
 78. *C. lapidosa*, Mac Leay, Kings Surv. Vol. 2, p. 197 (1827) (Australie).
 79. *C. Lindi*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 254 (1887) (Australie).
 80. *C. meditabunda*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 183 (1787) (Amérique méridionale?)

(1) Long. 4,5; larg. 1,6 mm. — Oblong ovale, assez convexe, atténué en arrière, entièrement vert obscur mais très brillant et non métallique avec deux vagues lignes onduleuse, blanches et préapicales sur les élytres. Front nettement impressionné en avant et sillonné en arrière; pronotum profondément impressionné de chaque côté, la carène prémarginale anguleuse; élytres longitudinalement impressionnés contre la suture sur la moitié postérieure. — Nouvelles-Galles du Sud.

(2) Long. 5,5; larg. 1,8 mm. — Oblong ovale, médiocrement convexe, atténué en arrière, d'un vert doré, parfois bronzé, parfois bleuâtre, les élytres parsemés de mouchetures villeuses, blanches, assez grandes, peu nombreuses, parfois confuses. Tête finement granuleuse, claire et mate, finement sillonnée en arrière; pronotum couvert de rides sinueuses et transversales, le disque peu convexe, les côtés faiblement déprimés; élytres rugueux et finement ponctués, la rugosité simulant des petites écailles. Dessous couvert d'une courte villosité retenant une pulvéruleuse blanche. — Victoria.

(3) Long. 4,5; larg. 1,3-1,7 mm. — Petit, oblong, assez convexe; tête, pronotum et dessous d'un beau vert émeraude brillant; élytres noirs avec quelques marbrures blanches, peu nettes. Tête impressionnée en avant et sillonnée en arrière; pronotum assez convexe, profondément déprimé sur le côté et le long de la base; élytres couverts de rugosités simulant des petites écailles avec quelques vagues rides transversales en avant, sur les côtés. — Gayndah.

(4) Long. 4,7; larg. 2 mm. — Voisin du *C. collaris*, mais d'un faciès plus trapu et plus robuste, le front plus large et plus creusé en arrière, le pronotum moins profondément impressionné sur les côtés, les rides plus nettes; les mouchetures élytrales plus grandes et plus arrondies; la rugosité élytrale plus accentuée. — Peut-être une variété du *collaris*, dont il a tout le système de coloration. Je ne l'en sépare que pour l'allure du sillon du pronotum et pour le faciès de celui-ci, entièrement différents. — Nouvelles-Galles du Sud.

(5) Long. 4; larg. 1,5 mm. — Oblong, assez convexe, arrondi en avant et en arrière, entièrement bronzé pourpré sombre, les élytres ornés de vagues mouchetures villeuses et blanchâtres; dessous couvert d'une courte villosité blanche. — Tête faiblement impressionnée en avant et sillonnée en arrière; pronotum peu convexe, couvert de très fines rides sinueuses, déprimé sur les côtés le long de la base, la carène prémarginale parallèle à la marge latérale; élytres couverts de rugosités simulant de très petites écailles. — Australie.

(6) Long. 3,5; larg. 1,6 mm. — Plus trapu et plus large que l'*oblonga*, la coloration générale semblable, mais un peu plus sombre, la tête et le pronotum plus larges, le sillon frontal plus net, l'impression latéro-basale du pronotum plus large, mais moins profonde, les élytres plus courts, un peu évidés le long de la suture au sommet, le dessin villeux à peine indiqué, le dessous moins villeux, les antennes verdâtres et obscures; le *C. simplex*, qui suit, est tout autrement coloré et également moins trapu. — Australie : Peak Downs.

81. *C. minutissima*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 54 (1879) (Adélaïde).
82. *C. nigripennis*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1231 (1888) (Détroit de King).
83. *C. nigromaculata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 218 (1895) (Malacca).
84. *C. notula*, Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 178 (1848) (Australie).
85. *C. obscura*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 252 (1887) (Australie).
86. *C. occidentalis*, Blackburn, idem, p. 255 (Australie).
87. *C. parva*, Blackburn, ibidem (Australie).
88. *C. perplexa*, Blackburn, ibidem, p. 300 (1891) (Australie occidentale).
89. *C. purpureotincta*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 3, p. 1232 (1888) (Détroit de King).
90. *C. pygmaea*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 299 (1891) (Victoria).
91. *C. rugiceps*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 52 (1879) (Australie).
92. *C. semiscabrosa*, Thomson, idem, p. 53 (Australie).
93. *C. sexnotata*, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 181 (1891) (Nouvelle-Calédonie).
94. *C. signaticollis*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 219 (1845) (Australie).
95. *C. simplex*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 860 (1888) (Australie).
96. *C. subcarenifrons*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 53 (1879) (Melbourne).
97. *C. suturalis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 60 pl. 4, f. 26 (Australie).
98. *C. uniformis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 53 (1879) (Melbourne).
99. *C. verna*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 14, p. 299 (1891) (Victoria).
100. *C. Westwoodi*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coræbus*, p. 15, pl. 4, f. 24 (1839) (Australie).

10. GENUS NEOCORÆBUS, NOV. GEN.

Caractères. — Tête rugueuse et convexe, nettement sillonnée; front bituberculé au-dessus des cavités antennaires; épistome court et large, bilobé en avant avec une échancrure médiane anguleuse; joues armées d'une dent aiguë; cavités antennaires grandes, transversales et presque contiguës. — Antennes médiocres, dentées à partir du 5^e article; 1 épais; 2 plus court, obconique; 3 et 4 un peu plus longs que 2, égaux entre eux et subcylindriques; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques et parallèles. — Pronotum plus large que haut, bombé sur le disque, déprimé sur les bords; la marge latérale crénelée; l'antérieure fortement bisinuée avec un lobe médian large et très avancé sur le vertex et les angles de devant avancés et aigus; la postérieure sinueuse avec un lobe médian tronqué. — Ecusson grand, cordiforme, acuminé en arrière et déprimé dans son milieu. — Elytres convexes, squamulés, sinués à la base; le sommet conjointement arrondi et dentelé; largement et peu profondément évidés le long de la suture. — Marge antérieure du prosternum faiblement rebordée, un peu échancrée en arc; prosternum court et large, bombé, évidé dans son milieu en avant et subtronqué en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine sensibles entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum à peine échancré en avant. — Hanches postérieures non dilatées au côté interne et dilatées à l'externe, remontant sur les côtés avec la marge antérieure très sinueuse, la postérieure droite. — Fémurs normaux, subfusiformes, les postérieurs un peu arqués au sommet; tibias un peu recourbés à la base, carénés sur leur bord externe, les postérieurs ciliés sur ce bord; tarses courts et comprimés, le premier article des postérieurs à peine plus long que le suivant; crochets bifides. — Corps oblong, écourté, convexe et un peu plus aminci en avant qu'en arrière.

Je fonde ce genre pour une espèce de l'Abyssinie que j'avais placée parmi les *Amorphosoma*. Il présente les caractères des *Coræbus*, mais avec un faciès particulier, les tubercules frontaux plus nets, les prosternum court, large et bombé et les antennes dentées à partir du 5^e article.

Distribution géographique de l'espèce. — Ce genre habite l'Abyssinie, d'où l'on ne connaît qu'une seule espèce.

1. **N. abyssinicus*, Kerremans Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 230 (1899) (Abyssinie).

11. GENUS CHLORICALLA, KERREMANS

Chloricalla. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 119 (1898).

Caractères. — Tête creusée dans toute sa longueur; épistome faiblement bisinué avec une large échancrure médiane peu profonde; séparé du front par un sillon bisinué; joues inermes; cavités antennaires grandes et arrondies. — Antennes assez courtes, dentées à partir du 5^e article; le 1^{er} épais, obconique, le 2^e allongé, moins épais, obconique; 3 et 4 plus courts, légèrement élargis en avant, les suivants transversaux, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, ovalaires, un peu obliques, atténués et légèrement rapprochés en arrière sur le vertex. — Pronotum trapézoïdal; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé et arrondi, les côtés obliques avec la marge latérale lisse, caréniforme, arquée et invisible en dessus. — Ecusson grand, en triangle équilatéral. — Elytres peu convexes, leur base sinueuse, le calus huméral bien marqué, la marge latérale rebordée, le rebord plus fin vers le sommet; celui-ci denticulé. — Prosternum allongé, élargi et avancé en avant, largement arrondi en arrière, surplombant les hanches antérieures, la marge antérieure avancée sur le menton et formant une courte mentonnière. — Branches latérales du mésosternum très courtes et refoulées sur les côtés. — Métasternum largement échancré en avant. — Hanches postérieures peu dilatées au côté interne, l'externe remontant sur les côtés, les marges à sinuosités inversement égales. — Fémurs et tibias normaux, les premiers sufusiformes, les seconds grêles et subcylindriques; les postérieurs ciliés sur leur tranche externe; tarses assez courts, leurs quatre premiers articles subégaux entre eux et comprimés, le 5^e presque aussi long que les suivants réunis, obconique et élargi au sommet; crochets dentés.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce décrite de ce genre provient de Madagascar; je crois en avoir remarqué une seconde, inédite, dans la collection Meyer-Darcis.

1. **C. gratiosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 120 (1893).

12. GENUS CORÆBUS, CASTELNAU & GORY

Coræbus. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 79 (1857); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 110 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 113 (1864); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 412 (1865).

Caractères. — Tête convexe, plus ou moins sillonnée; épistome court et large, plus ou moins sinué en avant, séparé du front par une carène subsinueuse et lisse; joues armées d'une dent aiguë ou obtuse; cavités antennaires grandes, transversales et un peu obliques. — Antennes assez longues, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} épais, obconique; 2 et 3 moins épais, obconiques, subégaux entre eux; les suivants triangulaires, épaissis au bout, dentés du côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux elliptiques, assez grands et parallèles. — Pronotum plus large que haut, bombé, plus ou moins caréné le long des bords; la marge latérale finement crénelée; l'antérieure faiblement bisinuée avec un large lobe médian arqué; la base sinueuse avec un lobe médian tronqué. — Ecusson large, triangulaire ou cordiforme. — Elytres squamulés ou ponctués, lobés et sinués à la base, le sommet variable, arrondi ou tronqué. — Prosternum assez court, tronqué en avant, parfois finement rebordé mais sans mentonnière distincte, atténué au sommet en pointe obtuse. — Mésosternum divisé, ses branches latérales très courtes et refoulées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum plus ou moins échancré en avant. — Hanches postérieures peu dilatées au côté interne, l'externe remontant en avant; la marge antérieure très sinueuse, la postérieure presque droite. — Fémurs normaux, subfusiformes; tibias subcylindriques, un peu aplanis, les postérieurs ciliés sur leur tranche externe, parfois crénelés; tarses courts et comprimés, le premier article des postérieurs à peine plus long que le suivant; crochets bifides. — Corps ovale oblong, assez convexe.

Distribution géographique des espèces. — Les espèces de ce genre sont disséminées en Europe, en Asie et dans le nord de l'Afrique. On en connaît quelques unes de la Malaisie, mais le genre ne paraît pas être représenté en Amérique, en Australie, ni dans l'Afrique cis-saharienne. Les espèces signalées de l'Abyssinie et de Madagascar et que je n'ai pas sous les yeux, n'appartiennent probablement pas au genre *Corabus* et j'ai des doutes quant à l'espèce australienne de M. Blackburn.

1. **C. dentipennis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 78 (1900) (Manipour).
2. **C. ignifrons*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 174 (1895) (Lang-Song).
3. **C. purpureus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 78 (1900) (Sumatra).
4. **C. quadraticollis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 174 (1895) (Lang-Song).
5. *C. bajulus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 122 (1864) (Céram).
6. **C. pertusicollis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 66, p. 110 (1897) (Guinée).
7. *C. quadrirundulatus*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 165 (1866) (Japon).
8. **C. sulcicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 215 (1895) (Chine, Inde).
9. *C. costatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 54 (1879) (Siam).
10. *C. Bedeli*, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 113 (1895) (Ho-Chan).
* *chinensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 214 (1895).
11. **C. aeneicollis*, Kerremans, idem, p. 216 (Thibet).
12. *C. Cloueti*, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 112 (1895) (Ho-Chan).
13. *C. Dollei*, Théry, idem, p. 114 (Ho-Chan).
* *amabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 216 (1895).
14. **C. semipurpureus*, Fairmaire, Rev. d'Ent. Caen, Vol. 7, p. 347 (1888) (Birmanie).
* *Feae*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 811 (1892).
15. **C. transversus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 79 (1900) (Leite).
16. **C. murinus*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 67 (1888) (Andaman).
17. **C. Beauchenei*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 7, p. 346 (1888) (Tonkin).
* *fossulatus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 812 (1892).
18. **C. magnus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 156 (1898) (Nias).
19. **C. thoracellus*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 320 (1900) (Chine méridionale).
20. **C. Gestroi*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 813 (1892) (Birmanie).
21. **C. Davidis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 332 (1886) (Yunnan).
22. **C. caeruleus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 200 (1892) (Birmanie).
23. **C. suturalis*, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 341 (1893) (Hindoustan).
24. **C. bifasciatus*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 34, p. 46, pl. 11, f. 123 (1790) (Europe, etc.).
florentinus, Herbst, Col. Vol. 9, p. 178, pl. 154, f. 10 (1801).
* *bifasciatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 416 (1865).
25. *C. undatus*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 182 (1787) (Europe, etc.).
quadrifasciatus, Rossi, Fauna Etrur. Vol. 1, p. 187, pl. 4, f. 6-7 (1790).
pruni, Panzer, Fauna Germ. pt. 29, p. 21 (1796).
* *undatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 417 (1865).
26. **C. Sidae*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 67 (1888) (Tonkin).
* *intricatus*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 7, p. 347 (1888).
27. *C. rubi*, Linné, Syst. Nat. (ed. 12), Vol. 1, p. 661 (1767) (Europe, etc.).
nebulosus, Scopoli, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 5, p. 104 (1772).
* *rubi*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 418 (1865).
28. *C. gongis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 278, pl. 46, p. 270 (Himalaya).
* *gentilis*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 205 (1890).
29. **C. fulgidiceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 203 (1892) (Hindoustan).
30. *C. elatus*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 184 (1787) (Europe, etc.).
sinuatus, Panzer, Fauna Germ. pt. 35, p. 13 (1796).
sepulchralis, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 215 (1801).
aeruginosus, Latreille, Hist. Nat. Vol. 9, p. 69 (1804).
lapsanae, Bonelli, Mem. Soc. Agr. Torino, Vol. 9, p. 176, pt. 4, n° 24 (1804).
metallicus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 14, pl. 3, f. 20 (1839).
pruinosis, Küster, Käf. Eur. Vol. 5, p. 53 (1846).
subfasciatus, Küster, idem, p. 4.
* *elatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 418 (1865).
repletus, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 277 (1896).
cylindreus, Abeille, idem, p. 277.

31. *C. acueatus*, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 24 (1890) (Chine).
32. *C. acutus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 54 (1879) (Shanghai).
33. *C. analis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 518 (1867) (Penang).
34. *C. aureolus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 136 (1893) (Biskra).
35. *C. carinifer*, Abeille, idem, p. 280 (1891) (Région méditerr.)
36. *C. chloropictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 202 (1892) (Hindoustan).
37. *C. cingulatus*, Hope, Gray, Zool. Misc. Vol. 1, p. 25 (1831) (Népal).
38. *C. circularis*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 68 (1888) (Hindoustan).
39. *C. cisseeoides*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 319 (1874) (Philippines).
40. *C. coelestis*, Saunders, idem, p. 319 (Philippines).
41. *C. collaris*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 2 (1839) (Bengale).
42. *C. conjunctus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 125 (1864) (Bornéo).
43. *C. conspicuus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 81 (1878) (Inde).
44. *C. cornutus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 125 (1864) (Batchian).
45. *C. cupricollis*, H. Deyrolle, idem, p. 124 (Dorey).
46. *C. cupulariae*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 282 (1891) (Région méditerranéenne).
47. *C. cyaneopictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 201 (1892) (Birmanie).
48. *C. delicatulus*, Kerremans, idem, Vol. 39, p. 214 (1895) (Chine).
49. *C. denticollis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 313 (1866) (Laos).
50. *C. dorsalis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 200 (1892) (Bengale).
51. *C. hastanus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 10, pl. 2, f. 14 (1839) (Bengale).
52. *C. Heydeni*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 34 (1897) (Syrie).
53. *C. ignotus*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 512 (1873) (Japon).
54. *C. insignis*, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 83 (1898) (Madagascar).
55. *C. foannisi*, Théry, idem, p. 111 (1895) (Ho-Chan).
56. *C. longipennis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 121 (1864) (Sumatra).
57. *C. maculifer*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 33 (1897) (Région méditerranéenne).
Oertzeni || Abeille, idem (1896).
58. *C. macleassus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 229 (1898) (Madagascar).
59. *C. melibaeiformis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 321 (1874) (Philippines).
60. *C. Modiglianii*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 528 (1894) (Sumatra).
61. *C. nigroviolaceus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 120 (1864) (Makian).
62. *C. niponicus*, Lewis, Ent. Monthl. Mag. (2), Vol. 5, p. 244 (1894) (Japon).
63. *C. Oberthuri*, Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) Vol. 8, p. 335 (1896) (Japon).
64. *C. Oertzeni*, Ganglbauer, Stett. Ent. Zeit. p. 309 (1886) (Grèce).
65. *C. Pascoci*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 318 (1866) (Penang).
66. *C. piliferus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 126 (1864) (Bornéo).
67. *C. pilosicollis*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 301 (1891) (Queensland).
68. *C. pulchellus*, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. Vol. 40, p. 304 (1895) (Shan States?).
69. *C. pullatus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 320 (1874) (Philippines).
70. *C. purpureicollis*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova. Vol. 9, p. 358 (1877) (Célèbes).
71. *C. quadrispinosus*, Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 207 (1891) (Kiu-Siang).
72. *C. rugosus*, H. Deyrolle, Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 123 (1864) (Bornéo).
73. *C. rusticanus*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 331 (1892) (Japon).
74. *C. semiviolaceus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 123 (1864) (Bornéo).
75. *C. sericeus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 528 (1894) (Sumatra).
76. *C. smaragdineus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 203 (1892) (Bengale).
77. *C. spinosus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 10, pl. 2, f. 13 (1839) (Philippines).
Laportei, Saunders, Cat. Bupr. p. 104, n° 18 (1871).
78. *C. sumatrensis*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 527 (1894) (Sumatra).
79. *C. violaceipennis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 313 (1866) (Laos).

13. GENUS BRACHYCORAEBUS, NOV. GEN.

Caractères. — Tête convexe, sillonnée sur toute sa longueur; épistome très court, bilobé avec une échancrure médiane anguleuse, sans carène qui le sépare du front; joues armées d'une dent peu accusée et obtuse; cavités antennaires grandes, elliptiques et un peu obliques. — Antennes courtes, insérées à leur base dans une rainure non prolongée sur l'épisternum prothoracique, dentées à partir du 4^e article; 1 et 2 assez épais, subégaux entre eux; 3 obconique, un peu plus court et plus grêle que 2; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques et parallèles. — Pronotum plus large que haut, bombé, à carène prémarginale peu accusée; la marge latérale crénelée; l'antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé et arqué; la base bisinuée avec un lobe médian tronqué, souvent surmontée d'un sillon parallèle. — Ecusson large, plan, cordiforme et acuminé en arrière. — Elytres convexes, déclives en arrière, couverts de petites squamules subimbriquées; le sommet conjointement arrondi et très finement dentelé. — Marge antérieure du prosternum tronquée et à peine arquée; prosternum, large, plan, à peine arrondi en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine sensibles entre les hanches antérieures et les postérieures. — Mésternum tronqué en avant. — Hanches postérieures très étroites, leurs côtés parallèles à partir du côté interne jusque vers le côté externe, où elles se relèvent en s'élargissant plus fort en avant qu'en arrière. — Fémurs subfusiformes, légèrement courbes au sommet; tibias simples, les postérieurs un peu plus aplanis, légèrement creusés en dedans et élargis sur leur face externe, celle-ci ciliée; tarses courts, fortement lamellés, le premier article des postérieurs aussi court que le suivant: crochets dentés. — Corps écourté et convexe, ovoïde, atténué en arrière, vilieux.

Ce genre se rapproche, par ses caractères, des *Coraebus* et des *Melibaeus*, mais il ne présente pas le faciès des espèces de ces deux genres. Il ressemble à certains *Trachys* à forme convexe et ovoïde.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que trois espèces de ce genre, dont deux découvertes dans l'île de Sumatra et la troisième en Nouvelle-Guinée.

1. **B. viridis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 13 (1900) (Sumatra).
2. **B. picturellus*, Kerremans, idem (Sumatra).
3. **B. vicinus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 320 (1900) (Nouvelle-Guinée).

14. GENUS MELIBÆUS, H. DEYROLLE

Melibaeus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 132 (1864).

Caractères. — Tête convexe, plus ou moins sillonnée; épistome court et large, sinueux, échancré en arc au milieu, séparé du front par une carène sinueuse et transversale; joues armées d'une dent assez aiguë, plus ou moins longue; cavités antennaires grandes, subelliptiques et un peu obliques. — Antennes médiocres, dentées à partir du 4^e, du 5^e ou même du 6^e article, ceux-ci affectant alors graduellement la forme normale des articles dentés; 1 épais, obconique; 2 et 3 moins épais, obconiques et subégaux entre eux; les suivants triangulaires, épaissis au bout et dentés du côté interne, munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques et parallèles. — Pronotum plus large que haut, bombé, plus ou moins caréné le long du bord; la marge latérale lisse; l'antérieure plus ou moins sinueuse, mais toujours avec un large lobe médian arqué; la postérieure bisinuée avec un lobe médian tronqué. — Ecusson large, triangulaire, acuminé au sommet. — Elytres squamulés ou ponctués, lobés et sinueux à la base, le sommet toujours arrondi et plus ou moins déclive. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière plus ou moins accentuée, mais toujours bilobée entre une échancrure médiane plus ou moins profonde, cette mentonnière formée parfois de deux lobes semicirculaires non contigus; prosternum court, un peu bombé, atténué en arrière en pointe obtuse. — Mésosternum

divisé, ses branches latérales très courtes et refoulées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum plus ou moins échancré en avant. — Hanches postérieures faiblement dilatées au côté interne, le côté externe dilaté en avant; la marge antérieure très sinueuse, la postérieure presque droite. — Fémurs normaux, subfusiformes; tibias subcylindriques, un peu aplanis, les postérieurs faiblement dilatés au milieu de leur tranche interne et ciliés le long de celle-ci; tarses courts et comprimés, leurs articles subégaux entre eux, le premier des postérieurs à peine plus long que le suivant; crochets bifides. — Corps ovale oblong, convexe, plus ou moins allongé.

La plupart des auteurs ont hésité à admettre ce genre ou l'ont maintenu à titre de division des *Coræbus*, dont il peut être séparé en raison de la constance de deux caractères : les bords du pronotum non crénelés et la mentonnière bilobée de la marge antérieure du prosternum.

Distribution géographique des espèces. — Il s'étend plus au sud en Afrique que les *Coræbus* et, comme ceux-ci, ne se trouve ni en Australie ni en Amérique.

1. **M. levipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 302 (1892) (Assinie).
2. **M. violaceicollis*, Kerremans, idem (Assinie).
3. *M. aurofasciatus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 312, pl. 21, f. 6 (1866) (Siam).
Mouhoti, Saunders, Cat. Bupr. p. 105, n° 1 (1871).
4. **M. transversus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 814 (1892) (Birmanie).
5. **M. magnificus*, Kerremans, idem, p. 816 (Birmanie).
6. **M. minutus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 339 (1893) (Bengale).
7. *M. aeneifrons*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 134 (1864) (Sumatra).
8. *M. Saundersi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 233 (1892) (Laos).
cupricollis || Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 7, p. 314 (3), (1867).
9. **M. coelestis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 14 (1900) (Sumatra).
10. **M. chrysomelinus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 205 (1892) (Bengale).
11. **M. venustus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 815 (1892) (Birmanie).
12. **M. leonensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 315 (1898) (Sierra Leone).
13. **M. Kraatzi*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 275 (1899) (Cameroon).
14. **M. fasciatus*, Kerremans, ibidem, p. 276 (Togo).
15. **M. aeneus*, Kerremans, ibidem, p. 275 (Usamaro).
16. *M. crassus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 31, pl. 8, f. 39 (1839) (Afrique mér.).
Coesareus, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 351 (1851).
17. *M. callosicollis*, Fahreus, idem, p. 348 (Cafferie).
18. **M. nitidiventris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 316 (1898) (Vieux-Calabar).
19. **M. albopilosus*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 274 (1899) (Tabora).
20. **M. somalicus*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 317 (1898) (Somalis).
21. **M. splendidiventris*, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 278 (1899) (Cameroon).
22. *M. cuprinus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coræbus*, p. 11, pl. 3, f. 16 (1839) (Cap de B.-Esp.).
23. **M. transvalensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 316 (1898) (Transvaal).
24. **M. congolanus*, Kerremans, idem, p. 315 (Congo).
25. *M. bisetus*, Thunberg, Act. Nov. Upsal, Vol. 9, p. 50 (1827) (Cap de Bonne-Espérance).
viridanus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coræbus*, p. 11, pl. 3, f. 15 (1839).
26. *M. amethystinus*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 83, pl. 11, f. 128 (1790) (Europe, etc.).
nitens, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 215 (1801).
granulatus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coræbus*, p. 15, pl. 4, f. 23 (1839).
chalybeus, Küster, Col. Eur. pt. 24, p. 64 (1852).
* *amethystinus*, Kiesenwetter, Deut. Ins. Vol. 4, p. 115 (1857).
* *amethystinus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 426 (1865).
27. **M. violaceus*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 115 (1857) (Syrie, Caucase).
* *violaceus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 427 (1865).
28. *M. robustus*, Küster, Col. Eur. pt. 24, p. 62 (1852) (Caucase).
29. *M. cyaneus*, Ballion, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 43, p. 350 (1871) (Turkestan).
30. *M. parvulus*, Küster, Col. Eur. pt. 24, p. 63 (1852) (Russie).
* *parvulus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 428 (1865).

31. *M. episcopalis*, Mannerheim, Bupr. p. 105 (1837) (Europe méridionale).
purpureus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Corabus*, p. 15, pl. 3, f. 18 (1839).
** episcopalis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 420 (1865).
var. gemmeus, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 280 (1896).
 32. *M. fulgidicollis*, Lucas, Expl. Alg. Ent. p. 153, pl. 16, f. 3 (1846) (Algérie).
** fulgidicollis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 425 (1865).
 33. *M. saginatus*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 115, note 7 (1857) (Europe méridionale).
** saginatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 421 (1865).
 34. *M. subulatus*, Morawitz, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 284 (1891) (Russie méridionale).
** subulatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 1, p. 51 (1863).
 35. *M. Santolinae*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 280 (1896) (Aude).
 36. ** M. Theryi*, Abeille, p. 135 (1893) (Algérie).
 37. *M. gibbicollis*, Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 239 (1803) (Portugal).
 38. *M. graminis*, Panzer, Fauna Germ. p. 56 (1789) (Europe, etc.).
cylindraceus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Corabus*, p. 14, pl. 3, f. 21 (1839).
Comolii, Villa, Cat. p. 29 (1844).
** graminis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 422 (1865).
 39. *M. aeratus*, Mulsant, Opusc. Ent. Vol. 13, p. 10 (1863) (France méridionale).
 40. *M. Reitteri*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 212 (1890) (Caucase, etc.).
var. caucasicus, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 282 (1896).
 41. *M. aeneicollis*, Villers, Ent. Vol. 1, p. 340 (1789) (France méridionale).
aeneicollis, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 424 (1865).
-
42. *M. aeneiventris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 135 (1864) (Bornéo).
 43. *M. aeneopictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 217 (1895) (Bengale).
 44. *M. Annon*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 279, pl. 46, f. 271 (1841) (Bengale).
 45. *M. aurarius*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 205 (1892) (Birmanie).
 46. *M. bipartitus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 135 (1864) (Célèbes).
 47. *M. carinatus*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 32, p. 181 (1888) (Afrique centrale).
 48. *M. chlorolineatus*, Quedenfeldt, idem, Vol. 30, p. 22 (1886) (Angola).
 49. *M. coerulesus*, Thunberg, Nov. Sp. Ins. Vol. 5, p. 91 (1789) (Cap de Bonne-Espérance).
 50. *M. contubernalis*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 353 (1851) (Gariep).
 51. *M. cryptocerus*, Kiesenwetter (1) Berl. Ent. Zeit. p. 247 (1858) (Grèce).
 52. *M. cupreicollis*, Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3), Vol. 3, p. 258 (1853) (Ceylan).
 53. *M. cupreolus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 283 (1896) (Algérie).
 54. *M. cupreomarginatus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (3), Vol. 5, p. 312 (1866) (Laos).
 55. *M. cylindricollis*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 365 (1851) (Caffrerie).
 56. *M. Delaunayi*, van de Poll, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 18 (1892) (Hué).
 57. *M. dermestoides*, Thomson, Typ. Bupr. p. 81 (1878) (Cap de Bonne-Espérance).
 58. *M. fraternus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 354 (1851) (Gariep).
 59. *M. graminoides*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 281 (1896) (Russie méridionale).
 60. *M. indicolus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 204 (1892) (Bengale).
 61. *M. miliaris*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 32, pl. 7, f. 40 (1839) (Madagascar).
 62. *M. nigripennis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 134 (1864) (Bornéo).
 63. *M. nigrococruleus*, H. Deyrolle, idem, p. 133, pl. 3, f. 4 (Waigiou).
 64. *M. nodifrons*, Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4^e) Vol. 2, p. 105 (1868) (Vieux-Calabar).
 65. *M. nodosus*, Thunberg, Act. Nov. Upsal. Vol. 9, p. 50 (1827) (Cap de Bonne-Espérance).
 66. *M. notatus*, Thunberg, Nov. Sp. Ins. Diss. Vol. 5, p. 98 (1789) (Cap de Bonne-Espérance).
 67. *M. parellinus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 349 (1851) (Caffrerie).
psittacus, Fahreus, idem, p. 350.
 68. *M. purpuratus*, Fahreus, ibidem, p. 352 (Caffrerie).
 69. *M. pygmaeus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 70, pl. 15, f. 94 (Cap de B. Esp.).
 70. *M. rufipectus*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. p. 21, pl. 1, f. 11 (1886) (Angola).

(1) Cette espèce n'est vraisemblablement pas un *Melibaenus*, ni un *Corabus*.

71. *M. Sacchii*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 504 (1899) (Abyssinie).
72. *M. sculpticollis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 280 (1896) (Stolac).
73. *M. setulosus*, Boheman, Oefv. Vet. Akad. Förh. p. 21 (1860) (Ngami).
74. *M. tribulis*, Falderman, Faun. Trans. Vol. 1, p. 157 (1835) (Caucase).
75. *M. trisulcus*, Thunberg, Act. Nov. Upsal. Vol. 9, p. 49 (1826) (Cap de Bonne-Espérance).
76. *M. virens*, Thunberg, idem (Cap de Bonne-Espérance).

15. GENUS METASAMBUS, NOV. GEN.

Caractères. — Tête inclinée; front bombé en arrière et sillonné sur toute sa longueur; épistome faiblement bilobé en avant avec une large échancrure médiane et peu arquée, séparé du front par une carène subsinueuse; joues inermes; cavités antennaires assez grandes, subcontiguës. — Antennes médiocres, dentées à partir du 5^e article; 1 et 2 assez épais, subégaux entre eux; 3 aussi long que 2, mais plus grêle, obconique; 4 très court, obconique; les suivants élargis, dentés et acuminés au côté interne, munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques, plus séparés en arrière sur le vertex que vers la bouche. — Pronotum plus large que haut, très convexe sur le disque, aplani sur les côtés et le long de la base; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé; les côtés dilatés et arrondis avec la marge latérale crénelée; la base bisinuée avec un lobe médian subtronqué; une carène latérale sinueuse plus ou moins nette. — Ecusson déprimé, en triangle plus long que large, acuminé au sommet. — Elytres rugueux et squamulés, couverts d'un dessin formé par une villosité blanche, arrondis à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, largement tronqués et finement dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum avec une très courte mentonnière bilobée; prosternum rétréci et subacuminé en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine visibles. — Mésternum étroitement échancré en avant. — Hanches postérieures non dilaiés au côté interne, l'externe remontant en avant, les marges parallèles, sauf sur les côtés externes où elle sont divergentes. — Pattes peu robustes; fémurs normaux; tibias droits sur leur bord interne, tranchants et dilatés sur la région inférieure du côté externe; tarses courts, comprimés, leurs articles subégaux entre eux; crochets bifides. — Corps allongé, oblong; arrondi en avant et tronqué en arrière.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre habite l'île de Sumatra.

1. **M. Weyersi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 12 (1900) (Sumatra).

16. GENUS PAREUMERUS, H. DEYROLLE

Pareumerus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 115 (1864).

Caractères. — « Une mentonnière au prosternum; cavité sternale de grandeur normale; tibias » à l'état normal, c'est-à-dire non dilatés; mentonnière entière ou largement et peu profondément » échancrée, mais jamais divisée par le milieu; cuisses postérieures non ou rarement renflées, dans ce » dernier cas de la couleur des autres pattes et les tibias correspondants n'ayant pas d'espace cilié au » milieu; premier article des tarses court; antennes libres au repos ou du moins jamais logées dans » d'étroits sillons latéraux du prothorax; corps droit en dessus, pas de carènes sur les côtés du prothorax » en dessous, écusson en carré arrondi prolongé en pointe en arrière. »

Je reproduis les différents paragraphes mentionnés dans le tableau de H. Deyrolle, relatif au groupement des Agrilites, seuls caractères énumérés par cet auteur pour fonder son genre *Pareumerus*, que je crois valable, bien que la seule espèce qui en fait partie me soit inconnue.

Distribution géographique de l'espèce. — Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, propre au Brésil.

1. *P. imperator*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Eumerus*, p. 2, pl. 1, f. 1 (1839) (Brésil).

17. GENUS EUAMYIA, KERREMANS

Eumerus || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 116 (1804).

Rhaeboscelis † Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 81 (1857).

Caractères. — Tête largement creusée en avant, entre les yeux; épistome échancré entre deux lobes arrondis; joues armées d'une courte dent obtuse; cavités antennaires grandes et arrondies. — Antennes médiocres dentées à partir du 6^e article; 1 renflé; 2 ovoïde, presque aussi épais que 1; 3 à 5 grêles, allongés, cylindriques et subégaux entre eux; les suivants dentés en scie aiguë et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, un peu obliques et plus écartés en arrière, sur le vertex, que vers la bouche. — Pronotum plus large que haut, convexe sur le disque, déprimé au milieu de la base et sur les côtés; la marge antérieure sinueuse avec les angles de devant plus avancés que le lobe médian; les côtés arqués; la base sinueuse avec un large lobe médian avancé et tronqué. — Ecusson large, tronqué en avant, arrondi sur les côtés et bisinué en arrière avec le sommet aigu. — Elytres très convexes, déprimés à la base et sur les côtés, ces dépressions limitant un calus huméral épais, saillant et oblique; les côtés élargis au tiers postérieur; le sommet conjointement arrondi et finement dentelé. — Prosternum muni d'une mentonnière saillante et tronquée; obtusément acuminé au sommet et rebordé sur son pourtour. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très étroites et à peine distinctes entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum échancré en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté interne et à l'externe, la dilatation remontant vers le sternum; la marge antérieure très sinueuse, la postérieure droite. — Fémurs fusiformes, les antérieurs finement crénelés sur leur tranche interne; tibias normaux, subcylindriques, les postérieurs ciliés sur leur bord externe; tarses moins courts et moins comprimés que chez les genres précédents, leurs articles plus dilatés au sommet, le premier article des postérieurs un peu plus long que le suivant; crochets épais, obtusément dentés au côté interne. — Corps épais, écourté, très convexe et élargi au tiers postérieur.

Lacordaire rejette avec raison le nom d'*Eumerus*, adopté par Castelnau & Gory, puisqu'il a été employé pour des Diptères et des Hémiptères, mais il a tort de confondre les *Eumerus*, avec les *Rhaeboscelis* de Chevrolat. Il y a donc lieu de donner un nom nouveau aux *Eumerus*, et je proposerai celui de **Euamyia**.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre habite le Brésil.

1. *E. chryselytria*, Perty, Del. Anim. p. 19, pl. 4, f. 14 (1830) (Brésil).

carbuncula, Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 68, pl. 5, f. 2 (1833).

18. GENUS AMYIA, THOMSON

Amyia. Saunders, Cat. Bupr. p. 111 (1871) non décrit; Thomson, Typ. Bupr. p. 83 (1878).

Caractères. — « *Corpus* valde convexum, dorso subdepressum. *Caput* vix concavum: antennae » breves, art. 1-5 moniliformibus, coeteris pectinatis, cavitatibus magnis, prope oculos sitis. *Prothorax* » declivis, transversus, antice et praecipue postice sinuatus, lateribus rotundatus et marginatus. *Scutellum* » triangulare. *Elytra* convexa, lateribus medio lunata, post dimidium latiora, lateribus posticis minute

» denticulata, apice oblique separata et rotundata. *Prosterni appendix* sat lata et brevis, in mesosterni » recepta. *Abdomen* convexum. *Pedes* mediocres; femora omnia subtus minute dentata; tibiae paulo intus » arcuatae; tarsi paulo dilatati.

» OBSERVATIONS. — Très voisin du genre *Eumerus* Gory, dont il se distingue de la façon suivante : » 1° *corps* plus convexe; 2° *cavités antennaires* plus espacées; 3° *antennes* plus courtes, plus robustes; 4° *pro-* » *thorax* déclive, tout autrement construit; 5° *écusson* triangulaire; 6° *élytres* dentées sur les bords latéraux » postérieurs; 7° *cuisse*s pluridentées en dessous; 8° *tarses* plus courts. »

Je crois à la validité de ce genre (dont je ne connais pas les espèces), parce qu'il a été fondé par M. Edw. Saunders et admis par M. Ch. O. Waterhouse, qui y a introduit deux espèces. Contrairement à l'opinion de M. J. Thomson, je doute qu'il ait la cavité sternale formée par le mésosternum.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre habite le Brésil.

1. *A. caraboides*, Thomson, Typ. Bupr. p. 83 (1878) (Brésil).
2. *A. cribrata*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), Vol. 19, p. 447 (1887) (Brésil).
3. *A. punctipennis*, Waterhouse, idem, p. 447 (1887) (Parana).
4. *A. violacea*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Eumerus*, p. 3, pl. 1, f. 2 (1839) (Brésil).

19. GENUS CALLIPYNDAX, WATERHOUSE

Callipyndax. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (5e), Vol. 19, p. 295 (1887).

Caractères. — « Caractères généraux des *Amyia*, mais plus court et relativement plus large. » Prosternum muni d'une « mentonnière » légèrement sinueuse dans son milieu. Les fémurs ont une » double rangée de dents aiguës au côté interne, et sont très distincts des *Amyia*. Tarses très courts; le » premier article des antérieurs et des médians pas plus long que le suivant; le premier article des tarsi » postérieurs aussi long que 2 et 3 réunis. Pronotum deux fois aussi large que long, anguleux sur les » côtés. Elytres de la largeur du pronotum, sensiblement de moitié plus larges que longs; horizontaux » en avant, déclives en arrière; les côtés parallèles, le sommet obliquement atténué; chacun avec une » courte côte obtuse. Suture du premier et du deuxième segment abdominal indistincte.

M. Ch. O. Waterhouse fonde ce genre sur un ensemble de caractères indiscutablement distincts de ceux de *Amyia*. Bien que je ne reconnaisse pas le type de l'unique espèce qui en fait partie, je pense qu'il peut être maintenu.

Distribution géographique de l'espèce. — Ce genre habite le Brésil.

1. *C. cupreiventris*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), Vol. 19, p. 295 (1887) (Brésil).

20. GENUS MELIBÆOPSIS, NOV. GEN.

Caractères. — Tête large, légèrement concave et inclinée par suite de la déclivité de la partie antérieure du pronotum; épistome court, largement et peu profondément échancré en arc; joues armées d'une courte dent aiguë; cavités antennaires médiocres, arrondies, assez distantes pour le groupe et situées contre le bord interne des yeux. — Antennes courtes et relativement épaisses, insérées, au repos, à leur base, dans une rainure non prolongée sur l'épisternum prothoracique, dentées à partir du 6° article; 1 et 2 épais; 3 à 5 plus courts, subglobulaires et moniliformes; les suivants épais, transversaux, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres mais saillants, elliptiques, obliques et plus écartés vers le vertex que vers la bouche. — Pronotum grand, plus large haut, convexe, déclive en avant, déprimé sur les côtés antérieurs; ses bords rugueux mais non crénelés. — Elytres convexes, déclives en arrière avec une vague côte médiane naissant du calus huméral; le sommet séparément arrondi et

finement dentelé. — Prosternum muni d'une mentonnière bilobée, grande et non contiguë au milieu; étranglé au sommet entre les hanches antérieures. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine visibles. — Métasternum à peine échancré et étroit. — Hanches postérieures non dilatées au côté interne et très dilatées en avant à l'externe. — Pattes assez robustes; fémurs assez épais, fusiformes, finement crénelés sur leur bord interne; tibias robustes et arqués, leur bord externe tranchant et dentelé, ce bord cilié sur les postérieurs; tarses très courts, déprimés, leurs articles subégaux; crochets bifides. — Corps oblong, convexe; faciès intermédiaire entre les *Melibæus* et les *Pseudagrilus*.

Je ne connais que deux espèces qui puissent rentrer dans ce genre; les caractères du dessous sont un peu plus accentués chez la première (*obesa*) que chez la seconde (*densegranata*) mais il y a quasi-identité dans le faciès.

Distribution géographique des espèces. — Ces deux espèces proviennent de l'Afrique équatoriale.

1. **M. obesa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 280 (1899) (Congo).

2. **M. densegranata*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 318 (1894) (Quango).

21. GENUS PSEUDAGRILUS, CASTELNAU

Pseudagrilus. Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. 165 (1835); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 82 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 116 (1864).

Caractères. — Tête inclinée et convexe, surtout en arrière; front non ou à peine sillonné; épistome court, largement et peu profondément échancré au milieu; joues faiblement et obtusément dentées; cavités antennaires médiocres, légèrement transversales et situées contre le bord interne des yeux. — Antennes insérées à leur base dans un sillon non prolongé sur l'épisternum prothoracique, dentées à partir du 4^e article; 1 renflé; 2 et 3 un peu plus courts, subcylindriques, subégaux entre eux; les suivants s'élargissant graduellement, obtusément dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, ovalaires, rétrécis en avant, très légèrement obliques et un peu plus écartés en arrière, sur le vertex. — Pronotum un peu plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière; le disque convexe; les côtés et la base déprimés; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé; les côtés arqués en avant et subsinueux en arrière; la base bisinuée avec un lobe médian tronqué. — Ecusson variable, toujours très acuminé en arrière, sa partie antérieure souvent en carré ou en parallélogramme dont le côté intérieur est bisiné avec une partie médiane avancée en angle très aigu. — Elytres subparallèles, convexes, largement et séparément arrondis et dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum munie d'une large mentonnière entière, à peine sinueuse au milieu et arrondie sur les côtés; prosternum convexe, triangulaire, acuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine distinctes. — Métasternum échancré en avant. — Hanches postérieures peu dilatées au côté interne, sensiblement à l'externe, les marges inversement sinueuses, mais la sinuosité plus accentuée sur l'antérieure que sur la postérieure. — Pattes assez robustes; fémurs antérieurs et médians normaux et subfusiformes, les postérieurs très robustes et le plus souvent rouge feu; tibias grêles et normaux; tarses postérieurs sensiblement plus allongés que les autres, leur premier article un peu plus long que le suivant; crochets fortement dentés à la base. — Corps allongé; faciès d'*Agilus*, mais l'extrémité des élytres toujours arrondie.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend une douzaine d'espèces actuellement connues, toutes propres à l'Afrique intertropicale et plus nombreuses dans la région australe de ce continent :

1. *P. beryllinus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 360 (1851) (Cameroon, Zanzibar, Natal).